

最新室內觀賞植物 (續冊)

章錦瑜 著



最新室內觀葉植物 (續冊)

章錦瑜 著

 淑馨出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

S68-64
Z284

最新室內觀賞植物。續冊／章錦瑜著。——初版

——臺北市：淑馨，民80

面；公分

參考書目：面

含索引

ISBN 957-531-178-7(平裝)

1. 園藝

4

80003229

最新室內觀賞植物 (續冊)

作 著：章錦瑜

出 版 者：淑馨出版社

發 行 人：陸又雄

編 輯：尤淑芬·莊敏玲

繪 圖：章錦瑜·曾昭淞·洪鳴遠

地 址：台北市安和路2段65號2樓(日光大廈)

電 話：7039867·7006285·7080290

郵 撥：0534577~5 淑馨出版社

印 刷：六景彩印實業有限公司

法律顧問：蕭雄淋律師

登 記 證：新聞局局版台業字第2613號

出 版：1991年(民國80年)11月初版

1994年(民國83年)11月初版二刷

定 價：600元

ISBN 957-531-178-7(平裝)

版權所有·翻印必究

235.44

自序

本書所收錄之植物有下列幾個特性：

- 適合室內環境
- 適合盆栽
- 適合本省環境
- 多年生草本
- 葉色葉型或花具觀賞性

本續冊共收錄了四十八科，約二百多種植物，每種均有圖片附文字介紹其外觀與栽培繁殖要點。各個植物出現的先後順序，首先是按照科名字母順序，同科植物再依學名之屬名第一字母順序安排。

本書並附錄了所有本冊植物之相關資料分析，包括植株之生長型態、株高、生長環境、利用方式與觀賞特性，以供搜尋條件植物使用。

坊間同類書籍頗多，但本書收錄之植物種類較多而完全（連同已出版之「最新室內觀賞植物」，共收錄了五十五科，約五百多種植物）。除供查詢、分類外，室內景觀設計時亦可由附錄之相關資料分析，容易地找到適合條件的植物種類。最後，想說明一點，本書所收錄者雖強調為室內觀賞植物，但戶外只要環境條件相仿者亦同樣適合種植，尤其在一些陰暗角落、大樹冠地表或朝北牆面…等，要選取適種植物時，自本書中尋找反倒容易得多！

章錦瑜

謹識於台中東海大學景觀學系

1991 · 8

目 錄

第一部份：種子植物門 (*Spermatophytes*)

Acanthaceae (爵床科) 1

Perilepta

波斯紅草 1

Araliaceae (五加科) 2~20

Brassaia

澳洲鴨腳木 3

Dizygotheca

孔雀木 4

Fatshedera

熊掌木 5

Fatsia

八角金盤 6

Hedera

阿爾及利亞常春藤 7

白玉常春藤 8

英國常春藤 9

硬枝常春藤 10

日本常春藤 10

多脈常春藤 11

撒金常春藤 11

金心常春藤 11

鳥爪常春藤 12

Polyscias

圓葉福祿桐 15

白雪福祿桐 15

黃葉福祿桐 15

羽葉福祿桐 16

福祿桐 16

綠葉福祿桐 17

勝利福祿桐 17

Schefflera

鵝掌藤 18

斑葉鵝掌藤 18

卵葉鵝掌藤 19

斑葉卵葉鵝掌藤 19

Araucariaceae (南洋杉科) 21

Araucaria

小葉南洋杉 21

Areaceae (棕櫚科) 22~32

Caryota

叢立孔雀椰子 23

單幹孔雀椰子 24

Chamaedorea

袖珍椰子 24

竹莖玲瓏椰子 25

雪佛里椰子 25

魚尾椰子 26

Chamaerops

叢櫚 26

Chrysalidocarpus

黃椰子 27

Cocos

可可椰子 28

Licuala

圓葉刺軸櫚 28

Livistona

蒲葵 29

圓葉蒲葵 29

Phoenix

羅比親王海棗 29

Reinhardtia

窗孔椰子 30

Rhapis

觀音棕竹 31

細棕竹 31

棕竹 32

Asclepiadaceae (蘿藦科) 33~40

Ceropegia

愛之蔓 34

Dischidia

愛元果 35

Hoya

袖珍絨蘭 36

絨蘭 37

紅葉絨蘭 37

白葉絨蘭 37

鑲邊絨蘭 37

卷葉毯蘭·····	38	斑馬錦竹草·····	70
<i>Stapelia</i>		鋪地錦竹草·····	71
帝王魔星花·····	39	<i>Geogenanthus</i>	
<i>Stephanotis</i>		銀波草·····	72
非洲茉莉·····	39	<i>Gibasis</i>	
Asteraceae (菊科) ·····	41~47	新娘草·····	72
<i>Gynura</i>		<i>Rhoeo</i>	
紅鳳菊·····	42	蚌蘭·····	73
<i>Mikania</i>		<i>Setcreasea</i>	
紫絨藤·····	43	紫錦草·····	74
<i>Senecio</i>		<i>Siderasis</i>	
瓜葉菊·····	43	絨氈草·····	75
大弦月·····	44	<i>Tradescantia</i>	
金玉菊·····	45	銀線水竹草·····	75
弦月·····	46	綠錦草·····	76
綠之鈴·····	46	黃葉水竹草·····	76
Begoniaceae (秋海棠科) ·····	48~65	彩葉水竹草·····	77
<i>Begonia</i>		花葉水竹草·····	77
麻葉秋海棠·····	53	綠葉福水竹·····	77
眉毛秋海棠·····	53	白絹草·····	78
黑葉秋海棠·····	53	<i>Tripogandra</i>	
虎斑海棠·····	54	怡心草·····	78
聖誕秋海棠·····	54	<i>Zebrina</i>	
楓葉海棠·····	55	吊竹草·····	79
法國海棠·····	55	四色吊竹草·····	80
黑脈秋海棠·····	55	大吊竹草·····	80
麗格海棠·····	56	Cornaceae (山茱萸科) ·····	82~83
鋪地秋海棠·····	57	<i>Aucuba</i>	
地氈海棠·····	57	東瀛珊瑚·····	82
鐵十字海棠·····	58	Crassulaceae (景天科) ·····	84~85
蛤蟆秋海棠·····	59	<i>Crassula</i>	
深裂秋海棠·····	61	發財樹·····	84
四季海棠·····	61	Gentianaceae (龍膽科) ·····	86
球根海棠·····	63	<i>Exacum</i>	
Bignoniaceae (紫葳科) ·····	66	紫芳草·····	86
<i>Radermachera</i>		Gesneriaceae (苦苣苔科) ·····	87~114
山菜豆·····	66	<i>Achimenes</i>	
Bombacaceae (木棉科) ·····	67~68	長筒花·····	88
<i>Pachira</i>		<i>Aeschynanthus</i>	
馬拉巴栗·····	67	毛萼口紅花·····	90
Commelinaceae (鴨跖草科) ·····	69~81	短毛萼口紅花·····	91
<i>Callisia</i>		口紅花·····	92

翠錦口紅花·····	93
<i>Chrysanthemum</i>	
金紅花·····	94
<i>Codonanthe</i>	
中美鐘鈴花·····	95
紅鐘鈴花·····	95
<i>Columnnea</i>	
立葉鯨魚花·····	96
大紅鯨魚花·····	97
紅毛葉鯨魚花·····	98
鯨魚花·····	99
鈕扣葉鯨魚花·····	99
細葉鯨魚花·····	100
<i>Episcia</i>	
喜陰花·····	102
<i>Nematanthus</i>	
袋鼠花·····	103
紅袋鼠花·····	104
小袋鼠花·····	104
<i>Saintpaulia</i>	
非洲堇·····	105
<i>Sinningia</i>	
大岩桐·····	110
艷桐草·····	112
<i>Streptocarpus</i>	
海角櫻草·····	113
假非洲堇·····	114
Labiatae (唇形科) ·····	115~116
<i>Lamium</i>	
銀斑藤·····	115
<i>Plectranthus</i>	
瑞士常春藤·····	116
白邊瑞士常春藤·····	116
Lythraceae (千屈菜科) ·····	117
<i>Cuphea</i>	
雪茄花·····	117
Melastomataceae (野牡丹科) ·····	118
<i>Medinilla</i>	
寶蓮花·····	118
Moraceae (桑科) ·····	119~127
<i>Ficus</i>	
垂榕·····	120

印度橡皮樹·····	122
紫黑葉緬樹·····	123
黑王子緬樹·····	123
紅緬樹·····	123
美葉緬樹·····	123
乳斑紋緬樹·····	123
琴葉榕·····	125
薛荔·····	125
雪荔·····	126
花蔓榕·····	127
三角榕·····	127
Myrsinaceae (紫金牛科) ·····	128
<i>Ardisia</i>	
硃砂根·····	128
Nyctaginaceae (紫茉莉科) ·····	129
<i>Heimerliodendron</i>	
斑葉甜果木·····	129
Onagraceae (柳葉菜科) ·····	130~131
<i>Fuchsia</i>	
吊燈花·····	130
Oxalidaceae (酢醬草科) ·····	132~133
<i>Oxalis</i>	
幸運草·····	132
金網酢醬草·····	132
小紅楓·····	133
Pandanaceae (露兜樹科) ·····	134~135
<i>Pandanus</i>	
金線林投·····	134
山德露兜樹·····	134
斑葉露兜樹·····	135
Pittosporaceae (海桐科) ·····	136
<i>Pittosporum</i>	
海桐·····	136
Portulacaceae (馬齒莧科) ·····	137~138
<i>Portulacaria</i>	
樹馬齒莧·····	137
斑葉樹馬齒莧·····	137
<i>Talinum</i>	
斑葉假人參·····	138
Primulaceae (報春花科) ·····	139~142
<i>Primula</i>	
報春花·····	140

鮮荷蓮報春花·····	141
多花報春花·····	141
Rosaceae (薔薇科) ·····	143
<i>Rosa</i>	
迷你薔薇·····	143
Rubiaceae (茜草科) ·····	144~145
<i>Hoffmannia</i>	
錦袍木·····	144
<i>Nertera</i>	
小可愛·····	144
Rutaceae (芸香科) ·····	146
<i>Skimmia</i>	
金紅茵芋·····	146
Sapindaceae (無患子科) ·····	147
<i>Filicium</i>	
樹蕨·····	147
Scrophulariaceae (玄參科) ·····	148~149
<i>Calceolaria</i>	
荷包花·····	148
<i>Hebe</i>	
斑葉長階花·····	149
Saxifragaceae (虎耳草科) ·····	150~151
<i>Saxifraga</i>	
虎耳草·····	150
三色虎耳草·····	151
Urticaceae (蕁麻科) ·····	152~158
<i>Pellionia</i>	
噴煙花·····	153
<i>Pilea</i>	
冷水花·····	154
嬰兒的眼淚·····	154
小葉冷水花·····	155
蛤蟆草·····	156
毛蛤蟆草·····	156
銀脈蛤蟆草·····	157
Vitaceae (葡萄科) ·····	159~162
<i>Cissus</i>	
錦葉葡萄·····	160
菱葉藤·····	161
<i>Leea</i>	
紅寶石南天·····	162
Zingiberaceae (薑科) ·····	163~164

<i>Costus</i>	
絨葉閉鞘薑·····	163
<i>Kaempferia</i>	
復活百合薑·····	164

第二部份：蕨類植物門 (*Pteridophyta*)

Lycopodiaceae

Lycopodium

昆士蘭流蘇蕨·····	166
-------------	-----

Selaginella

細葉卷柏·····	167
垂枝卷柏·····	168
鳥巢卷柏·····	169
銀端卷柏·····	169
翠雲草·····	170

Pteridophyta (蕨類-羊齒植物)

總論·····	172
---------	-----

生長環境因子與維護管理要點·····	173
--------------------	-----

繁殖

有性繁殖法·孢子繁殖法·····	176
無性繁殖法·····	177

Adiantaceae (鐵線蕨科) ·····	182~183
---------------------------------	----------------

Adiantum

鐵線蕨·····	182
毛葉鐵線蕨·····	183
三角葉鐵線蕨·····	183

Asplenaceae (鐵角蕨科) ·····	184~186
---------------------------------	----------------

Asplenium

鳥巢蕨·····	184
圓葉山蘇花·····	185
山蘇花·····	185
羽裂鳥巢蕨·····	186

Blechnaceae (烏毛蕨科) ·····	187
---------------------------------	------------

Blechnum

肋骨蕨·····	187
----------	-----

Cyatheaceae (桫欏科) ·····	188~189
--------------------------------	----------------

Alsophila

台灣桫欏·····	188
-----------	-----

Sphaeropteris

筆筒樹·····	189
----------	-----

Davalliaceae (骨碎補科) ·····	190
----------------------------------	------------

Davallia

兔脚蕨.....	190
Dryopteridaceae (鱗毛蕨科)	191~192
<i>Arachniodes</i>	
中斑複葉耳蕨.....	191
<i>Cyrtomium</i>	
全緣貫眾蕨.....	192
冬青蕨.....	192
Lygodiaceae (海金沙科)	193
<i>Lygodium</i>	
海金沙.....	193
Nephrolepidaceae (腎蕨科)	194~199
<i>Nephrolepis</i>	
腎蕨.....	194
長葉腎蕨.....	195
碎葉腎蕨.....	195
波士頓蕨.....	196
Platyneriaceae (鹿角蕨科)	201~204
<i>Platynerium</i>	
麋角蕨.....	201
大麋角蕨.....	203
立生麋角蕨.....	204
長葉麋角蕨.....	204
Polypodiaceae (水龍骨科)	205~206
<i>Lemmaphyllum</i>	
伏石蕨.....	205
<i>Polypodium</i>	
大頭星蕨.....	206
魚尾蕨.....	206
Pteridaceae (鳳尾蕨科)	207~210
<i>Pteris</i>	
大葉鳳尾蕨.....	208
白玉鳳尾蕨.....	208
石化野鷄尾.....	208
扇葉鳳尾蕨.....	209
銀脈鳳尾蕨.....	209
斑葉鳳尾蕨.....	210
銀中斑鳳尾蕨.....	210
Salvinaceae (槐葉蘋科)	211
<i>Salvinia</i>	
槐葉蘋.....	211
Sinopteridaceae (中國蕨科)	212~214
<i>Pellaea</i>	

鐮刀蕨.....	212
鈕扣蕨.....	213
懸崖蕨.....	214
大葉懸崖蕨.....	214
附錄 1、2 有關名詞之說明.....	215~216
附錄 1：有關資料分析 A	217~224
附錄 2：有關資料分析 B	225~232
參考書目.....	233~234
中名索引.....	235~238
英名索引.....	239~242
學名索引.....	243~246

爵床科(Acanthaceae)

波斯紅草

學名：*Perilepta dyeriana*

Strobilanthes dyerianus

英名：Persian shield

原產地：緬甸、馬來亞

多年生亞灌木，單葉對生，長橢圓形、披針狀葉，全緣或淺密、小鋸齒，葉長 15 公分，寬 2~4 公分，柄短小。紙質葉，羽狀側脈 10~13 對，格網凹凸極為明顯，每一側脈與葉身中肋約呈 45° 斜出。暗綠色、富光澤的葉面上，泛佈著紫紅與銀白色斑彩，葉身中肋與葉緣綠意較濃重，愈是新生的嫩葉，紫色色彩愈是艷麗，老葉甚至全面綠化了，葉背亦為紫紅色。

花不大，管狀小花，長 3.5 公分，冠徑只 1.2 公分，淡藍紫色，穗狀花序腋生，觀花價值不高，主要仍以觀葉為主。

好高溫、高濕，種在溫暖的溫室中生長最好，生育適溫在 18~26℃，冬日 14℃ 以下易進入休眠，寒流來襲時要注意，易發生寒害。空氣濕度高，葉片伸展如意，不易枯捲。耐陰性強，在日照強度 50~1000f.c. 即可生長了。生長旺季需水殷切，要時時供水，保持盆土一直呈潤濕狀。盆栽用土壤須富含有機廐肥、疏鬆通氣，可用培養土混加泥炭土上盆。

用枝插，頂芽扦插來繁殖很容易。生長頗快速，須定期摘蕊、修剪，甚至強剪，使植株矮化，並給予更新的機會，新生葉片得以多量長出，才有一番美貌供展示觀賞。



五加科 (Araliaceae)

澳洲鴨腳木

學名：*Brassaia actinophylla*

Schefflera macrostachya

英名：Queensland umbrella tree, Octopus tree

原產地：澳洲、玻里尼西亞、新幾內亞、爪哇

常綠性喬木，在原產地株高可達 30~40 公尺，但現今多盆栽之，放置室內觀賞。因種在盆鉢內，生長受到限制，視盆鉢大小，株高約可長至 2~2.5 公尺，故屬於室內大型觀葉植物之一。

掌狀複葉之小葉數，在年幼時只有 3~5 片，而後約有 3~7 片葉，至成熟株每一複葉可長出 16 片之多的小葉；葉片呈長橢圓形，葉端鈍或銳或有短突尖，葉基鈍，葉緣偶有鋸齒，但常呈全緣微波狀。革質葉，羽狀側脈約有 4~10 對，葉兩面均光滑，葉面濃綠而富有光澤，具長柄 5~10 公分，赤褐色；葉長 20~30 公分，寬約 10 公分。在戶外生長之成熟株，多於春天開出猩紅色耀眼且花序碩大的花

，但室內盆栽之，則幾乎不見開花。

喜好非直射光之明亮場所，通風良好，空氣濕度高，則生長良好。當水份供需失調，土壤太濕或缺水乾旱；或長期放置在陰暗場所；或日照做急驟變化……等因素，均易引起葉片掉落。冬日在寒流來襲時，植物會發生休眠現象，生長勢弱，易引起落葉而使植株成高腳狀，且易遭介殼蟲侵襲為害；故冬日寒冷時最好移至溫暖處，或加保暖措施。每年 3~9 月之生長旺季，可每月施用一次化學肥料做為追肥。

它葉片碩大，易沾佈灰塵，最好每月至少一次沖淋葉片，用水管細霧水噴洗，或放在浴室蓮蓬頭下淋洗，可促其生長更加健旺且葉面清麗展現其自然光澤。

繁殖多用播種法，春天採新鮮種子隨即播下，亦可用扦插法。此植物生長緩慢，修剪照顧工作不多，對環境的適應能力尚強，葉片碩大，濃綠富光澤，為一外觀挺健的大型室內觀葉植物。



孔雀木

學名：*Dizygotheca elegantissima*

英名：False aralia, Finger aralia, Spider aralia, Splitleaf maple

原產地：澳洲、太平洋島

常綠性灌木或小喬木狀，掌狀複葉，小葉5~9片，複葉在枝條上彼此互生。小葉呈線形，葉端漸尖，葉基漸狹，葉緣有疏粗鋸齒，葉兩面均平滑，革質，羽狀葉脈不明顯，僅中肋明顯，小葉長約10~20公分，寬僅1~1.5公分；小葉柄約0.5~1.5公分長，葉面銅紅或呈橄欖暗綠色。孔雀木在原產地株高可達8公尺，呈直立性小喬木狀，但盆栽栽之放置室內，經十年約可長至1公尺半之高，生長並不快速。小葉狀似細長的手指呈放射狀着生，故英名稱之為 *Finger aralia*。本屬在原產地約有15種之多。

它不耐強光直射，宜放置室內窗邊明亮無直射光處，在極陰暗處亦稍可容忍。生長最適氣溫在18℃，幼苗則多需稍高的溫度，尤其是冬日，溫度最好不要低於15℃；老株則還可忍耐至5~10℃，溫度再低會受寒害。喜高的空氣濕度，因此全年均須經常予以噴霧，若能放置在溫室，或一羣植物之中，因空氣濕度高，它會生氣蓬勃，生長很好。盆土最好在乾些時再徹底澆水，盆土須排水佳，生長季保持略潤濕即可；休眠期間不要太濕。生長旺季（5~8月），可1~2星期施澆一次淡薄的完全速效肥料追肥之。病蟲害偶見蚜蟲、薊馬，或空氣乾燥時會有紅蜘蛛或介殼蟲發生。

室內盆栽有時會發生葉片掉落現象，一片接一片的，甚至很快掉到只留一空莖桿，令人心焦急，此現象發生有下列幾個原因：

1. 盆土太過乾旱，缺水。
2. 溫度太低，冬日寒流來襲，未予以保護而受寒害。
3. 空氣濕度太低，太乾燥。
4. 冬日盆土又濕又冷時。



若發生上述現象最好及早改善，但除非莖枝或根系也死亡，否則葉雖落光，還有可能萌發腋芽；或予以強剪讓它再自下部發生分枝。老株之莖幹下部葉片老化時亦會自行萎落，故老株較易形成高腳狀，而另有一番趣味。

春天可播種繁殖，但種子得來多不易。常用還是扦插法，剪取莖枝來扦插，約3星期即生根，而後種在3吋盆內，一盆內可種上2~3株，或行摘芯促生分株。每1~2年換盆一次，5月行之，使該年有一個更好的生長。生長多年的老株可予以強剪，更新之。另它亦可嫁接在 *Aralia reticulata* 上。



另有寬葉及斑葉品種，如 *D. elegantissima* cv. *Castor* 及 *D. elegantissima* cv. *Variegata*，其掌狀複葉只有3~5枚小葉片，小葉片長約5~7公分，寬約1~2公分，生長更緩慢，但觀葉性頗高。

熊掌木・五角金盤


學名：*Fatshedera lizei*

英名：Tree ivy, Botanical wonder, Miracle plant

1912 年，法國一位苗圃家 Lize-Frères 將八角金盤 (*Fatsia japonica*) 與常春藤 (*Hedera helix*) 雜交成功而培育出熊掌木。它葉片大小居於前二者之間，葉全緣不似八角金盤之鋸齒，且僅為掌狀 5 裂葉（八角金盤為掌狀 7~11 裂）。

常綠性蔓藤，生長高達 1 公尺以上，因此必須立支柱以撐持之，初生莖呈草質而後漸轉木質化。單葉、互生，葉端漸尖，葉基心型，全緣波狀，葉面不平坦、波浪狀或有扭曲，新葉密被毛茸，老葉則濃綠而光滑，柄長約 8~10 公分，柄基成鞘狀與莖枝連接，葉片徑寬約 12~16 公分。植株成熟後在秋天會開出淡綠色的小花。

繁殖多用扦插法，尤其是用頂梢的枝條來扦插更容易，甚至在水中都能生根，不過還是在砂與泥炭土混合介質中扦插生根很容易。剪下 10 公分長的插穗，扦插待芽萌發，新葉長出來後，就可以將 3 株種在一盆內，在其生長期間能多次予以摘芯，則可以產生更多分枝，使莖葉更加叢茂。



它耐寒力頗強，可耐 3℃ 之低溫，尤其是放置戶外讓它慢慢習慣寒冷環境，則更可增強其耐寒力，但絕不可於寒流來襲時，忽由溫暖的室內移至室外。生長旺季須勤予供水，冬日則不須太多的水。耐陰性尚好，甚至可容忍光線極差之場所。病蟲害不多見，甚至可抗粉介殼蟲，但偶有蚜蟲、紅蜘蛛、介殼蟲及蓟馬。

喜好冷涼環境 (10~16℃)，在太溫熱的情況下，枝條下部的葉片易發生掉落的現象。另外當每次澆水後，貯水盤中餘水不倒掉，根泡在水中，亦會引起落葉，萎凋的葉片應及早摘除。冬日它雖較不怕冷，但此時最好移至光線較明亮的場所，但仍不可在陽光直射下，葉片會受傷或黃化。

放置在室內，空氣若太過乾燥，葉片亦會有乾枯現象，故可用噴霧水來提高空氣濕度。

除盆栽外，亦可做地被植栽，因其莖節處極易生根，故當其長至 30~40 公分以上即可壓入土中，使其節處生根，而鋪滿地面。

另有斑葉熊掌木 (*Fatshedera lizei* cv. *Variegata*) 葉緣有不規則之乳黃色鑲邊，觀葉性更佳，但耐寒力較弱，生長勢亦稍差，但若以熊掌木為砧木來嫁接斑葉種者，則可增加其生長勢。



八角金盤

學名：*Fatsia japonica*

英名：Japanese aralia, Formosa rice tree,

Paper plant

原產地：日本

在野外，此常綠性直立灌木或小喬木，株高可達 6 公尺，盆栽則多栽培成低矮密簇狀。具有粗肥的莖枝，其上互生著碩大的葉片，掌狀中至深裂葉，裂片數 7~11，每一裂片呈橢圓形，裂緣有鋸齒，裂端銳尖。葉面平滑無毛茸，鮮綠至暗綠色，閃耀著自然的光澤，葉面徑可達 30~40 公分，革質。

繖形花序團聚成圓錐花序狀，有長花梗支撐著，花序總長可達 45 公分，小花為乳白色。花後結出一粒粒黑亮的小果實。

除了一般種之外，另有 *cv. Moseri* 品種：植株生長較低矮，枝葉顯得更密簇，且生長勢旺盛。*cv. Variegata* 者之葉緣鑲有乳白斑紋，更具觀葉性。

對溫度的適應彈性頗廣，但仍喜冷涼，適合生長的溫度在 10℃ 左右，在台灣平地是不耐酷暑的。喜半陰，忌強日照，甚至可耐 50 f.c. 的暗光環境，當然，在明亮之處，葉色看來較為鮮艷美觀。



在冷涼環境中，它是一須佔據頗多空間的室內耐陰盆栽，盆栽高度在 2 公尺以下，葉面徑也多在 25 公分以下，但仍是一大型室內植物。繁殖可採用新鮮種子，於晚冬春天時播種或扦插法、高壓法。

生長旺季，因枝粗葉大，每日蒸散的水量不少，因此需勤予澆水，栽培土壤得經常保持在適度的濕潤。不可一時過乾或偶而濕粘得不透氣，植物都會受到傷害。在光線太微弱以及乾旱過度時，會有落葉現象。在每年新葉發生前，老葉也會有自動掉落的現象，以迎接嶄新的外觀。

可能的蟲害有蚜蟲、紅蜘蛛、粉介殼蟲、介殼蟲與薊馬，病害則需注意澆水過度時期，莖葉會形成水漬斑，甚至腐爛的現象。



Hedera (常春藤屬)

總 論

Hedera 屬的植物，英名泛稱為 Ivy，大約有 5 種，但因而衍生出的變種與品種卻是數量不小，它們都是多年生、常綠木質藤本，原產地在歐洲、北非、亞洲西部的溫帶或亞熱帶地區。它的幼葉與成葉有所不同：幼葉著生於莖梢，此莖枝為草質性、活力強、節處易發生氣生根，葉形多為掌狀裂葉。成葉則生長在木質化之硬枝上，但莖枝已老化，故節處不再發

生氣生根，也不具攀附的能力了。成葉多不會發生分裂，常為橢圓狀、披針形葉，花小型、綠色，繖形花序再聚成圓錐花序狀，僅於成熟莖枝上綻放。

常春藤的幼嫩枝很容易發生變異，因而產生了許多變種，它們有不同的葉形、葉色與生長習性，有時鑑定起來，是頗為困難的。

各 論



阿爾及利亞常春藤


學名：*Hedera canariensis*

英名：Algerian ivy, Canary ivy, Madeira ivy

原產地：加那利羣島（非洲西北）、北非



是地被的好材料



1833 年在英國被栽培推廣，此種最特殊處在於其莖枝與葉柄呈紅褐色，葉片也比較大，生長速率較其它常春藤更慢，蔓性。幼葉呈卵形，寬 15 公分，全緣或掌狀 3~7 淺裂，葉基心形，葉面全為綠色。成熟葉卵披針形，果色黑。




白玉常春藤

學名：*Hedera canariensis* cv. *Variegata*

英名：Variegated Algerian ivy, Hagenburger's ivy

葉色極美，栽培相當普遍的一種，常被稱為“Glorie de Marengo”，暗綠色葉面，葉緣鑲有乳白斑邊，極具觀賞性。適合生長的溫度範圍在 18~20℃，冬天在 12℃ 以下會呈休眠狀。

此種栽培得相當商業化，頗受大眾人士的喜愛。莖枝與葉柄均呈紅褐色之色彩化，革質的葉片，長 7~14 公分，葉身中肋處鮮綠至灰綠色，並夾雜著藍綠等的斑塊，葉緣呈奶白色，偶而也混攪著粉色斑彩。



此種極受歡迎的室內常春藤，可種在大盆鉢內亦可養在小巧的盤碟中，對環境的適應能力相當有彈性，可在陽光下生長，亦可耐陰；喜好冷涼亦可容忍溫熱的氣候；耐旱，可戶外生長當地被利用，或攀爬在圍籬、棚架上，盆栽或吊鉢，都是常利用的方式。



4~8 月生長旺季，盆栽土壤需經常保持略為濕潤狀，但不可過濕。每二星期施予一次追肥，在氣候乾旱時期，以細霧水噴佈枝葉，可防止蟲害發生。10 月下旬~翌年 2 月，因氣溫降低澆水量得減少並減次。3 月新春期間可予以修剪、摘芯來促進新嫩枝的發生。夏天時則可用扦插來繁殖新個體。定植的植物在三年內都不需換盆，滿三年時行第一次換盆，爾後每二年換一次盆，皆以在春天行之最適合。

莖枝紫褐色



地被利用

