

最佳畅销书

2015

全国卫生专业技术
资格考试权威推荐用书

内科主治医师 资格考试冲刺试卷 (第三版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写



更多免费题库

考前辅导授课名师，紧扣考纲精选试题
涵盖突出考试重点，提高考前冲刺效率

中国医药科技出版社

2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书

内科主治医师资格考试冲刺试卷

(第三版)

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

编委 (按姓氏笔画排序)

刘 强 刘 斌 刘梦玉
李淑静 吴春虎

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内科主治医师资格考试冲刺试卷/卫生专业技术资格考试研究专家组编写.
—3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2014. 11
2015 全国卫生专业技术资格考试权威推荐用书
ISBN 978 - 7 - 5067 - 7047 - 7

I. ①内… II. ①卫… III. ①内科学 - 医药卫生人员 - 资格考试 - 习题集
IV. ①R5 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 243742 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm^{1/16}

印张 7^{3/4}

字数 213 千字

初版 2012 年 11 月第 1 版

版次 2014 年 11 月第 3 版

印次 2014 年 11 月第 3 版第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7047 - 7

定价 26.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

目 录

冲刺试卷一	1
基础知识	3
相关专业知识	11
专业知识	19
专业实践能力	28
冲刺试卷二	37
基础知识	39
相关专业知识	47
专业知识	56
专业实践能力	65
冲刺试卷三	73
基础知识	75
相关专业知识	83
专业知识	91
专业实践能力	99
参考答案	106

冲刺试卷一

基础知识

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 原尿中的氨基酸主要在肾小管的哪个部分被重吸收
A. 集合管 B. 远曲小管
C. 髓袢升支 D. 髓袢降支
E. 近曲小管
2. 女性，30岁，分娩后20天出现尿频、尿急、尿痛。尿检：蛋白（-），红细胞0~3个/HP，白细胞（++），中段尿细菌培养3次阴性，既往有泌尿系统感染史。需作何种尿培养才能检出原浆型菌株
A. 高渗培养 B. 等渗培养
C. 碱性培养 D. 低渗培养
E. 普通培养
3. 神经根型感觉障碍的特点不应有
A. 症状在病变同侧
B. 咳嗽等增加腹压动作可加重疼痛
C. 出现感觉分离
D. 感觉障碍范围呈带状
E. 放射性疼痛
4. Cushing病多由于
A. 下丘脑-垂体性ACTH分泌过多所致
B. 异源性ACTH分泌过多所致
C. 肾上腺腺瘤所致
D. 肾上腺腺癌所致
E. 不依赖ACTH的双侧肾上腺结节样增生所致
5. 男性，65岁，右利手，晨起家人发现他右侧肢体无力，在和别人交谈时言语流利，但不能理解别人的语言，别人也不能理解他的言语。患者的语言障碍是
A. 运动性失语 B. 感觉性失语
C. 混合性失语 D. 命名性失语
E. 有构音障碍
6. 将血糖mmol/L转换为mg/dl的换算系数是乘以
A. 10 B. 12
C. 15 D. 18
E. 20
7. 关于人类免疫缺陷病毒的特点，哪项不正确
A. HIV有HIV-1和HIV-2两个型
B. HIV属于逆转录病毒科
C. 为RNA病毒
D. 产生抗体多为中和抗体
E. 主要感染CD4⁺T淋巴细胞
8. 应用大量环磷酰胺间歇静脉冲击治疗系统性红斑狼疮的主要作用是
A. 减轻心肌损害
B. 防止肾纤维化与肾功能恶化
C. 减轻血管炎性损害
D. 防止中枢神经系统损害
E. 增加血小板，防止溶血
9. 与原发性肺结核相符的是
A. 右肺尖结核病变
B. 肺门空洞病变
C. 肺门、纵隔淋巴结肿大
D. 右上干酪性肺炎
E. 双肺粟粒状阴影
10. 不能依据骨髓穿刺检查而排除诊断的疾病是
A. 巨细胞贫血
B. 原发性血小板减少性紫癜
C. 多发性骨髓瘤
D. 淋巴瘤
E. 再生障碍性贫血
11. 下述鉴别3种血友病的凝血活酶生成试验（TGT）及纠正试验的结果错误的是
A. 血友病A患者TGT延长，加正常血清不能纠正，加钡吸附正常血浆能纠正
B. 血友病B患者TGT延长，加正常血清不能纠正，加钡吸附正常血浆不能纠正
C. 遗传性FXI缺乏症患者TGT延长，加正常血清能纠正，加钡吸附正常血浆也能纠正

- D. 中重度血友病 A 患者 APTT 延长, PCT 缩短, TGT 异常
E. 血友病 B 患者 FIX 抗原及活性明显减低
12. 弥散性血管内凝血患者在消耗性低凝期应输入
A. 新鲜全血
B. 一般贮存全血
C. 浓缩红细胞
D. 少白细胞红细胞
E. 洗涤红细胞
13. 上消化道大量出血是指
A. 短期内出血超过 1000ml
B. 短期内出血超过 1200ml
C. 短期内出血超过 1500ml
D. 短期内出血超过 1800ml
E. 短期内出血超过 2000ml
14. 引起肠易激综合征的原因不包括以下哪项
A. 特殊饮食
B. 精神因素
C. 肠道菌群失调
D. 肠道感染
E. 免疫异常
15. 男性, 38 岁, 有先天性心脏病、心功能不全病史, 近期出现上腹胀、乏力症状。查体: 肝病面容, 腹膨隆, 肝肋下 5cm, 剑突下 3cm, 质韧、压痛、结节状, 化验 HBsAg (-)。该患者最可能诊断为
A. 原发性胆汁淤积性肝硬化
B. 病毒性肝硬化
C. 淤血性肝硬化
D. 代谢性肝硬化
E. 自身免疫性肝硬化
16. 女性, 长期高血压, 今日突感头痛, 多汗, 面色苍白, 视物模糊, 测血压 254/118mmHg, 考虑患者出现了
A. 急进型高血压
B. 脑血管意外
C. 高血压危象
D. 高血压脑病
E. 急性心力衰竭
17. 主要在肾分泌的激素是
A. 抗利尿激素
B. 促红细胞生成素
C. 醛固酮
D. 糖皮质激素
E. 盐皮质激素
18. 关于主动性异位心律, 下列哪项不正确
A. 阵发性心动过速
B. 房性期前收缩
C. 心房扑动
D. 心室颤动
E. 预激综合征
19. 下列哪种药物属于袢利尿药
A. 氢氯噻嗪
B. 螺内酯
C. 氨苯蝶啶
D. 呋塞米
E. 氯噻酮
20. 以下疾病的胸片显示肺血减少的是
A. 二尖瓣关闭不全
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 肺动脉瓣狭窄
E. 主动脉瓣狭窄
21. 女性, 61 岁, 早晨起床突然发现口角歪斜。查体发现双侧额纹对称, 右侧鼻唇沟变浅, 露齿口角偏左, 面部痛觉正常, 其诊断为
A. 右侧中枢性面瘫
B. 左侧中枢性面瘫
C. 右侧周围性面瘫
D. 左侧周围性面瘫
E. 双侧周围性面瘫
22. 腹痛的性质不正确的是
A. 刀割样疼痛多因脏器穿孔所致
B. 隐痛或钝痛多因胃肠张力变化所致
C. 胀痛可能为实质脏器包膜牵张所致
D. 剑突下钻顶样痛多为消化性溃疡
E. 广泛剧烈腹痛与腹膜弥漫性炎症有关
23. 导致心力衰竭发病和死亡的主要原因是
A. 心室重构
B. 心内膜炎
C. 心室内附壁血栓
D. 风湿活动
E. 心内膜下心肌梗死
24. 洋地黄中毒的心电图变化最常表现为
A. 室性期前收缩
B. ST-T 呈鱼钩样改变
C. Q-T 间期缩短
D. 心房颤动
E. 房室传导阻滞
25. 有关骨髓瘤肾损害的临床表现, 不正确的是
A. 贫血为正细胞正色素型
B. 贫血与肾功能损害不相称
C. X 线改变显示骨质疏松以脊柱或骨盆多见

- D. 肾损害以肾小球损害为最早最常见
E. 部分患者有高黏滞血症
26. 下列有关 MODY 的叙述哪项正确
A. 成年发病的青年型糖尿病
B. 免疫性胰岛损伤
C. 热带发病较高
D. 线粒体基因突变所致糖尿病
E. 发病年龄较小, 少发酮症
27. Crohn 病发生剧烈腹痛和腹肌紧张提示
A. 进餐过多
B. 局部肠痉挛
C. 不完全性或完全性肠梗阻
D. 急性肠穿孔
E. 肠蠕动增加
28. 根据病因和发病机制, 下列贫血分类正确的是
A. 红细胞生成减少和造血功能障碍两大类
B. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多和失血三大类
C. 造血原料不足、造血功能障碍和破坏过多三大类
D. 红细胞生成减少、红细胞破坏过多两大类
E. 造血原料不足、失血、溶血三大类
29. 性激素不包括
A. 孕酮
B. 雄烯二酮
C. 雌二醇
D. 皮质醇
E. 孕酮
30. 下列方法中常用于检测抗核抗体的是
A. 胶体金标记和快速膜渗滤技术
B. 酶联免疫吸附 (ELISA) 法
C. 间接免疫荧光法
D. 乳胶凝集法
E. 免疫印迹法
31. 哮喘持续状态有效的药物治疗是
A. 头孢他啶
B. 阿托品
C. 地塞米松
D. 喉替啶
E. 右旋糖酐 40
32. 抗癫痫药物治疗的原则是
A. 大量, 突击, 静脉用药
B. 按痫性发作的类型选择药物, 短期用药, 随时改变品种
C. 按痫性发作的类型选择药物, 长期规则用药
D. 长期规则用药, 禁酒
E. 大剂量, 短期, 联合用药
33. ITP 最常见的死因是
A. 脑出血
B. 心源性休克
C. 胃肠道出血
D. 骨髓功能不全
E. 消耗性凝血障碍
34. 一般急性风湿热常用何药治疗
A. 激素
B. 吲哚美辛
C. 阿司匹林
D. 布洛芬
E. 双氯芬酸钠
35. 混合性结缔组织病的标记性抗体是
A. 抗 UIRNP 抗体
B. 抗 dsDNA 抗体
C. 抗着丝点抗体
D. 抗 SSA 抗体
E. 抗 SSB 抗体
36. 属于机体特异性免疫应答的是
A. 眼泪和唾液腺的杀菌作用
B. 巨噬细胞的吞噬作用
C. 肿瘤坏死因子 (TNF) 分泌增多
D. 白细胞介素-2 分泌增多
E. 杀伤性 T 淋巴细胞活性增强
37. 糖尿病毛细血管间肾小球硬化症的临床上尿液的主要特点是
A. 尿糖较前增多
B. 大量血尿
C. 尿中有大量白细胞和管型
D. 持续性蛋白尿
E. 出现酮尿
38. 男性, 61 岁, 反复咳嗽 2 年, 伴低热、消瘦。查体: 气管左移, 左上肺可闻及湿性啰音。X 线胸片示左上肺多个厚壁空洞, 左肺门上移, 诊断首先考虑
A. 肺脓肿
B. 癌性空洞
C. 真菌性脓肿
D. 慢性纤维空洞型肺结核

- E. 阿米巴肺脓肿
39. 哪些部位受刺激可产生尿路刺激征
- 膀胱三角区和膀胱颈
 - 输尿管
 - 尿道
 - 膀胱前壁和膀胱颈
 - 膀胱后壁和膀胱颈
40. 急性非 ST 段抬高型心肌梗死, 以下处理方式不正确的是
- 低分子肝素抗凝
 - 氯吡格雷抗血小板
 - 尿激酶溶栓
 - 有心源性休克时给予升压药维持血压
 - 三度房室传导阻滞时安置临时心脏起搏器
41. 阵发性室上性心动过速的发生机制主要是
- 心肌缺血
 - 折返机制
 - 高血压病
 - 感染性心内膜炎
 - 洋地黄中毒
42. 流行性脑脊髓膜炎的发病, 与下列因素中哪一项无关
- 机体免疫力下降
 - 男女性别的影响
 - 细菌毒力强
 - 血-脑屏障功能下降
 - 细菌数量多
43. 吉兰-巴雷的首发症状通常为
- 呼吸困难
 - 四肢远端对称性无力
 - 排尿困难
 - 双侧周围性面瘫
 - 吞咽困难
44. 慢性腹痛常见于
- 急性胆囊炎
 - 急性胰腺炎
 - 异位妊娠破裂
 - 胆囊结石
 - 结核性腹膜炎
45. 下列不属于造血干、祖细胞异常所致的贫血的是
- 再生障碍性贫血
 - 阵发性睡眠性血红蛋白尿
 - 骨髓增生异常综合征
 - 微小病毒 B₁₉ 所致贫血
 - 铁粒幼细胞性贫血
46. 三叉神经痛最常发生的部位是三叉神经的
- 第一支
 - 第一、三支
 - 第一、二支
 - 第二支
 - 第二、三支
47. 抢救糖尿病酮症酸中毒, 在第一个 24 小时内补液总量应为
- 500 ~ 1000ml
 - > 1000 ~ 2000ml
 - > 2000 ~ 4000ml
 - > 4000 ~ 6000ml
 - > 6000ml
48. 以下哪项对风湿性心脏病主动脉瓣狭窄和先天性主动脉瓣狭窄鉴别诊断有帮助
- 20 岁前发现胸骨右缘第 2 肋间有粗糙的收缩期杂音
 - 心电图示左室肥厚
 - X 线示升主动脉扩张
 - 超声心动图示二叶主动脉瓣
 - 超声心动图示室间隔肥厚
49. 类风湿关节炎的基本病理特征是
- 韧带炎
 - 软骨炎
 - 肌腱炎
 - 附着点炎
 - 滑膜炎
50. 原尿中水的重吸收主要发生在
- 近曲小管
 - 髓袢升支厚壁段
 - 髓袢升支薄壁段
 - 髓袢降支
 - 远曲小管和集合管
51. 老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是
- 过度劳累
 - 摄入液体过多
 - 心肌缺血
 - 室性期前收缩
 - 呼吸道感染
52. 有关消化性溃疡, 哪种说法不正确
- 十二指肠溃疡多为空腹痛及夜间痛
 - 胃溃疡多为餐后痛
 - 所有消化性溃疡都有腹痛症状
 - 十二指肠溃疡进食后症状缓解

- E. 消化性溃疡均应和不典型胆石症鉴别
53. 弥漫性或部位不定的腹痛见于
A. 机械性肠梗阻 B. 消化性溃疡
C. 膀胱炎 D. 急性阑尾炎
E. 胆石症
54. 胆绞痛的部位特点是
A. 右下腹, 放射至右腰部与右下肢
B. 脐部、下腹部绞痛
C. 右上腹, 放射至右背与右肩胛
D. 腰部并向下放射
E. 左上腹, 放射至左肩胛
55. 女性, 23 岁, 乏力、皮下淤血半个月, 外周血 WBC $66 \times 10^9/L$, 并可见大量幼稚细胞, 下列检查结果中有助于诊断急性粒细胞白血病的
A. PAS 染色阳性
B. NSE 阳性, 可被 NaF 抑制
C. 铁染色阴性
D. POX 及苏丹黑染色阳性
E. 中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率增加
56. 下列哪项是 T-ALL 的免疫学标记
A. CD33、CD13 B. CD3、CD7
C. CD19、CD22 D. CD41、CD61
E. CD34、CD38
57. 地方性斑疹伤寒的传染源主要是
A. 患者 B. 猫
C. 家鼠 D. 猪
E. 跳蚤
58. 男性, 40 岁, 胸痛、反酸、胃灼热、嗝气 2 个月, 胃镜检查食管黏膜未见明显异常, 最有助于明确诊断的检查是
A. 上消化道气钡双重造影
B. ^{13}C 尿素呼气试验
C. 24 小时胃食管 pH 监测
D. 腹部 B 超
E. 24 小时心电图监测
59. 原发性血小板增多一般不见于
A. 慢性粒细胞白血病
B. 急性感染
C. 真性红细胞增多症
D. 骨髓纤维化
E. 原发性血小板增多症
60. 以下哪项不符合腺垂体功能减退症垂体危象的临床类型
A. 低血糖型 B. 高血糖型
C. 低温型 D. 低血压型
E. 混合型
61. 嗜铬细胞瘤的特征是
A. 儿茶酚胺分泌过多
B. 糖皮质激素分泌过多
C. 醛固酮分泌过多
D. 肾上腺髓质素分泌过多
E. 前列腺素分泌过多
62. 甲状旁腺素对血液中钙磷浓度的调节作用表现为
A. 降低血钙浓度, 升高血磷浓度
B. 升高血钙浓度, 降低血磷浓度
C. 升高血钙浓度, 不影响血磷浓度
D. 降低血钙浓度, 不影响血磷浓度
E. 升高血钙、血磷浓度
63. 下列哪项是肾上腺皮质肿瘤引起的库欣综合征与库欣病鉴别最有意义的试验检查
A. 小剂量地塞米松抑制试验
B. 过夜地塞米松抑制试验
C. 24 小时尿 17-羟类固醇
D. 血皮质醇昼夜节律
E. 大剂量地塞米松抑制试验
64. 2 型糖尿病发病机制是
A. 胰岛素拮抗激素分泌增多
B. 胰岛素 B 细胞遗传缺陷
C. 胰岛素抵抗和胰岛素分泌缺陷
D. 胰岛 B 细胞破坏, 胰岛素绝对不足
E. 胰岛 B 细胞自身免疫反应性损伤
65. 低血糖是指血浆葡萄糖浓度低于
A. 3.0mmol/L B. 3.5mmol/L
C. 3.8mmol/L D. 4.0mmol/L
E. 4.5mmol/L

66. 缺铁性贫血发病过程中最敏感或最可靠的检验方法是
- 血清铁降低
 - 血清总铁结合力降低
 - 平均红细胞血红蛋白浓度降低
 - 平均红细胞体积降低
 - 血清铁蛋白降低
67. 慢性间质性肾炎最常见于
- 糖尿病肾病
 - 痛风
 - 低钾
 - 尿路梗阻
 - 肾盂肾炎
68. 磺脲类降糖药主要适用于
- 糖尿病合并感染时
 - 糖尿病患者手术前控制血糖
 - 单用饮食管理不能获得满意控制的2型糖尿病患者
 - 1型糖尿病可合并应用本药加双胍类
 - 糖尿病合并妊娠
69. 反映糖尿病病情控制的指标是
- 空腹及餐后2小时血糖
 - 血糖定性
 - 血清胰岛素水平
 - 口服葡萄糖耐量试验
 - 血清胰岛素细胞抗体
70. 判断 COPD 患者病情轻重和病情发展趋势的最佳指标是
- 血清总 IgE 的水平
 - 患者平喘药物用量的多少
 - 气道反应性的高低程度
 - 外周血嗜酸性粒细胞绝对计数
 - 测定 FEV₁% 预计值
71. 可以治疗尿崩症的药物有
- 氢氯噻嗪
 - 格列苯脲
 - 螺内酯
 - 氨苯蝶啶
 - 格列美脲
72. 对黏液性水肿昏迷的描述哪项是错误的
- 多见于老年人
 - 寒冷、感染、镇静剂、麻醉剂可诱发
 - 表现为躁动、高热
 - 表现为嗜睡、低体温
 - 严重时休克、呼吸衰竭、心肾功能不全
73. 由下丘脑视上核和室旁核分泌激素是
- 催乳素
 - 甲状旁腺素
 - 胰岛素
 - 精氨酸加压素
 - 生长激素
74. 苯、烷化剂等化学物质有致白血病的作用，最常见的类型是
- 急性非淋巴细胞白血病
 - 慢性淋巴细胞白血病
 - 毛细胞白血病
 - 急性淋巴细胞白血病
 - 慢性粒细胞白血病
75. 继发性甲减是指
- 由于垂体病变引起甲减
 - 由于下丘脑病变引起甲减
 - 由于甲状腺病变引起甲减
 - 由于甲状腺手术引起甲减
 - 由于放射性碘治疗引起甲减
76. 不能早期判断上消化道大出血的是
- 血红蛋白和红细胞下降
 - 血压下降、呼吸急促或休克
 - 脉搏频数微弱
 - 呕血量及持续时间
 - 四肢冰冷和心慌
77. 男性，46岁。肝硬化患者。1周前曾有上消化道出血，近3天来，烦躁不安，昼夜颠倒。不宜应用的药物是
- 地西泮
 - 水合氯醛
 - 异丙嗪
 - 氯苯那敏
 - 去氯羟嗪
78. 女性，35岁，一皮质醇增多症病人，尿及血游离皮质醇不被小剂量地塞米松所抑制，而可被大剂量地塞米松抑制试验所抑制，其可能为
- 原发性肾上腺皮质腺瘤
 - 原发性肾上腺皮质癌
 - 异位 ACTH 综合征
 - 垂体 Cushing 病
 - 皮质激素长期治疗

79. 糖皮质激素替代治疗时, 哪项不正确
- 根据年龄、身高、体重、性别等确定基础量
 - 清晨服全日量的 2/3, 下午 4 时服下剩余的 1/3
 - 开始剂量氢化可的松 20 ~ 30mg/d
 - 发热等合并症时加量
 - 症状好转后立即停用
80. 胃窦部 pH 达到何值 G 细胞分泌受抑制
- <1.0
 - <1.5
 - <2.0
 - <2.5
 - <3.0
81. 慢性二尖瓣关闭不全血流动力障碍结果造成下列哪种改变
- 左房和左室扩大
 - 左室扩大
 - 全心扩大
 - 左房和右室扩大
 - 左室肥厚
82. 关于胰岛素瘤下面哪项是错的
- 发作时血糖低于 3.0mmol/L
 - 空腹与运动能促使低血糖症状发作
 - 供糖后低血糖症状迅速缓解
 - 胰岛素释放指数 >0.4
 - 患者可耐受 72 小时禁食
83. 关于上消化道出血哪种说法是正确的
- 幽门以上出血常表现黑便, 无呕血
 - 幽门以下出血常表现呕血, 无黑便
 - 呕血者不会有黑便
 - 呕血常伴黑便, 而黑便不一定有呕血
 - 幽门以下出血量再大, 也不会出现呕血
84. 巨幼细胞性贫血发病的机制为
- 血红蛋白合成障碍
 - DNA 代谢障碍
 - 细胞凋亡过度
 - 能量代谢障碍
 - RNA 代谢障碍
85. 中上部持续剧痛, 并阵发性加剧多为
- 急性弥漫性腹膜炎
 - 胆道蛔虫症
 - 消化性溃疡
 - 急性胰腺炎
 - 肠结核
86. 下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是
- TSH
 - TT₃
 - TT₄
 - FT₃
 - FT₄
87. 妊娠期甲亢, 下列何种检查不能采用
- TSH 检测
 - FT₃、FT₄ 检测
 - TSAb 检测
 - 甲状腺¹³¹I 摄取率
 - TPO - Ab 检测
88. 女性, 42 岁, 诊断为毒性弥漫性甲状腺肿多年, 曾先后出现以下症状, 其中何为该病少见而又特征性的表现
- 心房颤动
 - 月经减少
 - 明显多食
 - 胫前黏液性水肿
 - 双下肢软瘫
89. 应用二甲双胍时, 下列错误的是
- 诱发乳酸性酸中毒
 - 易见胃肠道反应
 - 偶可有皮疹
 - 肥胖者不宜使用
 - 肝、肾功能不全者禁忌使用
90. 高血压同时有低血钾的病人, 首先要想到
- 嗜铬细胞瘤
 - 原发性醛固酮增多症
 - 垂体性 Cushing 病
 - 肾动脉狭窄
 - 甲亢伴周期性狭窄
- 二、B 型题: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。
- (91 - 93 题共用备选答案)
- 肺小动脉楔压 (PWP) 增高
 - 中心静脉压 (CVP) 增高, 肺动脉压

(PAP) 正常或下降

C. PAP 增高, PWP 正常

D. CVP, PWP 均降低

E. CVP 增高

91. 心包积液时会出现

92. 肺栓塞时会出现

93. 肺淤血时会出现

(94 - 96 题共用备选答案)

A. 血小板数量减少

B. 多种凝血因子消耗

C. 血管壁异常

D. 凝血因子合成障碍

E. 遗传性凝血因子缺乏

94. 血友病出血原因是

95. DIC 出血原因是

96. 过敏性紫癜出血原因是

(97 - 98 题共用备选答案)

A. 腹部 B 超

B. X 线腹平片

C. ERCP

D. B 超引导针吸活检

E. 腹部 CT

97. 对鉴别急性水肿型和急性重症胰腺炎有较大价值的是

98. 对诊断慢性胰腺炎有重要价值的是

(99 - 100 题共用备选答案)

A. 弥漫型 (胃型) 胃癌

B. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤

C. 肠型胃癌

D. 胃类癌

E. 胃息肉

99. 与饮食等环境因素密切相关的是

100. 与遗传因素密切相关的是

相关专业知识

一、A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 诊断先天性心脏病与心脏瓣膜病最可靠且有价值的检查方法是
A. 心电图
B. 胸部X线检查
C. 动态心电图
D. 超声心动图
E. 胸部CT
2. 慢性胰腺炎和胰腺癌鉴别有重要价值的检查是
A. 经腹壁超声检查
B. 超声内镜引导下细针穿刺
C. 糖抗原CA19-9
D. 腹部加强CT
E. 腹部磁共振
3. 男性，36岁。因患再生障碍性贫血需要输血。当输入红细胞悬液约200ml时，突然畏寒。发热，呕吐1次，尿呈酱油样。血压10.0/6.0kPa(75/45mmHg)。该患者最有可能是下列哪一种输血不良反应(并发症)
A. 循环超负荷
B. 细菌污染反应
C. 过敏反应
D. 溶血性输血反应
E. 非溶血性输血反应
4. 高血压合并下列哪种疾病时，最适合用 β 受体阻滞药治疗
A. 高血压急性左心衰竭
B. 高血压伴心电图显示二度房室阻滞
C. 高血压伴支气管哮喘
D. 高血压伴心动过缓
E. 高血压伴肥厚梗阻型心脏病
5. 有关腰椎穿刺术，下列哪项不属于禁忌证
A. 颅内压增高
B. 颅后窝肿瘤
C. 脊柱结核
D. 穿刺部位有感染
E. 发热、菌血症
6. 内分泌紊乱综合征多见于
A. 鳞状上皮细胞癌

- B. 肺泡细胞癌
- C. 腺癌
- D. 小细胞未分化癌
- E. 大细胞未分化癌

7. 下列关于尿糖的说明中，哪一项是正确的
A. 尿糖阳性肯定有血糖升高
B. 尿糖阳性是肾小管吸收功能不良的结果
C. 尿糖阳性肯定有糖代谢异常
D. 尿糖阳性可诊断糖尿病
E. Benedict(班氏)试剂只查尿中是否有葡萄糖
8. 诊断急性白血病时，骨髓中原始细胞占骨髓非红系有核细胞的百分数是
A. $\geq 20\%$
B. $\geq 25\%$
C. $\geq 30\%$
D. $\geq 35\%$
E. $\geq 40\%$
9. 确诊催乳激素瘤，血清PRL应
A. $>100\mu\text{g/L}$
B. $<200\mu\text{g/L}$
C. $>150\mu\text{g/L}$
D. $>300\mu\text{g/L}$
E. $>50\mu\text{g/L}$
10. 肾病综合征最初的变化是
A. 大量蛋白尿 $>3.5\text{g}/24\text{h}$
B. 高脂血症
C. 高度水肿
D. 低蛋白血症
E. 肾功能不全
11. BMI的计算公式是
A. 身高(m)/体重的平方(kg^2)
B. 身高的平方(m^2)/体重(kg)
C. 体重(kg)/身高的平方(m^2)
D. 体重(kg)/身高(m)
E. 体重的平方(kg^2)/身高的平方(m^2)
12. 艾滋病不通过以下哪项途径传播
A. 与患者握手、拥抱
B. 输血
C. 性传播
D. 母婴传播

- E. 器官移植
13. 左心衰发展至全心衰, 下列哪项可减轻
A. 肝肿大压痛 B. 心率增快
C. 胃肠道淤血 D. 肺淤血症状
E. 三尖瓣区收缩期杂音
14. 对癫痫有重要诊断价值的辅助检查是
A. 脑脊液 (CSF)
B. 计算机断层扫描 (CT)
C. 磁共振 (MRI)
D. 脑电图 (EEG)
E. 脑彩超 (TCD)
15. 结核杆菌侵入肠道的主要途径是
A. 与开放性肺结核患者密切接触
B. 慢性血行感染
C. 腹腔内结核病灶直接蔓延
D. 饮用污染了牛型结核杆菌的牛奶
E. 开放性肺结核患者, 经常吞下含结核杆菌的痰液
16. 引起分离性感觉障碍 (痛温觉消失, 触觉存在) 的病变部位位于
A. 脊髓灰质前连合 B. 脊髓后索
C. 丘脑外侧核 D. 脊神经后根
E. 内囊后肢
17. 风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄最严重的并发症是
A. 心房纤颤 B. 体循环栓塞
C. 急性肺水肿 D. 右心室衰竭
E. 感染性心内膜炎
18. 下列选项中在体内可转变成胆色素的原料是
A. 胆固醇 B. 胆汁
C. 胆绿素 D. 血红素
E. 胆素
19. 男性, 34 岁。5 天来发热、咳嗽、脓痰, 量多, 有腥臭味。X 线胸片示: 右肺下叶后基底段大片阴影, 有空洞和液平。血常规 WBC $18 \times 10^9/L$, 以下疾病哪种最可能
A. 肺脓肿 B. 肺囊肿
C. 肺癌 D. 真菌性肺炎
E. 肺结核空洞
20. 关于 Ewart 征, 以下描述哪项错误
A. 左肩胛骨下方出现浊音区
B. 该区有支气管呼吸音
C. 该区语颤减弱
D. 本征提示心包积液量大
E. 可发生在各型渗出性心包积液
21. 下列哪项是小结节性肝硬化的典型病理改变
A. 纤维组织增生
B. 肝细胞变性坏死
C. 不同程度的炎性细胞浸润
D. 再生结节及假小叶形成
E. 新生细胞排列成胆小管样结构
22. 标志溃疡性结肠炎活动期最重要的临床表现是
A. 腹泻 B. 腹痛
C. 腹胀 D. 呕吐
E. 黏液脓血便
23. 男性, 28 岁。哮喘急性发作已经 2 天, 患者和家属情绪十分紧张。根据动脉血气分析结果, 医生认为病情尚不严重, 劝告患者及其家属不必过于紧张。血气分析除轻度低氧血症外, 医生作出病情估计是根据下列指标中的哪一项
A. $PaCO_2$ 降低, pH 轻度偏碱
B. $PaCO_2$ 正常, pH 亦在正常范围
C. $PaCO_2$ 升高, pH 明显降低
D. $PaCO_2$ 升高, pH 正常
E. $PaCO_2$ 升高, pH 偏酸
24. 男性, 38 岁。有心前区痛 2 年。体检: 血压 13.3/10.64kPa (100/80mmHg), 胸骨右缘第二肋间闻及粗糙的 3/6 级收缩期杂音, 向颈部传导, 第二心音减弱, 胸片见升主动脉扩张, 左室增大, 最可能诊断是
A. 特发性肥厚性主动脉瓣狭窄
B. 肺动脉瓣狭窄
C. 室间隔缺损
D. 主动脉瓣狭窄
E. 三尖瓣关闭不全
25. 致病力与细菌产生的凝固酶有关的是
A. 肺炎球菌肺炎
B. 金黄色葡萄球菌肺炎
C. 克雷伯杆菌肺炎

- D. 支原体肺炎
E. 病毒性肺炎
26. 诊断室性心动过速最有力的心电图证据是
A. 心率 140~200 次/分
B. R-R>P-P (房室分离)
C. QRS 波群增宽>0.12 秒
D. 出现心室夺获或室性融合波
E. 节律整齐或轻度不齐
27. 对于胃癌的发生部位, 正确的是
A. 幽门区最多
B. 贲门部位最多
C. 胃窦区最多
D. 胃底最多
E. 幽门区少发
28. IFG 是
A. 葡萄糖耐量受损
B. 空腹葡萄糖受损
C. 葡萄糖调节受损
D. 葡萄糖作用受损
E. 葡萄糖利用受损
29. 下述哪项不是因为血管内容量减少造成的肾前性氮质血症
A. 出血
B. 使用血管紧张素转化酶抑制剂
C. 脱水
D. 过度利尿
E. 腹泻
30. 急性呕吐伴上腹痛、发热、皮肤发黄, 应考虑
A. 急性胃肠炎
B. 急性胆囊炎合并胆道梗阻
C. 急性胰腺炎
D. 肠梗阻
E. 胃癌
31. 控制支气管哮喘气道炎症的首选药物是
A. 糖皮质激素
B. 乙酰半胱氨酸
C. 抗组胺药物
D. 抗胆碱药物
E. β 受体激动药
32. 目前诊断支气管扩张敏感且常用的检查
A. 胸部 X 线检查
B. 支气管造影术
C. 高分辨计算机断层扫描
D. 肺功能检查
E. 纤维支气管镜检查
33. 右心衰竭体循环淤血的表现是
A. 端坐呼吸
B. 心源性哮喘
C. 劳力性呼吸困难
D. 阵发性夜间呼吸困难
E. 肝颈静脉反流征阳性
34. 患者, 男性, 38 岁, 风湿性心脏病二尖瓣置换术后 2 周, 发热 10 天, 疑诊人工瓣膜心内膜炎, 则最可能的致病菌是
A. 葡萄球菌
B. 草绿色链球菌
C. 肠球菌
D. 真菌
E. 衣原体
35. 男性, 65 岁, 肠梗阻术后 1 周, 大便后突然出现胸痛, 呼吸困难。体检: 心率 130 次/分, $P_2 > A_2$ 。血气分析示 PaO_2 由原来的 98mmHg 降到 70mmHg, $PaCO_2$ 30mmHg。超声心动图示肺动脉高压, 可能的诊断是
A. 肺动脉栓塞
B. 急性左心衰竭
C. ARDS
D. 重症肺炎
E. 急性心肌梗死
36. 脑出血病人的 CT 图像正确的是
A. 起病后即可见高密度异常影
B. 起病后 24 小时内无改变
C. 可见脑室扩大
D. 起病后即可见低密度异常影
E. 起病 24~48 小时后可见高密度异常影
37. 血源性肺脓肿最常见的病原菌为
A. 大肠埃希菌
B. 变形埃希菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎克雷伯杆菌
E. 草绿色链球菌
38. 关于病毒性肝炎下列哪项不正确
A. 传染源均为患者和 (或) 携带者
B. 甲型、戊型肝炎经粪-口传播
C. 病后可获得免疫力, 但彼此无交叉免疫保护力
D. 甲肝儿童多见, 戊肝成年多见