



日本主妇之友社 ○ 编著

梁玥 ○ 译

蔷薇花图鉴

超实用的蔷薇月季玫瑰详解工具书

校园女孩

Schoolgirl

优雅的古白色花朵散发出淡淡的香气，花朵硕大，呈杯状，十分美丽。反季开花，主干较粗，直立，从上方的侧枝开花。虽说植株茁壮，但枝条容易白化。

药剂师蔷薇

Rosa gallica officinalis

这一品种与古代的法国蔷薇非常接近。在英国的红白玫瑰战争期间蔷薇作为兰开斯特家族的象征，植株在幼时可能因过多修剪导致白粉病，不过成年茁壮以后不施药剂也不易致病。

卡罗琳骑士

Caroline Kennedy

这一品种以“皇妃之刺”的种名而闻名，花朵硕大，呈杯状的花形，柔和的金黄色调，以直立性、植株茁壮、枝条柔软、几乎无刺。

甜梦

Sweet Dream

绽放淡紫色的花朵绽放，花量惊人，开放时间极为持久。直至初冬都会有反季开花。枝条纤细、柔和，易于牵引，树势旺盛，但需留意预防黑星病。

晨雾

Morning Mist

硕大的肉粉色花朵为单瓣型，不断反复开放，抗病性强，可以修剪出完美的小灌木树型。秋季结满红色果实，是欣赏价值极高的品种。

英国传统

English Heritage

花朵完美的“山”型，拥有类似于柠檬香的古典玫瑰香气，继承了“冰山”的血统，极为茁壮，可以当作小型藤本月季来打理。

奥秘

Mystery

深蓝色花朵带着若有若无的扎染状条纹，伴随开放由杯型逐渐变为平展型。在柔韧的枝条顶端成簇开放，半直立性树型，树势虽然旺盛，但需留意预防黑星病。

藤本白色圣诞

White Christmas (CL)

这一品种是名花“白色圣诞”的藤本型，同样具有迷人的芳香，花量多，许多硕大的花朵同时开放，很有春头，但不耐雨淋这一点是个缺点。

圣谷修道院

Abbaye de Valaigle

淡粉紫色花瓣向外翻卷着，看起来非常美丽，花量极具个性，偶可见双心，四季开花性强，不论盆栽或是地栽在庭院里都很适宜，是中等高度的藤本性品种。

咖啡

Café

花色极具个性，广受欢迎，花朵成簇开放，花量很多，树型紧凑，抗性佳，结实的枝条长而耐剪，须定期修剪花枝。

格特鲁德·杰基尔

Gertrude Jekyll

早期培育出的英国月季，香气浓郁且美丽出众，受到人们的好评，花朵硕大，呈碗状型，可以生长成为小型藤本月季，因此适合用来装饰美化花篱或花门。

云锦高天

The Duke of Edinburgh

淡黄色花朵，花量中，半重瓣，呈杯状型，枝条直立，树型紧凑。

藤本金兔子

Gold Bunny (CL)

“藤本型”，花色不会褪色。春季以后也偶有反季开花，但需要定期喷洒农药。

斗学技术出版社



蔷薇花图鉴

日本主妇之友社 ○ 编著
梁玥 ○ 译

江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔷薇花图鉴 / 日本主妇之友社编著 ; 梁玥译 . --

南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2019.4

ISBN 978-7-5537-9922-3

I . ① 薔… II . ① 日… ② 梁… III . ① 蔷薇属 - 观赏
园艺 IV . ① S685.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 283041 号

BARA NO BENRICHOU
By SHUFUNOTOMO Co., Ltd.
Copyright © SHUFUNOTOMO CO., LTD. 2015.
All rights reserved.
Originally published in Japan by SHUFUNOTOMO Co., Ltd.
Simplified Chinese Copyright© 2019 by Phoenix-HanZhang
Publishing and Media (Tianjin) Co., Ltd.
Chinese (in simplified character only)translation rights arranged with
SHUFUNOTOMO Co., Ltd. through CREEK & RIVER Co., Ltd.

江苏省版权局著作权合同登记 图字：10-2018-354 号

蔷薇花图鉴

编 著 日本主妇之友社
译 者 梁 玥
责 任 编 辑 刘 尧
责 任 校 对 郝慧华
责 任 监 制 曹叶平 方 晨

出 版 发 行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787mm × 1 092mm 1/16
印 张 11.5
版 次 2019年4月第1版
印 次 2019年4月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-9922-3
定 价 69.80元

图书如有印装质量问题，可随时向我社出版科调换。



Contents

- 4 本书的阅读方法
- 5 栽培的基本知识
- 11 花型
- 12 蔷薇的分类

原种·原变种

- 14 原种·原变种
- 24 日本蔷薇年表

古典玫瑰

- 28 古典玫瑰
- 30 香气四溢的生活让身心每天都得到治愈
- 32 邂逅古典玫瑰

- 56 齐藤芳江的绿色玫瑰园
- 58 用玫瑰花瓣制作蜂蜜玫瑰酱

现代月季

- 60 现代月季
- 62 挑选月季的基础知识
- 64 英国月季
- 80 英国月季的鉴赏方法

藤本月季

- 102 藤本月季
- 114 藤本月季的特征与人工牵引



小灌木型月季

- 118 小灌木型月季

杂交茶香月季

- 124 杂交茶香月季
141 藤本杂交茶香月季
142 藤本月季的特征
144 河合伸志的育种故事

丰花月季

- 148 丰花月季

多花蔷薇·微型月季

- 156 多花蔷薇
159 微型月季
166 藤本微型月季
167 无农药有机栽培的玫瑰造园与管理

168 玫瑰的种植环境·场所
170 如何处理病虫害
172 玫瑰的日常打理
174 修剪·牵引的乐趣

176 玫瑰园艺用语解说
179 索引



蔷薇花图鉴

日本主妇之友社 ○ 编著
梁玥 ○ 译



江苏凤凰科学技术出版社



Contents

- 4 本书的阅读方法
- 5 栽培的基本知识
- 11 花型
- 12 蔷薇的分类

原种·原变种

- 14 原种·原变种
- 24 日本蔷薇年表

古典玫瑰

- 28 古典玫瑰
- 30 香气四溢的生活让身心每天都得到治愈
- 32 邂逅古典玫瑰

- 56 齐藤芳江的绿色玫瑰园
- 58 用玫瑰花瓣制作蜂蜜玫瑰酱

现代月季

- 60 现代月季
- 62 挑选月季的基础知识
- 64 英国月季
- 80 英国月季的鉴赏方法

藤本月季

- 102 藤本月季
- 114 藤本月季的特征与人工牵引



小灌木型月季

118 小灌木型月季

杂交茶香月季

124 杂交茶香月季
141 藤本杂交茶香月季
142 藤本月季的特征
144 河合伸志的育种故事

丰花月季

148 丰花月季

多花蔷薇·微型月季

156 多花蔷薇
159 微型月季
166 藤本微型月季
167 无农药有机栽培的玫瑰造园与管理

168 玫瑰的种植环境·场所
170 如何处理病虫害
172 玫瑰的日常打理
174 修剪·牵引的乐趣

176 玫瑰园艺用语解说
179 索引

本书的图鉴部分大致分 6 个版块来介绍。

关于蔷薇的分类及标示等信息，即使在专家之间也是众说纷纭，而本书的参考标准是各位主编及各个蔷薇代销店的判断。

* 刊登在品种图鉴中的花朵写真精准地捕捉到了每个品种的特征，但是根据其各自的种植环境不同，即使是同一品种在花朵大小、颜色上也会有所差异。关于没有品种标示的庭院全景写真及其他参考写真，本书无法提供品种鉴定，因此不接受咨询，万分抱歉。

标示出了当前页所介绍的蔷薇花色。花色基本如此，但有时也会因为气候条件等而产生较大差异。

原种·原变种

原种·原变种



春晨 Frühlingsmorgen

单瓣型



花瓣为粉色，中心部分是鹅黄色。花期极早，从上一年的枝条叶腋处抽出短枝开花。兼具耐寒性、抗病性，粗壮的蔓状枝条能够攀缘到很高的地方。

蔓长400厘米·花径8厘米



1 花名

本书中所采用的蔷薇名称是在中国为人所熟知的名称。

2 花型

花型标示。其中也有标示着两种以上花型的品种，这是由于一部分品种会因气候条件不同而改变花型，或是花型随着开放产生变化。

3 花期

标示分为以下这四种：一季开花、四季开花、反季开花、多次开花。

一 一季开花——每年仅在春季开一次花。

四 四季开花——除了冬季以外的春季至秋季，有规律地隔一段时间开一次花。

反 反季开花——与有规律的四季开花不同，后面的花期没有规律性。

多 多次开花——比反季开花多，到了秋天也有大量花朵开放。

4 用途

根据各个品种的生长特性，用图形符号标示出了其适合的栽培用途。

■ 花坛——植株较矮小，基本不需要人工牵引。

■ 花篱——植株较高大且具有攀缘性，适合装饰花篱或植物攀爬架。

■ 墙壁——植株高大且攀缘性强，能够覆盖住房子建筑物等的外墙面。

■ 花门——植株较高大且具有攀缘性，适合装饰家庭用小花门。

■ 花塔——植株较高大且具有攀缘性，适合装饰花塔或花柱。

■ 花盆——植株较矮小，盆栽就足以养好。

5 香味

对于香气的感知人各有别，香气也会随着时间段和气候而有所变化。一般说来，与傍晚相比，在低温、潮湿的早晨闻到的花香会更浓一些。

浓香 中香 微香

6 株高·攀缘、花径

株高·攀缘——灌木性蔷薇用“株高”来标示，藤蔓性蔷薇用“攀缘”来标示，高度超过 200 厘米的半蔓性蔷薇用“攀缘”来标示。

花径——书中标示的是八分开时的花径，不过根据栽培环境不同会有少许差异。





看透蔷薇的个性，抓住栽培时机

有不少人觉得蔷薇很难栽培，所以知难而退。也许他们将蔷薇栽培看作是“蔷薇道”（就像茶道、花道一样），认为只有不断修行才能达到至高境界。

然而，蔷薇其实是一种在世界范围内被广泛栽培、对环境适应性极强的植物。此外，它的品种多到数不胜数，不论哪个品种都独具个性。只要你找到自己会养的品种，就等于拿到了蔷薇乐园的入场券。

请你将自己对蔷薇有何种要求列举出来看看。对于花色及香气、花期的喜好就不必说了，要根据是否符合栽培条件来进行严格筛选，比如“我想种植对栽培场所不挑剔的袖珍型蔷薇”“我觉得耐高温的品种比较好”“我想在寒冷地区栽培”“我想种成花门”“我想要抗病的品种”等。你一定能够找到易于自己栽培的蔷薇品种。

不论哪种植物都有其适当的栽培管理时期，如果在此时期之外进行种植反而会弱化植物的生长能力。好不容易买到优质蔷薇花苗，如果弄错了施肥时机与用量，就有可能开不出花来。因此请牢记基础知识与种植时间。

1 蔷薇的苗木

蔷薇花苗（日本产）通常在8~10月进行嫁接。

早春时在市面上贩卖的“新苗”是刚进行过嫁接的小苗，要等到第二年才能开花。半年后，新苗就能长得非常茁壮了。

秋冬时上市的“大苗”是嫁接后生长约一年的苗木，次年春天就能开花。由于贩卖时正值其休眠期，所以苗木都是经过修剪的。

将大苗栽在花盆中的蔷薇苗木叫作“盆栽花苗”。在盛花期时市面上最多的就是这种，一年到头都可以买到。

新苗

在种植时要十分小心，不要弄断刚嫁接好的新芽。

大苗

请选择枝茎粗壮的花苗。还有一个窍门就是要选择带有许多侧根的花苗。

盆栽花苗

购买盆栽花苗时能够直观地通过确认花与叶的状态，来判断根部的状态。



2 关于花盆

赤陶花盆

赤陶花盆种类丰富，既有质朴款、也有高级款。通气性极佳，但同时也有沉重、易碎的缺点。

塑料花盆

塑料花盆虽然轻便，但缺点就是透气性不好。不过种在侧面带有切口的“开口花盆”中的蔷薇，由于透气性较好，因此根部伸展状态极佳，不会出现根在花盆内转圈生长（盘根）的情况。



3 使用什么样的土壤好?

土壤

在栽培蔷薇时,理想的土壤标准就是“保水性”与“肥性”俱佳,“排水性”与“透气性”良好,即几颗土壤粒粘结成土块状,且土壤颗粒间留有适度孔隙。像这种具有“团粒结构”的、质地松软的土壤就是好土。

如果是在庭院里种植的话,则可在土壤中混入大量堆肥与干牛粪、干马粪、泥炭土等有机物质,充分翻耕后再进行栽培。



堆肥

堆肥是最常用的改良土质材料,对于提高保水性与保肥性十分有效。不过,使用腐熟度不达标的堆肥会导致植株根部损伤。要注意避免使用原料尚未腐解或是散发恶臭气味的堆肥,尽可能使用腐熟良好的堆肥。

干牛粪与干马粪是动物性原料堆肥,与其说是肥料,倒不如说是改良土质的材料。由于牛粪本身就含有盐分,所以要选择腐熟度好的、去除了盐分的堆肥。

泥炭土对于改善排水性及保水性、透气性十分有效。根据其产地与腐熟度不同,品质也良莠不齐,因此要尽可能选择含有较长植物纤维的泥炭土。

如果是使用市面上销售的培养土在花盆中种植的话,也可以加入堆肥等用来改良土质。



4 在哪里种植好?

为了使植株茁壮生长、开出更美的花朵,关键的一点是要选择光照充足、通风良好的场所来进行栽培。不仅仅是蔷薇,所有的植物都是如此。

光照

最好是种植在能保证光照时间超过半天的场所,如果满足不了,至少也要种植在上午能晒3~4个小时太阳的地方。

通风

良好的通风也是关键点之一。如果植株四周草木密集、不通风,湿气就会很重,植株就会变得孱弱,其结果就会导致病虫害多发。另一方面,要是种植在强风口处,则又会变得易干燥、叶与茎摩擦受损。

使用花盆栽培的话,一定要避免将花盆直接放置在反射率高的水泥地面上。因为这样会使植株根部被灼伤。可以用竹片或砖块等将花盆垫高,形成一条通风道。





5 蔷薇花苗的扦插方法

地栽

首先挖好一个直径 50 厘米、深度 50 厘米左右的坑。先把土刨出来，然后在坑底放入大约 0.01 立方米的堆肥及牛粪、泥炭土等，充分和匀。然后将土填回坑中，再插苗。

如果是大苗，就要注意使其分散的根部牢牢插入土中，并且一定要使其接穗部分露在土外。将植株周围的土堆成多纳圈状，使浇灌的水不易流失（像水盆一样），再浇透水。接下来立一根木棍做支柱，固定花苗。要使土壤经常处于湿润状态直至大苗扎牢根，这一点非常关键。

新苗与盆栽花苗也依法炮制，先备好土坑，然后将花苗从盆中取出、种到地上。

6 关于肥料

元肥

蔷薇是一种需要大量优质营养成分的植物。因此尤为重要的一点就是在扦插时及冬、夏季节施以元肥。所谓施元肥即刨开距植株 30 厘米左右处的土，埋入缓效性有机肥。

植物在生长时所必需的营养成分有三种：氮、磷酸、钾。氮主要促进叶与茎生长，磷酸促进花与果实生长，钾促进根部发育。用于蔷薇的话，这三种成分的比例最好维持在 1 : 2 : 1。肥料大致分为三种：从动植物中提炼出来的油渣肥与骨粉肥等有机肥，化学合成的无机肥料，含有三种营养成分中的至少两种，称为复混肥。有机肥见效慢，但是肥效长。而另一方面，复混肥既有缓效性的种类，也有速效性的种类。请掌握好这两种肥料的特性，“因花施肥”。

油渣肥



复混肥



有机复合肥



礼肥

如果是四季开花的蔷薇，就一定要在 6 月与 11 月施礼肥。施礼肥的时机不是刚开花以后，而是在花全部盛开后，这时施肥最有效。方法是将粒状的有机肥埋入植株周围的土壤中。

发芽肥

从 3 月发芽至开花这一期间要施发芽肥。速效性复混肥与液肥也是不错的选择。

将复混肥与有机肥混合在一起制成的“有机复合肥”也很值得推荐。它的肥效长、效力稳定，因此可以定期进行施肥。

7 病虫害

防治病虫害最关键的一点就是规范种植用土及种植场所等栽培环境，这样就不易发生病虫害了。具体可参考第 17 页。

黑星病

“黑星病”是最为棘手的病害，病株叶子上会生出黑斑，最终叶片全部凋落。在除冬季以外的季节发病。其成因在于土壤中的真菌随雨水等溅起并附着在叶片上，因此可使用稻草秸等覆盖住植株周围的土地，这样可在一定程度上预防黑星病。



白粉病

“白粉病”就是在新芽、嫩叶、花梗部分出现好似覆盖着白色粉末一般的症状。植株受到病害的部分会萎缩，发育不良。这种病害多发于昼夜温差过大的春秋季节。要留意修剪多余的枝条并且保持良好的通风状态，勤剪枯叶与开败后的花朵。蔷薇中既有容易得白粉病的品种，也有抗病性较强的品种，因此在挑选品种的阶段就要考虑周全，这一点很重要。

蚜虫

蚜虫出现在早春时节，它们群集在新芽及花苞最柔软的部分，吸取树液。其排泄出的液体会导致煤污病，除此之外还会传播锈病。蚜虫可以用手摘除，但在虫害严重时喷洒农药更为有效。蚜虫的天敌是瓢虫、蜉蝣以及食蚜蝇的幼虫等。



月季叶蜂

月季叶蜂的成虫体长约 2 厘米，身体为黑色，腹部为橘色，它会将尾部刺针刺入新芽的茎中产卵。孵化出的幼虫会以迅猛之势将植株嫩叶全部蛀食光。如果发现已被产卵的枝条一定要尽快做剪除处理。



天牛

天牛对于蔷薇来说是危害最大的害虫。其幼虫别称锯树郎，会从植株根部钻入、将木质部蛀食一空。这时幼虫会将如同木屑一般的粪便从钻入的洞眼处排出，因此一旦发现虫粪就要仔细寻找洞眼，然后用金属丝等物插入洞眼消灭幼虫。此外将农药注入洞眼也十分有效。



介壳虫

介壳虫的体表覆盖着一层白色蜡状物质，这种害虫附着在植株茎部吸取树液。它容易繁殖在弱苗上，使其发育不良。可以用废弃的牙刷等将它刷除来进行驱虫。

农药

关于在蔷薇上喷洒农药这件事，大概每个人的想法都不同。如果想好要打农药，就得提前做好准备，比如弄清器具的使用方法 & 喷洒农药的方法等，还要严格遵守农药的用法用量。

现在也有越来越多的人希望使用来源于天然的园艺材料，进行无农药蔷薇栽培。有人将“木醋液”或“大蒜精华液”等充当农药来使用，据说它们对于病虫害有时能起到一些效果，但由于制造方法不规范，所以成分并不统一。即使是成分来源于天然的农药，其中也有一部分对人体是有害的，请在理解了这一点之后再根据自己的判断来使用，后果由使用者本人自行承担。





5 蔷薇花苗的扦插方法

地栽

首先挖好一个直径 50 厘米、深度 50 厘米左右的坑。先把土刨出来，然后在坑底放入大约 0.01 立方米的堆肥及牛粪、泥炭土等，充分和匀。然后将土填回坑中，再插苗。

如果是大苗，就要注意使其分散的根部牢牢插入土中，并且一定要使其接穗部分露在土外。将植株周围的土堆成多纳圈状，使浇灌的水不易流失（像水盆一样），再浇透水。接下来立一根木棍做支柱，固定花苗。要使土壤经常处于湿润状态直至大苗扎牢根，这一点非常关键。

新苗与盆栽花苗也依法炮制，先备好土坑，然后将花苗从盆中取出、种到地上。

6 关于肥料

元肥

蔷薇是一种需要大量优质营养成分的植物。因此尤为重要的一点就是在扦插时及冬、夏季节施以元肥。所谓施元肥即刨开距植株 30 厘米左右处的土，埋入缓效性有机肥。

植物在生长时所必需的营养成分有三种：氮、磷酸、钾。氮主要促进叶与茎生长，磷酸促进花与果实生长，钾促进根部发育。用于蔷薇的话，这三种成分的比例最好维持在 1 : 2 : 1。肥料大致分为三种：从动植物中提炼出来的油渣肥与骨粉肥等有机肥，化学合成的无机肥料，含有三种营养成分中的至少两种，称为复混肥。有机肥见效慢，但是肥效长。而另一方面，复混肥既有缓效性的种类，也有速效性的种类。请掌握好这两种肥料的特性，“因花施肥”。

油渣肥



复混肥



有机复合肥



礼肥

如果是四季开花的蔷薇，就一定要在 6 月与 11 月施礼肥。施礼肥的时机不是刚开花以后，而是在花全部盛开后，这时施肥最有效。方法是将粒状的有机肥埋入植株周围的土壤中。

发芽肥

从 3 月发芽至开花这一期间要施发芽肥。速效性复混肥与液肥也是不错的选择。

将复混肥与有机肥混合在一起制成的“有机复合肥”也很值得推荐。它的肥效长、效力稳定，因此可以定期进行施肥。

花型

蔷薇花型有多种名称。一般分为6~11种，但各自的花型与名称分类并不精确。

部分蔷薇花型从绽放至开败是有变化的，因此在本书品种信息中也加注了这些变化，比如“由○○型变为○○型”。生长状况不同，花型也会产生变化，因此实际花型并不一定都与图鉴中刊载的一模一样。



深杯型

外侧花瓣向内、紧密包裹住内侧花瓣的花型叫作杯型。其中呈深杯状的花型被称为深杯型。



开杯型

在杯型中，开杯型花瓣也是向内包裹、但能够看见中央花蕊。



浅杯型

花瓣呈浅杯状开放的花型。



莲座型

许多花瓣重叠在一起、呈圆形放射状开放的花型。




四分莲座型

在莲座型中，中央的花瓣看起来分为四份的花型。



单瓣型

一般花瓣有5片，在同一层平面内开放。也叫作平展型。



半重瓣型

花瓣数量在6~25片左右，直至花朵盛开时才能看到中央的花蕊。



剑瓣高芯型

外侧花瓣边儿翻卷，形成像剑一样尖锐的形状。中心部分突出。这种花型给人以一种轮廓分明的印象，在现代月季中很常见。



半剑瓣型

虽然这种花型的中心部分也突出，但花瓣翻卷得没有那么厉害。形状较为圆润，给人的印象比剑瓣型要柔和。



绒球型

花瓣小小的、密集在一起，花型圆润饱满。



圆瓣环抱型

花瓣圆润，外侧花瓣边儿不翻卷、环抱着中心开放。

蔷薇的分类

据说现在全球正式登记名称的蔷薇品种约为2万种，但是它们的分类方式尚未统一。如果大致区分一下的话，应分为3种：原变种、古典玫瑰、现代月季。

在本书的蔷薇品种标示中，品种名后面注有英文缩写。这样的缩写便于你了解品种及其性质。

这种缩写的使用方法尚无统一规范，各个种苗公司可能略有差异。



原种·原变种 Species

Sp

原生种蔷薇，原种，人们认为这一系统是现代蔷薇的祖先。

古典玫瑰 Old Roses

T P N M HP G D Ch C Bslt B A

香水月季系，这一系统被视为灌木性四季开花种类的祖先。

波特兰玫瑰系，这一系统多为反季开花性。

诺伊氏蔷薇系，这一系统的特征是：花朵娇小，花色多为浅绿色。

苔蔷薇系，这一系统的特征是：在花梗及花萼处密生着腺毛。

杂交长春月季系，这一系统花朵硕大，被视为杂交茶香月季的祖先。

法国蔷薇系，这一系统花色多为深紫红色系，一季开花性。

大马士革玫瑰系，这一系统十分馥郁，常用作香料。

中国月季系，这一系统被当作四季开花性月季的亲本。

百叶蔷薇系，这一系统花瓣数量多。

波尔索月季系，这一系统花期早，无刺。

波旁玫瑰系，这一系统花朵硕大且多花。

白玫瑰系，这一系统的特征是：花色为浅绿色，叶子带有青色。

现代月季 Modern Roses

Cl Hmsk S R Pol Min HT F En

藤本（攀缘）月季，这一系统呈藤蔓性。细分为很多种。

杂交麝香月季，这一系统多花，四季开花性明显。

小灌木型月季，这一系统呈半蔓性。

蔓性蔷薇，这一系统呈藤蔓性，一季开花性。

多花蔷薇，这一系统花朵娇小，成簇开放。

微型月季，这一系统花朵娇小，植株整体都很矮小。

杂交茶香月季，这一系统花朵硕大，四季开花性。

丰花月季，这一系统花朵大小适中，四季开花性。

英国月季，由英国人大卫·奥斯汀所培育出的品种群。

* 系统分类上方的字母就是英文缩写。