

日 本 国

医 师 国 家 考 试 试 题

第 一 集

中国医科大学教务处编译

前 言

这是日本国医师国家考试第69次（1980年春）试题。整个试题分为A、B、C三部分，A、B各为100题，C为60题。

题为多重选择题（Multiple Choice Question, 省写M、C、Q），其特点是：增加在一定场合下可以检验的知识量；分成“中间测验”或“期末考试”多次进行评定，以便对学生的能力、知识和态度有较全面的了解；短时间可以考试很多人，容易评分等等。

多重选择题最简单的形式包括：1. 开头的描述部分（可以是一个病例）；2. 几个可能的结尾部分（答案），它们可以是对的或错的。学生应划出哪些是对的哪些是错的。大约一分钟可填一个问题，每题4～5项。对这样测验都是答对一项给一分，答错一项倒扣一分。

我们请苏正身同志译，丑述贤、姚承禹、金济霖同志校，准备连续介绍1980、1981两年的日本国医师国家考题（69～72次），供我校高年级同学学习参考，以不断扩大知识面，提高自学能力和分析问题与解决问题的能力，切实提高教学质量。

中国医科大学 教务处

一九八二年三月四日

目 录

69A	1—20
69B	21—39
69C	40—57
第69次标准答案	58
第69次医师国家考试题 (C 另册)	
70A	59—77
70B	78—96
70C	97—114
第70次标准答案	115
第70次医师国家考试题 (C 另册)	

69 A

考题数为100问，答题时间是2小时10分整。每题有5个答案，从中选出一个适合于本题的答案，填入试卷。

1. 下列哪个是从子宫颈到达骨盆侧壁的韧带？
a 子宫阔韧带 b 主韧带 c 骶子宫韧带
d 固有卵巢索 e 骨盆漏斗韧带
2. 下列有关促性腺激素的问题，哪项是正确的？
a 在多囊卵泡巢患者，LH值增高。
b 在Turner综合征卵泡刺激素显示低值。
c 在闭经后的妇女，卵泡刺激素、黄体生成素都少。
d 在儿童期，黄体生成素比卵泡刺激素增加得早。
e 子宫性闭经时，卵泡刺激素呈高值。
3. 关于子宫颈内膜上皮癌，哪项是正确的？
a 子宫颈的鳞状上皮区域是好发部位。
b 根据细胞学诊断，多半能同发育异常相鉴别。
c 用阴道镜扩大检查（包括子宫颈法 colposcopy 检查），多半能同微浸润癌相鉴别。
d 有时可见阴道壁浸润。
e 有时可见淋巴结转移。
4. 判定胎儿成熟程度，下列检查法哪项是适用的？
a 催产素（oxytocin challenge test）作用试验。
b 孕妇尿中雌激素测定。
c 孕妇血中 α -胎儿球蛋白测定。
d 羊水中硷性磷酸酶测定。
e 以上都不是。
5. 下列哪项与胎势有关？
a 头位 b 骨盆位 c 斜位 d 横位 e 屈位
6. 下列哪项应该是刚出生正常成熟儿1分钟的心跳数与呼吸数？

	心跳数	呼吸数
a	180	60~80
b	160	40~60
c	140	60~80

d 120 40~60

e 110 60~80

7. 关于不孕, 下列哪项是**错误的**?

- a 结婚后3年之内大约90%的人怀孕。
- b 连续3次以上的反复流产, 称为习惯性流产。
- c 大约50%的不孕原因不清楚。
- d 女性不孕约有20~30%系排卵障碍所致。
- e 通常在排卵后进行子宫内膜检查。

8. 关于老化现象, 下列哪个是**错误的**?

- a 乳儿期(生后六个月左右)的子宫, 同刚出生时相比, 其重量减少了。
- b 儿童期(8岁时)的卵巢也有发育的卵泡。
- c 在青春期, 子宫颈部比子宫体部大。
- d 原始卵泡随年龄的增长而减少。
- e 经绝后, 血中促性腺激素量增加。

9. 下列哪一项是**错误的**?

- a 枕前位的儿头, 其大斜径的周边通过产道。
- b 低横位进行中的分娩, 其经过是胎儿的枕侧向下且横卧。
- c 第一额(头)位分娩的产瘤, 出现于大囟门右面。
- d 枕后位进行的分娩, 多为枕前位娩出。
- e 骨盆位分娩的胎儿的预后, 单臀位者要比足位者好。

10. 在月经周期正常的子宫内膜, 其黄体期初期的所见是哪项?

- (1) 腺腔内有分泌
- (2) 间质浮肿
- (3) 腺腔迂曲化
- (4) 核下有空泡
- (5) 假脱落膜变化

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

11. 关于胎生期的性分化, 下列哪项是正确的?

- (1) 胎儿的脑垂体不分泌促性腺激素。
- (2) 女婴卵巢分泌的性激素参予女性生殖器的分化。
- (3) 阴道缺损症系性染色体异常所致。
- (4) 肾上腺一生殖器综合征多由于正常染色体的劣性遗传引起的。
- (5) Turner综合征者, 在胎儿期性腺分化即已停止。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

12. 下列哪一项是正确的?

- (1) 子宫体部的淋巴液也可直接流入腹股沟淋巴结。

- (2) 副交感神经沿基韧带走行。
- (3) 阴道下部的淋巴液, 首先流入髂内淋巴结。
- (4) 膀胱神经由闭孔神经分支而来。
- (5) 侧脐韧带从髂外动脉分支而来。

a (1)、(2)、 b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

13. 关于子宫内膜症, 下列哪一项是正确的?

- (1) 于卵巢最多见。
- (2) 见于输卵管角时, 称异位子宫内膜症。
- (3) 往往成为不孕的原因。
- (4) 用孕激素剂治疗。
- (5) 易发生于青春期。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

14. 下列哪一项是正确的?

- (1) 腹膜假粘液瘤预后良好。
- (2) 超声波断层法对于巨大卵巢浆液性囊肿同腹水的鉴别是有用的。
- (3) 卵巢肿瘤中, 实质性肿瘤的发生率约为10~20%。
- (4) 两侧卵巢同时发生皮样囊肿的病例是没有的。
- (5) 卵巢囊肿患者的基础体温曲线多为单相性的。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

15. 下列卵巢肿瘤中, 哪项是年轻妇女容易罹患的?

- (1) 粘液性囊腺癌
- (2) 浆液性囊腺癌
- (3) Brnner瘤
- (4) 未分化胚细胞瘤
- (5) 皮样囊肿

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

16. 下列组合中, 哪项关系最密切?

- (1) 子宫体癌——阴道扩大镜检查法
- (2) 水泡样胎块——超声波断层法
- (3) 卵巢胎儿性癌—— α -胎儿球蛋白
- (4) 子宫颈癌——骨盆动脉造影
- (5) 子宫内膜粘连症——Rubin 试验 (输卵管通气试验)

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

17. 下列哪一项是正确的?

- (1) 水泡样胎块妊娠时, 多并发妊娠剧吐。
- (2) 孕卵死亡, 具有长期持续的少量流血者称为过期流产。
- (3) 测定尿中雌二醇, 对于判定妊娠初期的紧迫流产的预后是有用的。
- (4) 输卵管妊娠, 在发生部位上, 峡部多于膨大部。
- (5) 对于胎盘机能不全的诊断, 尿中胎盘催乳素(hpl)值可作参考。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

18. 关于正常分娩的第一产程, 下述哪项是正确的?

- (1) 儿头一经固定于骨盆入口部, 便发生破水。
- (2) 在初产妇, 子宫颈消失后, 子宫外口便开大。
- (3) 生理收缩环有时可达到耻骨联合上2横指。
- (4) 阵痛发作时加腹压。
- (5) 儿头第1旋转达到骨盆底时, 第一产程结束。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

19. 下列哪项不正确?

- (1) 输卵管积水的液体, 多半可查出细菌。
- (2) 对于产褥期的急性子宫内膜炎, 应立即进行内膜刮除。
- (3) 滴虫性阴道白带的特点是混有泡沫。
- (4) 长期大量使用抗菌素容易引起念珠菌性阴道炎。
- (5) 子宫积脓多合并子宫内膜癌。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

20. 关于绒毛膜癌(绒毛膜上皮瘤), 下列哪项是错误的?

- (1) 通常是合体细胞远远多于Langhans细胞。
- (2) 绒毛结构中缺乏血管。
- (3) 在流产或正常分娩后可发生此种癌。
- (4) 根据骨盆动脉摄影, 可见到中心性血管供应缺乏状态。
- (5) 肺转移一般是下野多于上野。

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)

d (3)、(4) e (4)、(5)

21. 下列哪项伴有乳汁漏泄?

- (1) Sheehan 综合征
- (2) Stein-Leventhal 综合征
- (3) Forbes-Albright 综合征
- (4) Chiori-Frommel 综合征
- (5) Cushing 综合征

- a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)
22. 关于妊娠中毒症, 下列哪项是错误的?
(1) 在轻型病例浮肿也有波及全身者。
(2) 尿蛋白达500mg/dl以上者为重型。
(3) 纯型的最早前驱症状多为浮肿。
(4) 原发性高血压病合并妊娠中毒症者, 称为混合型。
(5) 尿蛋白愈多, 胎儿的预后愈坏。
a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)
23. 关于正常分娩的产程, 下列哪项是正确的?
(1) 收缩环组织学产生于子宫内口的外面。
(2) 儿头的固定, 在初产妇要比经产妇早。
(3) 第四旋转靠胎儿的肩甲旋转来进行。
(4) 儿头的小斜径缩短。
(5) 胎盘的剥离是由后血肿引起的。
a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)
24. 孕妇骨盆的X光检查, 宜用下列哪项方法?
(1) Seitz 法 (2) Martius法
(3) Guthmann 法 (4) Hodge 法
a 仅用(1)、(3)、(4) b 仅用(1)、(2)
c 仅用(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
25. 下列各组合, 关系成立的是哪项?
(1) 子宫破裂——迁延横位
(2) 腹壁月经瘻——剖腹产
(3) 颈管裂伤——产钳分娩
(4) 子宫穿孔——人工中止妊娠
a (1)、(3)、(4)成立 b (1)、(2)成立
c (2)、(3)成立 d 只有(4)成立
e (1)~(4)全部成立
26. 关于绒毛膜疾患, 下列哪项是正确的?
(1) 水泡样胎块对分娩的出现率, 在日本和在欧美没有差别。
(2) 水泡样胎块娩出后, 基础体温曲线如呈双相, 就不能发生绒癌(绒毛膜上皮瘤)。
(3) 水泡样胎块娩出后, 约60%病例发生绒癌。

- (4) 对于破坏性水泡样胎块, 同绒癌相比, 化学疗法多半有效。
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
27. 关于正常妊娠, 下列哪项是正确的?
- (1) 在妊娠后期, 可见血浆量相对增加。
(2) 血沉随妊娠的进行而加速。
(3) 妊娠子宫增大主要是肌细胞增殖所致。
(4) 妊娠后半期体重增加, 每周平均为500g以上。
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
28. 关于盆不称(Cephalopelvic disproportion, CPD)的Friedman曲线, 哪项是正确的?
- (1) 缓慢期缩短
(2) 加速期早现
(3) 减速期早现
(4) 子宫口开大继发停止
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
29. 下列哪项与DIC关系最密切?
- (1) 常位胎盘早期剥离
(2) 子宫内胎儿死亡
(3) 羊水栓塞症
(4) 重产褥感染
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
30. 下列哪一项在围产期死亡率高?
- (1) 头盆不称
(2) 妊娠中毒症
(3) 胎儿附件异常
(4) 先天异常
(5) 新生儿溶血性疾患
- a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)
31. 作为流行性腮腺炎的神经系并发症, 下列哪项最多见?
- a Parkinson综合征
b 多发性神经病(neuropathy)
c 视神经萎缩
d 聋

- e 低能
32. 在主动脉瓣狭窄症,通常能见到下列哪个病征?
- a 肩手综合征 (Shoulder-hand Syndrome)
 - b 脑脓肿
 - c 脑栓塞症
 - d 脑血栓症
 - e 昏厥发作
33. 64岁男性。突然双下肢麻痹,脐以下温、痛觉消失,并有膀胱直肠障碍。
- 下列哪项首先应该考虑的?
- a 大脑前动脉闭塞
 - b 脊髓前动脉闭塞
 - c 颈部变形性脊椎病
 - d 腰髓脊髓空洞症
 - e 脊髓后动脉闭塞
34. 在正常近端肾小管,下列哪项被完全重吸收?
- a 甘露醇
 - b 尿酸
 - c 维生素C
 - d 菊粉
 - e 肌酐
35. 下列各种高血压,哪项适于使用 β 受体阻断剂?
- a 伴有 Raynaud 综合征的高血压
 - b 伴有支气管喘息的高血压
 - c 伴有间歇跛行的高血压
 - d 伴有 Adams-stokes 综合征的高血压
 - e 伴有特发性肥大性心脏病的高血压
36. 下列哪一项适于用来改善再生障碍性贫血病人的造血机能?
- a 脾摘除 b 叶酸 c 肾上腺皮质类固醇
 - d 蛋白质同化类固醇 e 维生素B₆
37. 35岁男性。从两个月前开始,易疲劳,一直有微热,体重减轻,但仍坚持工作。查体:在心尖部可听到调高的整个收缩期杂音。淋巴结未见肿大,肝脾也不大。白细胞数为11,000。在决定治疗方法上,下列检查哪项最重要?
- a 超声心动图
 - b 骨髓像
 - c 胸部X线照像
 - d 抗链球菌溶血素-O (ASO, ASLO)
 - e 血培养
38. 在血友病A,下列哪一项是正确的?

- (1) 出血时间延长
- (2) 全凝血时间延长
- (3) 部分凝血致活酶时间 (PTT) 延长
- (4) 毛细血管脆性增大
- (5) 凝血酶原时间延长

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

39. 关于石棉肺,下列哪项是正确的?

- (1) 容易合并肺癌。
- (2) 容易合并胸膜炎。
- (3) 合并肺结核者比矽肺少。
- (4) 胸部X线像可见卵壳状钙化。
- (5) 胸部X线像可见块状阴影。

a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)

40. 在过敏性肺炎,能见到下列哪项征候?

- (1) 发烧
- (2) 限制性肺功能障碍
- (3) 杵状指
- (4) 阻塞性肺功能障碍
- (5) 两侧肺门淋巴结肿胀

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

41. 下列物质哪个对结核菌以外的细菌有抗菌作用?

- (1) 利福霉素
- (2) 异烟肼
- (3) 乙胺丁醇
- (4) PAS
- (5) 卡那霉素

a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

42. 下列组合,哪项是正确的?

- (1) anisakis (寄生线虫) ——肝脾大
- (2) 丝虫——乳糜尿
- (3) 日本住血吸虫——发烧
- (4) 颌口虫——移动性浮肿
- (5) 横川吸虫——黄疸

- a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)

43. 急性心肌梗塞患者开始频频出现心室性期外收缩, 哪个药物不宜使用?

- (1) 毛地黄
(2) 去甲肾上腺素
(3) 奎尼丁
(4) 利多卡因
(5) 普罗卡因酰胺

- a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)

44. 关于 α -胎儿球蛋白, 下列哪项是正确的?

- (1) 对转移性肝癌的确诊有用。
(2) 非肿瘤性疾患有时也呈现暂时的高值。
(3) 若持续增殖, 肝癌的可能性增大。
(4) 在结肠癌, 往往呈阳性。

- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

45. 关于结肠息肉病变, 哪项是正确的?

- (1) 在 Pentz-Jeghers 综合征, 多并发骨肿瘤。
(2) 家族性结肠息肉病变癌变率高。
(3) 结肠绒毛肿物是癌的可能性很大。
(4) 直径 1 cm 以下的孤立性结肠息肉是癌的可能性小。
(5) Gardner 综合征的息肉是错构瘤。

- a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)

46. 下列组合中, 哪项是恰当的?

- (1) 绿脓杆菌肺炎——氨苄青霉素
(2) 腹股沟淋巴肉芽肿病——四环素
(3) 支原体性肺炎——红霉素
(4) 拟杆菌脓胸——链霉素
(5) 沙雷氏菌肺炎——氨苄青霉素

- a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)
c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)
e (3)、(4)、(5)

47. 哪项是正确的组合?

- (1) 脑垂体嫌色素性腺瘤——高生乳素血症

(2) 骨髓瘤——淀粉样变性

(3) 胰岛素瘤——羸瘦病

(4) 胰高血糖素瘤——低血糖

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

48. 哪项是正确的组合?

(1) 鸽——芽生菌病

(2) 山羊——野兔病

(3) 猫——弓形体病

(4) 狗——包虫病

a 仅为(1)、(2)、(3) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

49. 下列哪项可见核间性眼肌麻痹(内侧丘系综合征)疾患?

(1) 化脓性脑膜炎

(2) 多发性硬化症

(3) 脑血管障碍

(4) 单纯性疱疹脑炎

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

50. 在脑血栓症中,下列哪一项可见同名偏盲?

(1) 颈内动脉闭塞

(2) 大脑前动脉闭塞

(3) 椎动脉闭塞

(4) 大脑中动脉闭塞

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

51. 下列哪一项可见脑脊液蛋白质增加?

(1) 粘液水肿性昏迷

(2) 常压脑积水

(3) 糖尿病性多发性神经病(neuroPathy)

(4) 脑溢血

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

52. 下列哪一项容易并发慢性酒精中毒?

(1) 多发性神经病(neuroPathy)

(2) 肌无力综合征

(3) 小脑性运动失调

(4) Wernicke 脑病(炎)

- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
53. 对于急性肾小球肾炎,下列哪项是正确的?
(1) 起因是绿色链球菌感染。
(2) 基膜上有抗原-抗体复合物沉着。
(3) 高血压的起因是肾小球滤过率减少。
(4) 尿呈低比重。
a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
54. 关于全身性红斑狼疮,下列哪项是正确的?
(1) 狼疮肾炎是初发症状之一。
(2) 血中 IgG 增加。
(3) 细胞免疫机能低下。
(4) 肾病变决定预后。
a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
55. 普通X线照片上呈阴影的尿路结石是哪项?
(1) 草酸盐结石
(2) 磷酸钙结石
(3) 黄嘌呤结石
(4) 尿酸盐结石
a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
56. 关于结核菌素反应,下列哪项是正确的?
(1) 服用抗结核药则减弱。
(2) 卡介苗接种后约四周便转为阳性。
(3) 在肉样瘤病,转阴多。
(4) 发红直径在 15mm 以下者为阴性。
(5) 如为阴性,可否定结核病。
a (1)、(2) b (1)、(5) c (2)、(3)
d (3)、(4) e (4)、(5)
57. 关于肾性骨营养障碍,下列哪项是正确的?
(1) 不发生骨软化病。
(2) 有维生素 D 代谢障碍。
(3) 甲状旁腺机能亢进。
(4) 肠管吸收钙增加。
a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

58. 做水负荷实验, 结果血浆渗透压为 270msm/L, 尿渗压为 380msm/L。此时应考虑下列哪项?
- (1) ACTH 单独缺乏
 - (2) 产生 ADH 的肺癌
 - (3) 脱水
 - (4) 肾性尿崩症
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
59. 下列哪项是正确的组合?
- (1) 甲状旁腺机能低下——Ellsworth-Howard 试验
 - (2) 肾上腺皮质机能低下——胰高血糖素试验
 - (3) 肾上腺皮质机能低下——ACTH 试验
 - (4) 肢端肥大症——促甲状腺素释放激素试验
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
60. 关于 T 淋巴细胞及 B 淋巴细胞, 下列哪项是共同的?
- (1) 存在于淋巴结。
 - (2) 存在于周围血液中。
 - (3) 用荧光抗体法, 可看到膜表面有免疫球蛋白。
 - (4) 同 IV 型变态反应有关。
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
61. 某人昨早因胸痛发作来院。下列左侧化验值同右侧诊断病名相应者是哪项? (GOT40单位以下, GPT35单位以下, 为正常值)
- (1) GOT26单位、GPT24单位——夹层动脉瘤
 - (2) GOT130单位、GPT150单位——伴有右心功能不全的肺栓塞病
 - (3) GOT20单位、GPT16单位——自发气胸
 - (4) GOT150单位、GPT40单位——急性心肌梗塞
- a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)
c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部
62. 下列组合中, 哪项配伍是错误的?
- a 乙胺丁醇(氨基乙胺丁醇)——利福霉素
 - b 左旋多巴——维生素B₆
 - c 去甲肾上腺素——氨茶碱
 - d 庆大霉素——氨苄青霉素
 - e thiagedes——心得安
63. 在心电图 V₆ 导联上没有 Q 波, 下列哪项有此特点?
- (1) Duchenne 型肌营养不良

(2) 心室间隔缺损

(3) 后壁侧壁梗塞

(4) 左束支完全传导阻滞

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

64. 下列哪项有脑梗塞合并症?

(1) 急性心肌梗塞

(2) 心室间隔缺损

(3) 左房粘液瘤

(4) 二尖瓣狭窄

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

65. 血浆肾素活性和血浆醛固酮值不平行的是哪项?

(1) Bartter 综合征

(2) 产生肾素的肿瘤

(3) 肾血管性高血压

(4) 原发性醛固酮病

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

66. 对于氯丙嗪引起的肝损害,下列化验值中,通常升高的是哪项?

(1) 血清总胆红素值

(2) 血清硷性磷酸酶活性

(3) 血清转氨酶活性

(4) 血清总胆固醇值

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

67. 关于缺铁性贫血,下列哪项是正确的?

a 骨髓像中,铁母细胞有增加倾向。

b 在铁动力学方面,血浆铁消失速度(PID_2^T)延迟。

c 在胃切除病人,经口给铁剂无效。

d 经口给铁剂一经开始,结合不饱和铁的能力便可正常化。

e 以上都不对。

68. 关于输血,下列哪项是正确的?

(1) 对慢性肾功能不全者的贫血,最好给新鲜的洗涤红细胞。

(2) 周围血中粒细胞数如为 $1\,000/\text{mm}^3$,可进行粒细胞输血。

(3) 某供血者的血液,输血一次未见副作用,以后再用,每次都会是安全的。

(4) 血小板中有 HLA 抗原

(5) 冷沉淀处理 Von Willebrand 病例的止血是有效的。

a (1)、(2)、(3) b (1)、(2)、(5)

c (1)、(4)、(5) d (2)、(3)、(4)

e (3)、(4)、(5)

69. 关于糖尿病, 下列哪项是错误的?

(1) 对成年始发的肥胖者, 在治疗上首选应是给予磺酰基尿素。

(2) 成年发胖者对胰岛素有依赖性。

(3) 用胰岛素治疗过程中, 为了观察治疗效果, 需要作葡萄糖负荷试验。

(4) 同成年发病者相比, 幼年发病例多半在家族里发病。

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

70. 下列各项的测定数值, 哪项会随着年龄的增高而降低或减少?

(1) 肺活量

(2) 血清白蛋白

(3) 空腹血糖

(4) 细胞外液量

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

71. 关于胃液, 下列哪项是正确的?

(1) Zollinger-Ellison 综合征患者, 基础酸分泌量低。

(2) 胰泌素抑制胃酸分泌。

(3) 血钙增加, 可刺激胃酸分泌。

(4) 胃蛋白酶的最适 PH 值约为 5。

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

b 为仅(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

72. 关于慢性胰腺炎, 下列哪项是正确的?

(1) 疼痛是胰酶漏到腹腔引起的。

(2) 酒精性胰腺炎病例无胰结石。

(3) 不能构成低血糖的病因。

(4) 多合并胆囊疾患。

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)

c 仅为(2)、(3) d 只有(4) e (1)~(4)全部

73. 关假膜性结肠炎, 下列哪项是正确的?

(1) 它的病因同投予抗生素有关。

(2) 出现高热。

(3) 引起多次水样腹泻。

(4) 老年人易患此病。

a 仅为(1)、(3)、(4) b 仅为(1)、(2)