

御纂醫宗金鑑

卷四十四

四十五



御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣目錄

調經門

婦科總括

天癸月經之原

婦人不孕之故

月經之常

月經異常

外因經病

內因經病

不內外因經病

血色不正病因

氣穢清濁病因

經期前後多少病因

經行發熱時熱

經行寒熱身痛

經行腹痛



經行瀉吐

錯經妄行成吐衄崩

經水過多兼時下白帶

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散

歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

人參養榮湯

理中湯

四物湯

桂枝四物湯

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩朮四物湯

桃紅四物湯

當歸補血湯

聖愈湯

薑芩四物湯

佛手散

過期證治

過期飲

雙和飲

聖愈湯

人參養榮湯

經行發熱時熱證治

加味地骨皮飲

大神湯

逍遙散

經行寒熱身痛證治

羌桂四物湯

逍遙散

黃耆建中湯

經行腹痛證治

當歸建中湯

加味烏藥湯

琥珀散

大溫經湯

吳茱

經行吐瀉證治

參苓白朮散

湯中理

七味白朮散

香砂六君子湯

錯經妄行吐衄崩證治

三黃四物湯

犀角地黃湯

經閉門

血滯經閉

血虧經閉

血枯經閉

經閉久嗽成勞

婦人經斷復來

室女經來復止

師尼室寡經閉

血滯經閉證治

三和湯

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯

血枯血虧經閉證治

六味地黃湯

玉燭散

養榮湯

十全大補湯

經閉久嗽成勞證治

切勞散

婦人經斷復來證治

芩心丸

益陰煎

十全大補湯

八珍湯

逍遙散

歸脾湯

室女師尼寡婦經閉證治

大黃廩蟲丸

澤蘭葉湯

栢子仁丸

逍遙散

婦病難治

診看婦人須先問經期妊娠

酸漿藥

治

結毒破人尿決問惡腹致

酸漿藥

酸漿藥

大黃煎藥水

大黃煎藥水

室女神效藥

室女神效藥

室女神效藥

室女神效藥

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治所異調經崩帶癥瘕胎前並產後前陰乳

疾不相同

註婦人諸病本與男子無異故同其治也其異於男子者惟

天調經經閉帶濁崩漏癥瘕生育子嗣胎前產後諸病及乳

天疾前陰諸證不相同耳故立婦人一科以分門而詳治焉

業是科者必先讀方脈心法諸書然後讀此白有豁然貫

通之妙

天癸月經之原

先天天癸始父母後天精血水穀生女子二七天癸至任通衝
盛月事行

註

先天天癸謂腎間之動氣乃稟自父母資其始也後天精
血謂水穀之所化得之形成之後資其生也經曰女子二
七而腎氣盛謂腎間動氣盛也二七而天癸至謂先天癸
水中之動氣至於女子胞中也衝爲血海任主胞胎衝任
皆起於胞中所以任脈通太衝脈盛月事以時下故能有

子也

婦人不孕之故

不孕之故傷任衝不調帶下經漏崩或因積血胞寒熱痰飲脂

膜病子宮

註

女子不孕之故由傷其任衝也經曰女子二七而天癸至
任脈通太衝脈盛月事以時下故能有子若爲三因之邪
傷其衝任之脈則有月經不調赤白帶下經漏經崩等病
生焉或因宿血積於胞中新血不能成孕或因胞寒胞熱
不能攝精成孕或因體盛痰多脂膜連塞胞中而不孕皆
當細審其因按症調治自能有子也

月經之常

月經三旬時一下兩月並月三居經一年一至爲避年一生不
至孕暗經

註女子陰類也以血爲主其血上應太陰下應海潮月有盈
虧潮有朝夕月經三旬一下與之相符故又謂之月水月
信也女子月經一月一行者其常也或先或後乃其病也
然亦有兩月一行謂之並月者有三月一行謂之居經者
有一年一行謂之避年者有一生不行而依然能孕育謂
之暗經者此所稟之不同而亦非病不須治也

月經異常

經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰垢胎受孕下

血漏胎名

註婦女月經一月一下此其常也若經行而吐血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月其血忽下而胎不墮者是謂漏胎此皆月經之異平常者也

外因經病

天地溫和經水安寒凝熱沸風盪然邪入胞中任衝損婦人經病本同

註經曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝注天暑

地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而隴起六淫之

刊入於胞中則損傷衝任故婦人經病本此同叅也如寒則血凝熱則血沸風則血盪然波湧而大下亦猶經水之被寒熱風而不得安瀾也

內因經病

婦人從人不專主病多憂忿鬱傷情血之行止與順逆皆由二氣率而行

註婦人從人凡事不得專主憂思忿怒鬱氣所傷故經病因

於七情者居多蓋以血之行止順逆皆由一氣率之而行

也

不內外因經病

血者水穀之精氣若傷脾胃何以生不調液竭血枯病合之乘道損傷成

血者水穀之精氣也在男子則化爲精在婦人則化爲血
工爲乳付下爲月水若內傷脾胃健運失職飲食減少血
無以生則經必不調亦有女子天癸既至踰期不得與男
子合未期則思與男子合與夫經正行時而合此皆合之
非道亦致不調或過淫合多則液竭產多乳衆則血枯亦
皆能損傷陰血致成經病也

血色不正病因

血從陽化色正紅色變紫黑熱之徵黃甘淡紅濕虛化更審瘀

塊黯與明

註

血屬陰從陽化故其色以正紅爲正雖有經病亦易爲治也若色變深紅紫黑乃熱之徵也或黃如米泔乃濕化也淺淡紅白乃虛象也更當審其有瘀有塊色黯色明以治之若黯而紫黑兼見冷證多屬寒凝若明而紫黑兼見熱證多屬熱結也

氣穢清濁病因

熱化稠粘臭必穢寒化清澈臭則腥內潰五色有穢氣時下而多命必傾

註

凡血爲熱所化則必稠粘臭穢爲寒所化則必清澈臭腥