

中西医结合执业助理医师 考前冲刺必做

主编 杨雪莲



人民军医出版社

国家执业医师资格考试（含部队）推荐辅导用书

中西医结合执业助理医师

ZHONGXIYI JIEHE ZHIYE ZHULI YISHI

考前冲刺必做

KAOQIAN CHONGCI BIZUO

主 编 杨雪莲

副主编 高晓雪 曹 洋

编 委 （以姓氏笔画为序）

马 超 王玉静 王延伟 伊丽琪

刘 宁 刘梦玉 李兆生 李淑静

吴春虎 张华俊 张晓丽 姜明宇

黄 韬 康 宁 薛新丽 戴惠祥



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

出版说明

国家执业医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分，实践技能考试一般在每年的 7 月举行，医学综合笔试于 9 月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为两个半小时。笔试全部采用选择题形式，共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 五种题型。助理医师适当减少或不采用 A₃ 型题。医师资格考试总题量约为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。

根据卫生部医考办 2010 年 6 月公布的数据，截止 2009 年，全国共有 577 万人次参加执业医师资格考试，188 万人次通过，十年来的总体通过率为 32.58%。全国每年参加考试总人数从 1999 年的不足 20 万人增加到目前的每年 80 万人左右，参考人数增加了 3 倍多，但目前每年通过考试的人数基本保持在 20 万人左右，通过率只有不足 30%。与考试最初的几年相比，近年来的合格分数线有较大幅度提高，可见考试难度在逐年加大。

2009 年，卫生部医师资格考试委员会批准实施新修订的《医师资格考试大纲(2009 年)》。考试新大纲改变了过去以传统学科为基础的考试模式，采用了按系统、疾病为基础的考试模式，对学科进行了整合，加强考察考生动手操作能力和综合运用所学知识解决问题的能力。但大纲编排结构和顺序与传统学科划分不符，增加了复习的难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套国家执业医师资格考试辅导用书，共 3 大系列，分别为《历年考点精编》系列、《模拟试卷(解析)》系列、《考前冲刺必做》系列，每个系列 8 本书，覆盖了除民族医、公共卫生以外的 4 大类 8 个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为国家执业医师资格考试(含部队)的推荐辅导用书。

“国家执业医师资格考试(含部队)推荐辅导用书”紧扣考试大纲，以历年考点考题编写的基本依据，内容的安排既考虑知识点的全面性，又特别针对历年考试通过率不高的现状，重点加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲要求及隐含的重要知识点，从整体上提高考试的通过率。

《历年考点精编》系列的突出特点，是在分析了历年数千道考试题的基础上，紧紧围绕历年考点考题编写，提示考试重点；以条目式的简洁叙述串讲考试命题点，重点、易考点一

目了然。

《模拟试卷（解析）》系列。每个考试专业有 4~5 套卷。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，题量适中，贴近真实考试的出题思路及出题方向，附有详尽解析，通过做题把握考试复习的重点和方向。

《考前冲刺必做》系列。每个考试专业有 3~4 套卷。这个系列的突出特点，是在分析历年考试的基础上，总结历年必考重点，抽选高频考点组题，通过冲刺练习，使考生熟悉考试，得到考试必得分。

本套考试用书对考试知识点的把握非常准确，试题与真实考试最接近，对考生通过考试一定会有很大的帮助。由于编写及出版的时间紧、任务重，书中如有不足，请读者批评指正。

人民军医出版社

试卷标识码:

助理医师资格考试试卷一

(医学综合笔试部分)

报考类别: 中西医结合执业助理医师

考试日期: ××××年×月

考试时间:

考生姓名_____

准考证号_____

考 场 号_____



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

第一单元

A₁ 型题 (1~87 题)

答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学的基本特点是
 - A. 整体观念和阴阳五行
 - B. 四诊八纲和辨证论治
 - C. 同病异治和异病同治
 - D. 整体观念和辨证论治
 - E. 阴阳五行和五运六气
2. 《素问·金匱真言论》说所“善病洞泄寒中”的季节是
 - A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
3. 生气之源指的是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾胃
 - D. 肺
 - E. 肾
4. 足三阴经的走向规律是
 - A. 从足走头
 - B. 从头走足
 - C. 从胸走手
 - D. 从手走头
 - E. 从足走腹
5. 下列选项属于五行相生规律传变的是
 - A. 木旺乘土
 - B. 土虚木乘
 - C. 木火刑金
 - D. 水不涵木
 - E. 土虚水侮
6. 自汗、多尿表现为气之功能减退的是
 - A. 推动作用
 - B. 温煦作用
 - C. 防御作用
 - D. 固摄作用
 - E. 气化作用
7. 正治指的是
 - A. 正确的治疗法则
 - B. 顺从疾病的某些假象而治的法则
 - C. 逆其疾病证候性质而治的法则
 - D. 扶助正气的治疗法则
 - E. 祛除邪气的治疗法则
8. 自汗的病机是
 - A. 气虚
 - B. 阴虚
 - C. 血虚
 - D. 痰盛
 - E. 气滞
9. 患者饥不欲食的原因是
 - A. 胃热
 - B. 胃寒

- C. 食积
D. 脾气虚
E. 胃阴虚
10. 下列不属于得神表现的是
A. 目光精彩
B. 神志清楚
C. 颧赤如妆
D. 面色荣润
E. 呼吸调匀
11. 舌体胖嫩，淡白湿润，属
A. 脾虚
B. 气虚
C. 湿热痰浊
D. 阳虚水湿
E. 血虚不润
12. 神志不清，语言重复，声音低微，时断时续称为
A. 独语
B. 错语
C. 狂言
D. 谵语
E. 郑声
13. 脉短如豆，滑数有力的是
A. 促脉
B. 疾脉
C. 实脉
D. 动脉
E. 短脉
14. 下列各项，不是实证临床表现的是
A. 五心烦热
B. 大便秘结
C. 小便不通
D. 痰涎壅盛
E. 腹痛拒按
15. 以下各项，不是真寒假热证临床表现的是
A. 自觉发热反欲盖衣被
B. 面色浮红如妆
C. 口渴而喜饮
D. 咽痛而不红肿
E. 脉浮大按之无力
16. 燥邪犯肺证与肺阴虚证的共同症状是
A. 微恶风寒
B. 潮热盗汗
C. 两颧潮红
D. 干咳少痰
E. 脉象浮紧
17. 黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪的补气利水作用，这种配伍关系是
A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏
18. 用治邪热壅肺之咳喘、气急，宜选用的药组是
A. 半夏、天南星
B. 陈皮、半夏
C. 麻黄、石膏
D. 白芥子、莱菔子
E. 苦杏仁、白果
19. 寒湿痹痛，腰以下明显者，最佳选药是
A. 防己
B. 威灵仙
C. 独活
D. 羌活
E. 木瓜
20. 被称为“回阳救逆第一品药”的药物是
A. 人参
B. 肉桂

- C. 鹿茸
D. 附子
E. 干姜
21. 有凉血止血散瘀之功，尤宜用于尿血的药物是
A. 白茅根
B. 小蓟
C. 大蓟
D. 地榆
E. 茜草
22. 延胡索用治的病证是
A. 风寒头痛
B. 风湿痹痛
C. 泻痢腹痛
D. 疮痈肿痛
E. 气滞血瘀诸痛
23. 下列方剂中不属于汗法范畴的是
A. 再造散
B. 杏苏散
C. 败毒散
D. 升麻葛根汤
E. 普济消毒饮
24. 麻子仁丸的组成药物除麻子仁、杏仁外，其余的是
A. 生地玄参麦冬芒硝
B. 芍药枳实厚朴大黄
C. 人参当归牛膝芒硝
D. 当归芍药麦冬大黄
E. 生地当归玄参芒硝
25. 六一散的功用是
A. 清暑除烦
B. 清暑化湿
C. 清暑利湿
D. 清暑生津
E. 祛暑清热
26. 桑螵蛸散的组成药物中含有
A. 乌药 山药
B. 茯苓 山药
C. 茯神 当归
D. 莲须 芡实
E. 龙骨 牡蛎
27. 半夏厚朴汤的组成药物中含有
A. 白术
B. 杏仁
C. 茯苓
D. 陈皮
E. 前胡
28. 组成药物为细生地、玄参、麦冬的方剂是
A. 一贯煎
B. 地黄饮子
C. 增液汤
D. 麦门冬汤
E. 济川煎
29. 胸痛伴有咳嗽、发热、呼吸困难，可能是
A. 上呼吸道感染
B. 大叶性肺炎
C. 支气管哮喘
D. 急性心肌梗死
E. 急性左心衰竭
30. 下列哪项不属于急腹症的常见中医病机
A. 热蕴
B. 血瘀
C. 气滞
D. 痰结
E. 食滞
31. 在非感染性发热中，属变态反应性疾病的是
A. 血清病
B. 中暑

- C. 重度安眠药中毒
D. 大面积烧伤
E. 急性心肌梗死
32. 犬吠样咳嗽见于
A. 急性胸膜炎
B. 大叶性肺炎
C. 急性左心衰竭
D. 急性喉炎
E. 肺结核
33. 气胸出现的呼吸困难为
A. 呼气性
B. 吸气性
C. 混合性
D. 神经精神性
E. 劳累性
34. 下列可出现慢性腹痛的疾病是
A. 异位妊娠破裂
B. 急性胆囊炎
C. 肠穿孔
D. 结核性腹膜炎
E. 急性胰腺炎
35. 当实质性器官被含气组织覆盖时, 其叩诊音为
A. 清音
B. 鼓音
C. 实音
D. 浊音
E. 过清音
36. 用口测法测量体温时, 正确的是
A. 正常值为 $36.5 \sim 37.5^{\circ}\text{C}$
B. 小儿常用
C. 昏迷患者可用
D. 体温在 1 日内有 1°C 以上波动
E. 体温表放置舌下, 紧闭口腔, 5 分钟即可读数
37. 长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现
A. 二尖瓣面容
B. 满月面容
C. 急性病容
D. 无欲貌
E. 贫血面容
38. 强迫体位见于
A. 各种疾病的早期
B. 极度衰弱
C. 意识不清
D. 急性肺水肿
E. 严重疾病晚期
39. 健康成年女性血红蛋白的正常值是
A. $105 \sim 150\text{g} / \text{L}$
B. $110 \sim 150\text{g} / \text{L}$
C. $110 \sim 155\text{g} / \text{L}$
D. $115 \sim 155\text{g} / \text{L}$
E. $120 \sim 160\text{g} / \text{L}$
40. 下列最不符合三度房室传导阻滞的是
A. P 与 QRS 无传导关系
B. 心房率快于心室率
C. P 与 QRS 无传导关系, 房率快
D. 心房率慢于心室率
E. P 与 QRS 无传导关系, QRS 慢并且畸形
41. 肺炎的 X 线表现是
A. 渗出
B. 增殖
C. 纤维化
D. 钙化
E. 空洞
42. 一度房室传导阻滞时的心电图改变为
A. QRS 增宽 >0.12 秒
B. P-R 间期 >0.12 秒
C. P-R 间期 <0.21 秒
D. P-R 间期 ≥ 0.21 秒

- E. P-R 间期逐渐延长
43. 人体内密度最低的组织是
- A. 骨骼
B. 脂肪
C. 血液
D. 肌肉
E. 气体
44. 存在首关效应的给药途径是
- A. 口服
B. 静脉注射
C. 直肠给药
D. 肌肉注射
E. 舌下给药
45. 半数有效量是
- A. 引起 50%动物死亡的剂量
B. 刚达到 50%有效血浓度的剂量
C. 引起 50%动物产生阳性反应的剂量
D. 使 50%患者产生效应的剂量
E. 引起 50%动物中毒的剂量
46. 毛果芸香碱滴眼后产生的作用是
- A. 扩瞳、降眼压, 调节痉挛
B. 扩瞳、升眼压, 调节麻痹
C. 缩瞳、升眼压, 调节痉挛
D. 缩瞳、降眼压, 调节痉挛
E. 缩瞳、升眼压, 调节麻痹
47. 支气管哮喘伴有尿路梗阻的病人应禁用
的药物是
- A. 阿托品
B. 东莨菪碱
C. 山莨菪碱
D. 后马托品
E. 新斯的明
48. 下列关于抢救有机磷酸酯类中毒的描述,
错误的是
- A. 及时带离中毒现场
B. 配合注射新斯的明
C. 及早、足量注射阿托品
D. 清洗皮肤
E. 使用胆碱酯酶复活剂
49. 阿托品的禁忌证是
- A. 青光眼
B. 肠绞痛
C. 有机磷农药中毒
D. 流涎
E. 抑制腺体分泌
50. 肾上腺素的临床应用是
- A. 糖尿病
B. 器质性心脏病
C. 高血压
D. 甲状腺功能亢进症
E. 过敏性休克
51. 下列关于 β 受体阻滞药的适应证, 错误的是
- A. 心律失常
B. 支气管哮喘
C. 青光眼
D. 高血压
E. 心绞痛
52. 对各种类型癫痫均有治疗作用的药物是
- A. 苯妥英钠
B. 地西洋
C. 乙琥胺
D. 苯巴比妥
E. 丙戊酸钠
53. 下列关于巴比妥类药物不良反应的描述,
错误的是
- A. 成瘾性
B. 不影响精细运动的协调
C. 酶诱导作用
D. 眩晕、困倦

E. 突然停药有“反跳”现象

54. 下列关于氯丙嗪的临床应用, 错误的是

- A. 主要用于治疗精神分裂症
- B. 可用于躁狂症的躁狂状态
- C. 对放射治疗引起的呕吐有效
- D. 作为“冬眠合剂”成分用于严重创伤和感染
- E. 利用其对内分泌影响试用于侏儒症

55. 下列关于苯海索的临床应用, 错误的是

- A. 不能耐受左旋多巴者
- B. 重症患者
- C. 轻症患者
- D. 禁用左旋多巴者
- E. 抗精神病药引起的帕金森病

56. 传染病的基本特征为

- A. 有传染性、免疫性和病原体
- B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
- C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D. 有传染性、传播途径和免疫性
- E. 有传染性、免疫性和流行性

57. 传染病流行过程的基本条件是

- A. 散发、流行、暴发流行
- B. 病原体、人体、外环境
- C. 自然因素、社会因素
- D. 传染源、传播途径、易感人群
- E. 患者、病原携带者、受感染的动物

58. 急性 HBV 感染最早出现的抗体是

- A. 抗-HAV
- B. 抗-HBs
- C. 抗-HCV
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HBc

59. 下列有关病毒性肝炎的描述哪项错误

- A. 妊娠后期合并戊肝病死率高

B. 急性丙肝易转为慢性肝炎

C. 甲型肝炎不转为慢性

D. 丙肝病毒感染易致重型肝炎

E. 慢性丙型肝炎可演变为肝硬化

60. 确诊流行性出血热的依据是

- A. 鼠类接触史
- B. 全身感染中毒症状
- C. “三痛”和“三红”征
- D. 特异性 IgM 抗体滴度升高
- E. 异型淋巴细胞增多

61. 下列有关流行性出血热的描述哪项错误

- A. 属于自然疫源性疾病
- B. 鼠类为主要传染源
- C. 高血容量综合征多发生于少尿期
- D. 血液透析是少尿期治疗的有效手段
- E. 发病机制和基本病变是弥散性血管内凝血

62. 非典型肺炎 (SARS) 的首发症状是

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 腹泻
- D. 胸闷
- E. 鼻塞

63. 对 SARS 密切接触者的检疫期一般为

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 14 天
- E. 21 天

64. 普通型流脑的表现, 下列哪项不典型

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 出血点
- D. 抽搐
- E. 巴宾斯基征阳性

65. 诊断急性菌痢必做的检查是
- A. 血常规
 - B. 粪常规
 - C. 直肠镜
 - D. 血培养
 - E. 悬滴检查
66. 霍乱大流行最重要的传播形式是
- A. 食物污染
 - B. 苍蝇传播
 - C. 接触患者
 - D. 水源污染
 - E. 接触带菌者
67. 有关消毒的描述, 错误的是
- A. 切断传播途径, 防止传染发生的重要措施
 - B. 可保护医护人员免受感染
 - C. 可防止患者再被其他病原体感染
 - D. 即使有了强有力的消毒措施, 医护人员也必须采取防护措施
 - E. 对不同的传染病消毒效果相似
68. 十五络脉是指十二经脉之别络, 加上
- A. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络
 - B. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络
 - C. 任脉之络、督脉之络、脾之大络
 - D. 任脉之络、督脉之络、胃之大络
 - E. 任脉之络、督脉之络、冲脉之络
69. 阿是穴又称为
- A. 特定穴
 - B. 五腧穴
 - C. 不定穴
 - D. 八会穴
 - E. 背俞穴
70. 股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是
- A. 13 寸
 - B. 14 寸
 - C. 16 寸
 - D. 18 寸
 - E. 19 寸
71. 治疗下齿痛应选取以下哪条经脉的腧穴
- A. 手太阴肺经
 - B. 足太阴脾经
 - C. 手太阳小肠经
 - D. 足阳明胃经
 - E. 手阳明大肠经
72. 位于后正中线上, 第 7 颈椎棘突下凹陷中的腧穴是
- A. 膈俞
 - B. 肝俞
 - C. 大椎
 - D. 印堂
 - E. 心俞
73. 下列哪项不属于同名经配穴
- A. 耳鸣取中渚、足临泣
 - B. 头痛取外关、阳陵泉
 - C. 失眠取神门、三阴交
 - D. 牙痛取合谷、内庭
 - E. 便秘取天枢、曲池
74. 针灸治疗中风病中脏腑, 应取用哪组经脉为主
- A. 手厥阴经、督脉为主
 - B. 手厥阴经、任脉为主
 - C. 足厥阴经、督脉为主
 - D. 足厥阴经、任脉为主
 - E. 手、足厥阴经为主
75. 针灸治疗遗尿的主穴是
- A. 关元、气海、肾俞、三阴交
 - B. 关元、中极、膀胱俞、三阴交
 - C. 肾俞、志室、气海、三阴交
 - D. 关元、中极、三焦俞、三阴交
 - E. 肝俞、肾俞、太冲、太溪

76. 属于医德意识现象的是

- A. 医德教育
- B. 医德修养
- C. 医德信念
- D. 医德评价
- E. 医德行为

77. 《希波克拉底誓言》中提出的医德根本原则是

- A. 为病家谋利益
- B. 平等对待患者
- C. 保守医密
- D. 不为妇人施堕胎术
- E. 不伤害病人

78. 医院以医学人道主义精神服务于人类社会，主要表现的是

- A. 经济效益
- B. 社会效益
- C. 功利并重
- D. 功利主义
- E. 优化效益

79. 医师义务和权利中不包括的是

- A. 保证治疗效果
- B. 保证病人平等医疗权
- C. 保证病人医疗权的实现
- D. 保证病人身心健康
- E. 履行自己的义务

80. 中医四诊的道德要求是

- A. 安神定志
- B. 认真负责
- C. 保守医密
- D. 知情同意
- E. 尊重患者

81. 生命伦理学的目标是

- A. 消除疾病、恢复健康
- B. 发展生命、完善生命

C. 治愈疾病、保护健康

D. 预防疾病、消除疾病

E. 消除疾病、促进健康

82. 我国进行卫生立法活动的基础和依据是

- A. 《中华人民共和国刑法》
- B. 《中华人民共和国宪法》
- C. 《中华人民共和国食品卫生法》
- D. 《中华人民共和国执业医师法》
- E. 《中华人民共和国传染病防治法》

83. 对违反卫生法律法规施行行政处罚的机关是

- A. 各级行政监察机关
- B. 各级党的纪律检查部门
- C. 各级人民法院
- D. 各级人民检察院
- E. 各级卫生行政主管部门

84. 依据《处方管理办法》，为门（急）诊癌症患者开具的麻醉药品注射剂每张处方不得超过

- A. 2日常用量
- B. 3日常用量
- C. 4日常用量
- D. 5日常用量
- E. 7日常用量

85. 突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大

- A. 公众安全事件
- B. 矿山安全事件
- C. 食物中毒事件
- D. 医疗机构事故
- E. 领导责任事件

86. 医疗事故的责任主体是依法取得

- A. 医学教育资格的机构
- B. 执业许可证的医疗机构
- C. 考试合格取得资格的考生

- D. 大学毕业证书的医学院校毕业生
- E. 医学临床研究资格的机构

87. 与广大人民群众健康问题切身利益相关的行业是

A. 医疗卫生行业

- B. 社会保障行业
- C. 社会保障部门
- D. 药品研制单位
- E. 卫生教育行业

A₂型题（88～90 题）

答题说明

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

88. 某女，34 岁。吵架后出现头部两侧胀痛，左侧为甚，心烦易怒，舌红苔黄，脉弱数。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 太阳、列缺、曲池
- B. 三阴交、肝俞、脾俞
- C. 太溪、肾俞、悬钟
- D. 太冲、太溪、侠溪
- E. 阿是穴、血海、膈俞

89. 某女，40 岁。头晕目眩，泛泛欲吐，急躁易怒，口苦，耳鸣，舌红，苔黄，脉沉。除主穴外，应加用

- A. 头维、丰隆、中脘
- B. 行间、侠溪、太冲

- C. 气海、脾俞、胃俞
- D. 太溪、悬钟、三阴交
- E. 血海、膈俞、气海

90. 患者，男性，58 岁。耳聋 10 余年，耳中如蝉鸣，伴五心烦热，遗精盗汗，舌红少津，脉细数，宜在太溪、照海、听宫的基础上，加取

- A. 气海、血海
- B. 外关、合谷
- C. 脾俞、足三里
- D. 肾俞、气海
- E. 肾俞、肝俞

B 型题（91～150 题）

答题说明

两道试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案，备选答案在上，题干在下。每题请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（91～92 题共用备选答案）

- A. 实热证
- B. 实寒证
- C. 虚寒证
- D. 虚热证

E. 寒热错杂证

- 91. “益火之源，以消阴翳”的适应证是
- 92. “壮水之主，以制阳光”的适应证是

（93～94 题共用备选答案）

- A. 滋水涵木法
- B. 益火补土法
- C. 培土生金法
- D. 抑木扶土法
- E. 金水相生法

93. 温肾阳以补脾阳的治法是
94. 用于治疗肝旺脾虚的治法是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 肝胃不和
 - B. 脾胃虚弱
 - C. 脾胃湿热
 - D. 寒水上泛
 - E. 燥热伤津
95. 口甜黏腻是因
96. 口中泛酸是因

(97~98 题共用备选答案)

- A. 花剥苔
 - B. 黄腻苔
 - C. 薄白苔
 - D. 灰黑而润苔
 - E. 灰黑而干苔
97. 痰热内蕴者可见
98. 食积化腐者可见

(99~100 题共用备选答案)

- A. 热扰心神
 - B. 痰热扰心
 - C. 心气虚弱
 - D. 脏气衰微
 - E. 宗气大虚
99. 语言时有错乱，语后自知言错是因
100. 自言自语，见人便止，首尾不续是因

(101~102 题共用备选答案)

- A. 血分

- B. 水分
- C. 痰饮
- D. 寒凝
- E. 气分

101. 腹部肿块推之不移，痛有定处者病在
102. 腹部肿块推之可移，痛无定处者病在

(103~104 题共用备选答案)

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假
- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

103. 寒包火证属于
104. 表里实热证属于

(105~106 题共用备选答案)

- A. 发散、行气、行血
- B. 收敛固涩
- C. 软坚散结、泻下
- D. 补益、和中、缓急
- E. 渗湿利水

105. 甘味药的作用是
106. 辛味药的作用是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 龙胆
- B. 黄芩
- C. 黄连
- D. 黄柏
- E. 苦参

107. 功能清热燥湿，又善清心胃实热的药物是
108. 功能清热燥湿，又善清肺热的药物是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 细辛 蜀椒

- B. 槟榔 桂枝
- C. 银花 厚朴
- D. 扁豆 白术
- E. 厚朴 扁豆

109. 乌梅丸的组成药物中含有

110. 香薷散的组成药物中含有

(111~112 题共用备选答案)

- A. 温阳健脾，理气和中
- B. 攻下冷积，温补脾阳
- C. 温脾散寒，理气止痛
- D. 理气化痰，和胃利胆
- E. 温胆散寒，疏肝止痛

111. 温脾汤的功用是

112. 温胆汤的功用是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 茯苓 地黄
- B. 附子 肉桂
- C. 当归 芍药
- D. 桂枝 地黄
- E. 菖蒲 远志

113. 肾气丸和地黄饮子两方的组成药物中均含有

114. 肾气丸和炙甘草汤两方的组成药物中均含有

(115~116 题共用备选答案)

- A. 月经情况
- B. 生育情况
- C. 冶游史
- D. 家族遗传病史
- E. 预防接种史

115. 属于既往史的是

116. 属于个人史的是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 肺部叩诊过清音
- B. 肺部叩诊鼓音
- C. 肺部叩诊清音
- D. 肺部叩诊实音
- E. 肺部叩诊浊音

117. 气胸为

118. 肺气肿为

(119~120 题共用备选答案)

- A. 淡黄色尿
- B. 淡红色尿
- C. 酱油样尿
- D. 深黄色尿
- E. 乳白色尿

119. 急性溶血时可出现

120. 丝虫病患者可出现

(121~122 题共用备选答案)

- A. 上消化道钡剂造影
- B. 小肠导管造影
- C. 钡剂灌肠
- D. X 线腹部透视
- E. CT 断层摄影

121. 胃肠道穿孔应做

122. 肠梗阻应做

(123~124 题共用备选答案)

- A. 阿托品
- B. 碳酸氢钠
- C. 氯解磷定
- D. 毛果芸香碱
- E. 高锰酸钾

123. 敌百虫中毒时洗胃的药物是

124. 有机磷酸酯类轻度中毒治疗的药物是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 乙琥胺

- B. 苯妥英钠
- C. 硝西泮
- D. 地西泮
- E. 丙戊酸钠

125. 对失神小发作首选的药物是
126. 对癫痫持续状态首选的药物是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 血管紧张素转换酶抑制药
- B. β 受体阻滞药
- C. 利尿药
- D. 钙拮抗药
- E. 中枢性降压药

127. 轻度高血压患者可首选的药物是
128. 可逆转心肌肥厚的药物是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 利福平
- B. 链霉素
- C. 异烟肼
- D. 庆大霉素
- E. 对氨基水杨酸

129. 结核性脑膜炎应首选的药物是
130. 早期轻症结核病宜选用的药物是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 杯状病毒
- B. 嗜肝 DNA 病毒
- C. 缺陷病毒
- D. 黄病毒
- E. 微小 RNA 病毒

131. 乙肝病毒亦为
132. 丙肝病毒亦为

(133~134 题共用备选答案)

- A. 血尿
- B. 高热、休克、惊厥、呼吸衰竭

- C. 头痛、腰痛、眼眶痛
- D. 眼红、腿痛、淋巴结肿大
- E. 相对缓脉

133. 中毒型菌痢表现为
134. 流行性出血热表现为

(135~136 题共用备选答案)

- A. 12~1 月份
- B. 2~4 月份
- C. 5、6 月份
- D. 7~9 月份
- E. 10~12 月份

135. 细菌性痢疾多见于
136. 流行性脑炎好发于

(137~138 题共用备选答案)

- A. 发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B. 发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C. 腹泻，呕吐，水样大便，无发热，无腹痛
- D. 发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E. 低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

137. 霍乱典型表现为
138. 急性菌痢典型表现为

(139~140 题共用备选答案)

- A. 拇指端
- B. 示（食）指端
- C. 中指端
- D. 环指端
- E. 小指端

139. 手少阳三焦经与手厥阴心包经的交接部位是
140. 手少阴心经与手太阳小肠经的交接部位是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 睛明治眼病
- B. 中脘治胃痛