

黃氏紀效新書

R.49.
HSM
ca

中
圖
書
館

黄氏纪效新书(全二册) 〔清〕黄 堂著

中医古籍出版社出版

科技情报印刷厂印刷

北京市新华书店发行

开本 787×1092 1/16 印张: 31

1981年12月第一版 第一次印刷

统一书号: 14249·0019 定价: 3.84 元

黃氏紀效新書下卷目錄



瘡

痢

泄瀉

大小便閉

嘔吐

餓雜

呃逆

自盜汗汗脫

疸

痿痺

調經

帶下

崩漏

胎前

產後

遺精淋濁

消渴

不寐

喉嚨

梅核氣
陰虛喉痺

乳癰
喉癰

鼻淵牙宣耳目疾

幼科蟲積

外科

腸癰
痔瘡

懸癰
瘡癰
無名痛腫


[illegible]

紀效新書



黃雲臺先生著

黃壽南校註



二瘡

錢

三三歲

寒熱轉為單痛者由少陽而入陽明舌白底絳不渴
脈頗弦數濕熱內蘊從單瘡例治

溫膽湯去草加

小川連

荔枝

白杏仁

六一散

荷葉

華

早立威

但熱不寒為三單瘡
舌白底絳濕熱也
溫胆湯方
化濕熱痰滯酒後利三
焦氣分
姜手厚皮
吳橘紅
甘肅
枳殼
枳實
炒竹茹

仲景復脈湯 又名炙甘草湯

治傷寒脈結代心動

悸者又治肺痿咳吐血

心中澀澀之者

炙甘草 生薑 桂枝

麥冬 麻子仁 大棗

人參 河膠 生地黃

以清酒水煎之取液

入河膠和之至令河膠

以連服膠代麻子仁用

炙甘草膠以麻子仁

薄暮微寒身熱平旦得汗乃解症延已久按以仲景

復脈湯合乎邪少虛多之治

炙草 細生地 青蒿 茯苓 穀芽 紅棗

桂枝 麥冬肉 丹皮 廣皮 煨姜

表 右三十七歲

產後伏邪內動痺瘧甚不退舌濁脘悶始從氣分

邪勿誤產後陰虛之例

羚羊角 青蒿 赤芍 陳皮 桑皮 砂仁

焦山包 姜半夏 砂霜 杏仁 川通草

丹溪云痰瘕者三陰

瘕也三日一發按于子午

卯酉日者少陰瘕也按

於寅申巳亥日者厥陰

瘕也瘕於辰戌丑未

日者太陽瘕也更須以

脈證審之然後決其

經而治之

諸苓湯

養陰清燥疹瀉濁

諸苓 茯苓 滑石

澤瀉 砂膠

錢

三才歲三瘕

瘕發于辰戌丑未丹溪謂之太陽瘕腹滿不運是其

見端以培土洩邪

枳實 芍藥 芩夏 柴胡 茯苓 老薑

炒白朮 橘紅 草果 法冬 紅粳

呂 主歲

瘕瘕退不通高熱勝脫少腹微滿仿諸苓湯法

諸苓 阿膠 澤瀉 白薇 廣皮

赤苓 滑石 丹皮 砂膠

六君子湯
中氣因乏之聖方
人考 症在 厥冬
甘州 平夏 陽夏

華 子 歲

八白大弟中陽因乏交冬發病間日一至泄瀉無度脈
濡細右手不振不欲納穀此胃脘脾虛恐難長莫
及奈何

六君子湯加 煨姜 大棗

楊 三 六 石

新產感冒客邪間日寒熱為病癰核煩渴引飲必
得大汗淋漓乃解眩暈悸動夢遺大虛仲聖三
病論多汗善惡此其一端詳可慮也

桂枝 白薇 黨參 川石斛 雲苓 石決明

白芍 夜粉 丹皮 射干 益母草 益母代

孫 辛夷

急後未復又因寒暖不和瘧疾微寒熱熾薑燕為黃
濁而口渴渡赤脈形數邪乃充斥三焦理宜苦辛通
泄氣和

小川連 茯苓 茵陳 夜粉 通草

姜黃 澤瀉 滑石 白寇仁

蘇

余慮云、瘡寒多微有熱、肢冷汗淺、口渴喜溫飲、
脈遲緩、知宗壯瘡論、但經吐瀉、腕痛、正氣已虛、
亥端莫測、慎勿忽視、

桂枝 牡蠣 雲母 乾薑

茯苓 吳茱 小麥根

諸

瘡瘡為熾煩冤、曾任大沛、臨忍自回、而無故
渴又甚、脈轉數、往之、然也、欲清陽、陽理推、自序
且有辛涼達表之功、

白虎湯

治陽明證渴飲水脈

洪大浮滑不寒反惡者

生石膏一斤 知母七升

甘草五升 粳米三升

以水一斗煮粳米熟湯取

五升服一升日三服

生石膏

杏仁

赤苓

生升

塊消石

羚羊角

連翹

鬱金

佛手

南薄荷

肥知母

焦危

鮮竹葉

二診

前議清陽明泄少陽急退得清均屬轉機必伏邪

田嘉胃起伏之盛微胃寒似胃復瘕之意舌絳燥

略減煎飲瀉佐以手經主之

羚羊角

連翹

鬱金

赤苓

桑枝

真山危

杏仁

青蒿

滑石

芦根

三診

症象向惡惟^甚微黃仍無腹瀉氣分條未清者宜慎調

川貝母 淡芩 赤苓 魚尾通草

白杏仁 橘白 澤瀉 枳殼炭

四診

間瘧惡心腕痞起自足腫外癢濕熱蘊遏使然

溫膽湯去甘草加

川連 柴胡 淡芩 藿香梗 砂仁

錢
二十六歲

舊恙肝胃不和。痲攻嘔吐。加以受暑。濕但患不寒渴。不多飲。口中甜膩。脈來弦數。從痺瘡例治。

薑手夏 黃芩 青蒿 龜仁 六一散 焦芩
山連 杏仁 廣皮 赤苓 芦根

周

痺瘡舌絳煩渴汗後復起。防其化燥。神昏勢勿渺視。

犀角尖 夜粉 鬱金 連翹心 焦芩
鮮生地 青蒿 桑枝 芦根

二診

熱熾煩渴。波赤。陽氣燭盛之。額頭痛。汗少。舌起微黃。究屬氣分未宣。兼以清透。

羚羊角

淡豆豉

杏仁

薄荷

連翹

桑葉

焦山梔

青蒿

薤白

生石膏

衣粉

芦根

劉石

初瘧因產後元虛。勞傷感受暑熱。濕滯中宮。更觸新涼。所以發則反無汗。而寒熱均重。作渴脫痞。口膩惡心。府陽失暢。脈虛弦而數。此正氣漸虧。邪深膠固。且甚。則神氣迷蒙。頭可微矣。經旨太陽為開。若專事和解。未

能奏效者為此

白蘇梗 半夏 柴胡 益元散 薑皮

杏仁 花柳 淡芥 江枳殼 秋露草

二診

前議辛宣洩太陽已得大汗而解此屬應機瘧來
寒慄甚勢較短而神氣迷蒙頭疼作渴舌心灰
黑暑熱薰蒸風陽亢甚上焦累胸仍慮邪而故
宗長沙通調營衛清泄氣分冀其漸輕耶

桂枝 青蒿 淡芥 羚羊角 鬱金 益元散

理中湯

治傷寒直中太陰自利不渴寒多而嘔中氣不運

人參 白朮 甘草

乾薑 各三兩 加附子

二枚 名附子理中湯

症施云命口益主母溫

矣

茯苓 知母 杏仁 連翹心 荷衣露

化 三症傳及腹脹

三瘕一載中陽困頓寒多脈小脹腹脾胃受傷此非

輕和與附子理中湯加味

附子理中湯加味

易中口朴 茯苓 沉香 砂仁

浦 二十九歲

三瘕漸見寒甚稍輕但其根竅深未易驟出宜搜

邪扶正調治

至不確之外感為癰疽
 不外乎風寒燥暑濕
 裏證亦不外乎痰食
 但癰疽疾本足外感病
 不通輕症傷身故傷寒
 有為癰疽者為今世正
 傷寒為溫者者進之病
 多癰疽而不知故善治溫
 寒者溫者始知治癰
 之全解也
 又曰癰疽有陰有陽
 癰有藏病治者為滿
 輕者皮重者皮死

桂枝

雲仙

枳白

當歸

黨參

薑

鼈甲

青蒿

半夏

白芍

茯苓

棗

畢

四十二歲

大癰脈弦細真陽必虧且值冬令嚴寒少年深
 而其根愈固苟非補正搜邪焉得有濟

附子

紫菀

半夏

鼈甲

枳白

紅棗

桂枝

茯苓

白芍

雲仙

煨薑

錢

重之黑苔漸化可徵陰液未復診得脈右弦甚木脾仍