

道光己酉鐫

產

後

編

海山仙館叢書



產後編上卷目錄

產後總論

產前後方症宜忌

正產

傷產

調產

催生

凍產

熱產

橫產

盤腸產

難產

死產

下胞

斷臍

新產治法

產後用藥十誤

產後寒熱

胎前患傷寒疫症瘧疾墮胎等症

血塊

血暈

厥症

血崩

氣短似喘

妄言妄見

傷食

忿怒

類瘧

類傷寒二陽症

類傷寒二陰症

類中風

類瘧

出汗

盜汗

口渴兼小便不利

遺尿

產後編上 共四十三症

陽曲傅 山青主手著

產後總論

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先雖有他症以末治之斯言盡治產之大旨若能擴充立方則治產可無過矣夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸症乘虛易入如有氣母專耗散有食母專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則血塊停滯熱則新血崩流至若中虛外感見三陽表

症之多似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三
陰裏症之多似可下也在產後而用承氣則重亡陰血
耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譫語出汗乃元
弱似邪之症非同胃實厥由陽氣之衰無分寒熱非大
補不能回陽而起弱瘕因陰血之虧不論剛柔非滋榮
不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作無期症似瘧也若以
瘧治遷延難愈言論無倫神不守舍病似邪也若以邪
治危亡可待去血過多而大便燥結肉蕸蓉加於生化
非潤腸承氣之能通去汗過多而小便短澀六君子倍

加參芪必生津助液之可利加參生化湯頻服救產後
之危長生活命丹屢用甦絕穀之人癰疽脫肛多是氣
虛下陷補中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加參
生化之劑產戶入風而痛甚服宜羌活養榮湯玉門傷
涼而不閉洗宜蛛兒黃硫散怔忡驚悸生化湯加以定
志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而悶滿虛煩生化
湯加木香爲佐因食而噯酸惡食六君子加神麴麥芽
爲良蘇木義術大能破血青皮枳殼最消滿脹一應耗
氣破血之劑汗吐宣下之法止可施諸壯實豈宜用於

胎產大抵新產後先問惡露如何塊痛未除不可遽加
參朮腹中痛止補中益氣無疑至若亡陽脫汗氣虛喘
促頻服加參生化湯是從權也又如亡陰火熱血崩厥
暈速煎生化原方是救急也王太僕云治下補下治以
急緩緩則道路達而力微急則氣味厚而力重故治產
當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付生死之
重寄須着意於極危欲求俯仰之無虧用存心於愛物
此雖未盡產症之詳然所聞一症皆接近鄉治驗爲據
亦未必無小補云

正產

正產者有腹或痛或止腰脇酸痛或勢急而胞未破名弄胎服八珍湯加香附自安有胞破數日而痛尙緩亦服上藥俟之

傷產

傷產者胎未足月有所傷動或腹痛臍痛或服催生藥太早或產母努力太過逼兒錯路不能正產故臨月必舉動從容不可多睡飽食飲酒但覺腹中動轉卽正身仰臥待兒轉順與其臨時費力不如先時慎重

調產

調產者產母臨月擇穩婆辦器用備參藥產時不可多人喧鬧二人扶身或憑物站心煩用滾水調白蜜一匙獨活湯更妙或飢服麋粥少許勿令飢渴有生息未順者只說有雙胎或胎衣不下勿令產母驚恐

催生

催生者因坐草太早困倦難產用八珍湯稍佐以香附乳香以助血氣胞衣早破漿血已乾亦用八珍湯

凍產

凍產者天寒血氣凝滯不能速生故衣裳宜厚產室宜
煖背心下體尤要

熱產

熱產者暑月宜溫涼得宜若產室人衆熱氣蒸逼致頭
痛面赤昏暈等症宜飲清水少許以解之然風雨陰涼
亦當避之

橫產

橫產者兒居母腹頭上足下產時則頭向下產母若用
力逼之胎轉至半而橫當令產母安然仰卧令其自順

產後綱目 四
穩婆以中指挾其肩勿使臍帶羈絆用催生藥努力卽生

當歸 紫蘇 各三錢 長流水煎服卽下

一方用好京墨磨服之卽下

一方用敗筆頭一個火鍛以藕節自然汁調服之卽

下

一方用益母草六兩濃煎加童便一大杯調服卽下

盤腸產

盤腸產者產則子腸先出然後生子其腸或未卽收以

苧麻子四十九粒研碎塗頭上腸收急急洗去遲則有害又方止用四十粒去皮研爲膏塗頂中收卽拭之如腸燥以磨刀水潤之再用磁石煎湯服之須陰陽家用過有驗者

難產

難產者交骨不開不能生產也服加味芎歸湯良久卽下

小川芎

一兩

當歸

一兩

敗龜版

一個酒炙

婦人髮灰

一握

須用生過男女者爲末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎已死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服卽下用童便亦好後用補劑調理

下胞

胞衣不下用滾酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰一錢或以產母髮入口作吐胞衣卽出有氣虛不能送出者腹必脹痛單用生化湯

全當歸

一兩

川芎

三錢

白木

一錢

香附

一錢

加人參