

改良外科大全

成

1665年



太醫院祁廣輯註

第一善本

改良外科大成

上海江東書局石印

# 外科大成敘

余賦質椎魯家世業儒舞象時即肆力於八股之間學未窺班而嚴君見背時先師戴望之以明經高等擅岐黃業語余云先正有言不為良相即為良醫治生即治世也予盍圖之遂奮志攻苦一切桐君之所秘雷公之所傳瓊函寶笈靡不蒐采大約內科一門前賢之論述似詳且盡而外科諸書或博而寡要或隱而未備鶴長鳬短豕腹龍頭心竊疑之簡練揣摩少有弋獲倖而入侍

內庭謬承委試奏功甚多然亦並無他術惟能辨氣稟有厚薄之殊風土有寒溫之異今所不經見之異症古所不必有之奇方驅一己匠心變通於前輩之遺意日積月累未能成帙庚子春先慈棄世讀禮之餘悉取諸書而折衷之有言症而不言脉者有圖形象定名色而不分穴次者有辯大毒而忽小疴者有小毒反詳而大毒反畧者紊亂無次未可枚舉僭為考訂彙成一書重者刪之缺者補之訛者正之亂者緒之其法首列六脉則邪正虛實若眉分次列三因則病源若犀照再次則列陰陽善惡生死順逆之訣辯之則吉凶立判再次則列腫瘍潰瘍二治則先後治法內外諸方無不具矣又按部位分經絡定穴次辨

名色各列於後焉其調理總不外乎前腫潰二治之中其稍異者則列本症之下以補缺畧也其中又有內外相似者又列各門於本部之後以便參考少贅以區區之一得是集也辨症辨名從博雖微疵悉備而不遺用藥用方從約在單刀直入以取効至於獨悟之心法不傳之秘方皆為一盤托出不復珍惜嗟乎自古用藥者如用兵兵有以正勝奇勝多勝寡勝車勝騎勝舟勝五花勝八陣勝在審其勢之所必用故一發而奏功攻毒者如攻賊賊必有穴即左洞庭右太行鐵壁千層羊腸九疊而察其穴之所必在馳一旅可以受縛奏凱之績豈曰小成因名其集曰外科大成以公天下坤也不敏大成詎敢易名哉不過因積累之功而統言之耳爰使天下之人偶有滑和之患開卷了然可以盡謝醫師矣烏得云以書為御者不盡馬之情耶因縷述一腔之苦衷如左不敢乞光於

大人先生之鴻藻弁端以張楚

康熙四年歲在乙巳仲秋之吉太醫院 御醫燕越祁坤廣生甫識

年 呂

外科大成目錄

卷之一

總論部

癰疽原委症治脉法經絡總不外乎此

癰疽之脉

癰疽之原

癰疽之別

癰疽陰症歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽生死法

察形色順逆法

內消內托法

經絡大畧

補漏藥品

鍼法

灸法

取穴灸法

烙法

桑柴烘法

神燈照法

牛膠蒸法

症治總訣始末辨症用藥

症治次第

標本治法

標使治宜

論嘔

論寒熱

論藥禁忌

論瘡暉

潰瘍治法

論膿

論生肌

驗膜

腫瘍主治方

潰瘍主治方

腫瘍洗滌類方

潰瘍外治附餘

生肌類方

試百病生死法

癰疽陽症歌

癰疽七惡歌

虛實症治法

黃蠟灸法

藥筒拔法

順逆看法

論下

論飲食

論內陷

論瘡口

陽症變陰

腫瘍附餘類方

麻藥類方

去腐類方

調理須知



經絡

蜂窩發附半身發

十竟體發

陰陽二炁疽

禽疽

瘡疽

背部總論

外治次第法

腰部

下發背一名對

石疽附癰發血為患

胸部

經絡

井疽

乳疽

乳發

吹岩

腹部

幽癰

小腹疽

凹復恩倫

上發背

肚癰一名脾

上搭手

酒毒發

痰注發

產後癰疽

經絡之所統

背疽醫案

腎俞法

繆腰火丹一名火丹瘡俗名蛇串瘡

缺盆疽一名鎖骨疽

蜂窠疽

乳漏

毒

下乳回乳

嚇癰一名胃疽

腹皮癰

癰胃疽

衝疽

發肚足肚

付小巴齊正

中發背

心發一名對

中搭手

黃瓜癰肉龜名

連珠發

始末不應生死訣

腫潰症治法

下搭手一名連

腎發

濕流注

膻中疽

甘疽

胃疽

乳癰

乳結核

膻中疽

脾發

乳疽

勞

緩疽

蓮子發

串疽

丹毒發

夏日暑湯



經絡肩風毒癱瘓肘臂部  
手部病經絡蛇頭疔一  
蛇節疔一名天蝦蟆串  
股部瘻瘍蛇經絡  
膝部瘻瘍蛇經絡  
遊膝風經絡

石疣疽	股陰疽	合谷疔	手發背	兌疽	臍癰
肚門癰	蛇眼疔	一毒又名虎			
附骨疽	泥鰌疽	名			
	狐狸刺				

膝癰	手心毒	穿骨疽
緩疽	掌毒一 名穿	
	手火發	
	人	
	蛇背疔	
	代指	
	鷺掌風	
	咬骨疽	
	箕門癰	
	陰疽	
	咬骨疽	

膝眼風	玄疽	鶯癰	骨蠍疽	樂疽
委中毒	股陽疽	調疽		
腿遊風	疽	癰		
		肚疽	便名穿	
		疽	名名毒	
			魚敷標疽	
			疽	

上水魚

脛部

三里發

接骨發

穿踝疽

血風瘡

一名爪風瘡

腓腸發

附陰疽

靈樞為癰

經絡

一名足指發

敦四冷補

淫遺

足跗發

發背足

甲疽

臭田螺

脚氣瘡

一指足

分治部

卷之三

頭部

頭痛頭風

蠅蟲癩拱頭

一名鱗

面部

黃水瘡

眉癥

肺風酒刺

黧黑班

髮際瘡

白屑風

油風

癩瘡

禿瘡

此係頭面小疵及眼耳口鼻喉舌等部位因其並治多歧不可紊亂於大毒之內故另立之以便檢閱

腫瘡

風裨口為補

濕毒流注

靈樞為走緩

附陰疽

靈樞為癰

腓腸發

陰疽

黃鍼癰

一名脛疽

內踝疽

一名鞋帶癰

外踝疽

靈樞為走緩

青蛇毒

外踝疽

腎氣遊風

靈樞為走緩

足心癰

一名湧泉疽

足跟疽

一名癰

牛程蹇

靈樞為走緩

田螺泡

靈樞為走緩

脫疽

靈樞為走緩

厲癰

靈樞為走緩

土粟癰

靈樞為走緩

肉刺

俗名驢眼

雀班

眼部風火雲翳等眼目有專科姑不錄

眼胞菌毒

眼胞內椒瘡粟瘡

眼丹  
脾雀症

黑子恙也

鼻瘡

羊鬚子瘡

耳部

經絡

耳聾  
耳聰

鼻部

經絡  
鼻衄

酒齶真

唇部

經絡  
唇瘡

口部

經絡  
風瘡

舌部

紫舌脹

痰包

口瘡

反唇疔鎖口疔

唇疽

繭唇

舌衄

重舌附疾氣

重腮

耳底痛

附耳挺耳蕈

耳痔  
蟲入耳

黑疔

耳鍼瘡一名月蝕瘡

凍耳成瘡

耳疳

耳痒

鼻渊

又名腦崩腦漏  
控腦砂

鼻鼽

鼻疔

鼻聾

鼻瘡

鍼眼  
漏睛

眼胞痰核  
大小眼眴出膿出血

耳疳

耳瘡

耳癬

耳瘡

耳瘡

耳瘡

牙齒部

牙經絡

咽喉部

經絡

啞瘡喉風

不分部位大毒

不分部位者益為隨處可生不按穴次也故另分之

內癰總論

附肚癰

陽疤痕 心漏

肺癰

脾癰

三焦癰

小腸癰附醫案

肝癰

心癰

大腸癰

腎癰

胃癰

緊喉 弄舌喉風

慢喉 嘴節

喉癌

牙痛附風癩

牙衄走馬牙疳

攢齒疳

疔瘡症治總決 共計四十七名

多骨疽一名刺骨疽

流注附馬瘻

楊梅瘡

倒發梅毒

瘰疬

附膀音休

癰瘤各附五種

石癰石疽黑砂等瘤

結核

瘡核

卷之四

不分部位小疵

此皆小疵不可紊亂於大毒之內故另分之

無名腫毒

丹毒

赤白遊風

癰疹

外科

五

諸痒

癰瘍風翻花瘡

瘰疬

火赤瘡

紅絲瘡

漆瘡

金瘡

類破傷風

骨哽喉及悞吞

小兒部

赤遊丹毒

胎風

陰腫一名脫囊

葡萄疫

痘後癰

煉取諸藥法

昇打靈藥固確法

煉硝石法

製炒諸藥法

諸痛

白駿風

諸疥

寒瘡

天蛇瘡

瘡瘍

血箭

杖傷

竹木刺入肉

杖發瘡

杖刺入肉

胎毒瘡瘍

胎赤

脫肛

痘裏瘡瘍

痘瘍

痘風瘡

痘瘍

封確口法

取蟾酥法

針灸人神歌訣

大麻風

紫白癥風

諸瘡

浸淫瘡

魚脊瘡

風疳血疳

血痣

夾傷

湯火傷

火傷

人咬傷

風犬傷

熱毒瘡瘍

胎瘤

肛門作痒

發丹

痘瘍

痘瘍

煉玄明粉法

取金汁法

取紅鉛法

製大附子法

製寒食麪法

癩風

諸瘡總論

瘡瘍

天胞瘡

肺疽

骨瘡瘍

白駿疣

跌撲損傷

破傷風

凍瘡

虫獸傷

垂癰

癰瘍

臍瘍

臍瘍

遺毒

疔瘍

瘍瘍

煉金頂砒法

製寒食麪法

後跋

外科大成卷之一

太醫院御醫燕越祁坤廣生

輯著

嘉錫 嘉釗 嘉鉉

嘉鉉

嘉鉉 嘉鉉 正字

總論部

脉源

粵稽炎農御世而醫之名始立夫醫者濟世之統名也名雖一而實有內外科之異也科之分有內外蓋因人之疾有內外故也因其疾以命醫神而明之則因內可以推外由外可以測內精微之理豈易言哉胡為乎今之重於內者精其內而瘡科或有所遺專於外者精其外而方脉或有未諳斯二者誠未合乎中庸之道不幾先失正之薪傳乎故惟仁者之心深長周密思欲兼之而無遺內遺外之憾者必先以脉為首務也靈樞經云見其色知其病命曰明按其脉知其病命曰神嗟嗟神其難言也夫誠以病在臟腑不能以告人而脉告之脉不能以接人而指接之則是脉也者乃天真委和之氣非圖可狀非言可傳維空人之會心而已獨不見王叔和之脉經乎王忠俊彼越肯平李贛湖之脉學戴同父之刊誤等書乎寓之於目悟之於心措之於指運之於意於是乎病之淺深不彰明較著也哉是以脈之道不易精也因於其不易精而竟忽之其誤天下也多矣爰採脉學歌訣辯脉之形象并遵外科腫潰脉法辯症之順逆顏之卷首聊補學者上達之功云爾

脉歌

浮 浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮是洪脉來時雖盛去悠悠 浮脉輕平似捻葱虛來沉 遷大豁然空浮而柔細為濡脉散似楊花無定蹤 腫瘍為虛為風潰瘍為虛宜補 沉 沉幫筋骨自調匀伏則維筋着骨尋沉細如綿真弱脉弦長實大是牢形 腫瘍為邪氣深潰瘍為

遺毒在內

遲 遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表裏消陰須益火之源 脉來二至號為遲小駛於進作緩持遲細而難知是濇浮而遲大以虛推 腫瘍為寒為虛潰傷亦為寒為虛 數數脉息間常六至陰微陽盛必狂煩浮沉表裏分虛實惟有兒童作吉看 數比平人多一至緊來如數似彈繩數而時止名為促數見關中動脈形 數脉為陽熱可知只將君相火來醫實宜涼瀉虛宜補肺病秋深却畏之 腫瘍為熱數而洪者欲膿潰瘍為病進數甚者難醫

滑 滑脉如珠替替然往來流利却還前莫將滑數為同類數脉惟看至數間 腫瘍為熱為痰潰瘍為熱為虛為邪氣未退

濇 細遲短濇往來難散止依稀應指間如雨沾沙容易散病畜食葉慢而艱 參伍不調名曰濇輕刀刮竹短而難微似杪芒微更甚浮沉不別有無間 腫瘍為氣實氣滯潰瘍為血虛為脉病相應虛 舉之遲大按之鬆脉狀無涯類谷空莫把芤虛為一例芤來浮大似葱葱 腫瘍宜內托潰瘍宜大補實 浮沉皆得大而長應指無虛惱惱強熱蘊三焦成壯火通腸發汗始安康 實脉浮沉有力強緊來彈索轉無常須知牢脉帮筋骨實大微弦更帶長 腫瘍為邪氣太盛潰瘍為邪氣不退

長 過於本位脉名長弦則非然但滿張弦脉與長爭較遠良工尺度自能量 腫瘍為有餘宜內消潰瘍為氣治則易愈

短 兩頭縮縮名為短濇短遲遲細且難短濇而浮秋喜見二春為賊有邪干 腫瘍為元氣不足潰瘍為大虛宜大補

洪 脉來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時若在春秋冬月分升陽散火莫狐疑 洪脉來時拍拍然去衰來盛似波瀾欲知實脉參差處舉按弦長惱惱堅 腫瘍為熱盛宜宣熱拔毒壯實者下之潰瘍為邪

微

微脉輕微營脈乎按之欲絕有如無微為陽弱細陰弱細比於微畧較羸

緊

舉如轉索切如繩脉象因之得緊名總是寒邪來作冠內為腹痛外為疼

腫瘍脉浮緊發熱惡寒

緩

緩脉阿阿四至通柳稍裏裏颶輕風欲從脈裏求神氣口只在從谷和緩中

腫瘍脉為虛瀆瘍為有胃

氣為脉病相應

芤

中空傍實乃為芤浮大而遲虛脉呼芤更帶弦名曰革血亡芤革血虛虛

腫瘍為血虛瀆瘍為脉

病相應

弦

弦來端直似絲弦緊則如繩左右彈緊言其力弦言象牢脉弦長沉伏間

腫瘍主血氣不和為痛

瀆瘍為血虛雙弦為賦邪侵脾加數則危矣

革革脉形如按鼓皮芤弦相合脉寒虛女人半產并崩漏男子營虛或夢遺

腫瘍為氣盛瀆瘍為邪

牢

弦長實大脉牢堅牢位常居沉伏間革脉芤弦自浮起革虛牢實要詳看

腫瘍為氣盛瀆瘍為邪

氣不退

濡

浮而柔細知為濡沉細而柔作弱持微則浮微如欲絕細來沉細近於微

瘡家同靈弱脉

弱

弱來無力按之柔柔細而沉不見浮陽陷入陰精血弱白頭猶可少年愁

腫瘍宜托裏瀆瘍為脉

病相應宜補

散

散似楊花散漫飛去來無定至難齊產為生兆胎為墮久病逢之不必醫

散脉無拘散漫然濡來

浮細水中綿浮而遲大為虛脉芤脉中空有兩邊

腫瘍為氣虛不收瀆瘍獨見者死

細

細來纍纍細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱不利秋冬老弱却相宜

細為氣聚血少有此症

者逆

伏 伏脉推筋着骨尋指間緩動隱然深傷寒欲汙陽將解厥逆臍疼症屬陰 腫瘍為陰中伏陽邪潰瘍為陽伏陰中為內蝕為流注浸淫難治宜溫補

動 動脈搖搖數在關無頭無尾豆形圓其原本是陰陽搏虛者搖兮勝者安 動主痛陽動汗之陰動溫之

促 促脈數而時一止此為陽極欲亡陰三焦鬱火炎炎盛進必無生退可生 腫瘍為熱為病進潰瘍

為熱不退漸進者死 結 結脈緩而時一止獨陰偏勝欲亡陽浮為氣滯沉為積汗下分明在主張 腫瘍為氣結潰瘍為氣

不調則危 代 動而中止不能還復動因而作代看病者得之猶可療平人却與毒相關 數而時止名為促緩止

須將結脈呼止不能回方是代結生代死自殊途 兩動一止三四日三四動止應六七五六一止七八朝次第推之自無失 脘瀆俱不利

脈數不見時當生惡瘡 脉數身無熱內有癰膿 脉數應當發熱而返惡寒若有痛處當發癰 脉浮

而數膿腫在外宜先托裏恐邪入內脉沉而實宜先疏通以絕其源脉不浮不沉無内外症知其在經宜

和營衛 脉數發熱而痛者發於陽脉不數不發熱而痛者發於陰 癰脉宜洪大而數若沉緊者死疽

脉宜沉而實若浮洪而散者死 癰疽無脉者氣閉也宜行氣其脉自見

### 癰疽之源

人身之氣血與天地同流人身之經絡與晝夜同度苟或六淫之感七情之傷飲食不時房勞不節致使陰陽乖錯營衛繫結而成癰者總不出於二因故以二因首例

外因運氣癰疽有四

一火熱助心為瘡瘍經曰少陰所至為瘡疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司