

医学高等专科学校学习指导丛书

中央广播电视大学医科类大专教材

■ 李荣昌 刘俊义 主编

Yiyong Jichu Huaxue
Xuexi Zhidao

医用基础化学

学习指导

(第二版)

● Yiyong Jichu Huaxue Xuexi Zhidao

北京大学医学出版社

教育部高等学校医学类专业教学指导委员会
全国高等医药院校教材编审委员会

第 2 版 2015 年 12 月

Medical Basic Chemistry
医用基础化学

医用基础化学

学习指导

(第 2 版)

人民卫生出版社

医学高等专科学校学习指导丛书
中央广播电视大学医科类大专教材

医用基础化学学习指导

(第二版)

主 编 李荣昌 刘俊义
编写人员 李荣昌 刘俊义 刘湘陶 李树春

医用基础化学学习指导(第二版)

主 编 李荣昌 刘俊义

出版发行 北京人民卫生出版社(电话:010-85958300)

地 址 (100083)北京市海淀区学院路38号北京人民卫生出版社

网 址 <http://www.pupchina.com.cn>

E-mail: booksale@pup.edu.cn

印 刷 北京地泰源印刷有限公司

经 销 新华书店

责任编辑 李林 责任校对 王林林 责任印制 李林

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 3.48 字

版 次 2002年5月第1版 2008年4月第2版 2008年4月第13000册

书 号 ISBN 978-7-118-07382-8

定 价 20.50元

北京人民卫生出版社

北京大学医学出版社
林书李 副主编 刘俊义 主编

图书在版编目(CIP)数据

医用基础化学学习指导/李荣昌,刘俊义主编. —2版.

—北京:北京大学医学出版社,2005.6(2008.4重印)

ISBN 978-7-81071-792-2

(第二版)

I. 医... II. ①李... ②刘... III. 医用化学—医学院
校—教学参考资料 IV. R313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033102 号

李荣昌 副主编
刘俊义 主编
李荣昌 副主编
刘俊义 主编

医用基础化学学习指导(第二版)

主 编:李荣昌 刘俊义

出版发行:北京大学医学出版社(电话:010-82802230)

地 址:(100083)北京市海淀区学院路38号 北京大学医学部院内

网 址:<http://www.pumpress.com.cn>

E-mail:booksale@bjmu.edu.cn

印 刷:北京地泰德印刷有限公司

经 销:新华书店

责任编辑:安 林 责任校对:王怀玲 责任印制:郭桂兰

开 本:787mm×1092mm 1/16 印张:14 字数:349千字

版 次:2005年6月第2版 2008年4月第2次印刷 印数:10001-13000册

书 号:ISBN 978-7-81071-792-2

定 价:20.50元

版权所有,违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

北京大学

第二版前言

本书是根据吕以仙、李荣昌主编的《医用基础化学》(第二版)的内容,在第一版的基础上,参考国内外有关教材,遵循少而精,尽量联系生命科学实际的原则编写的,虽然为《医用基础化学》(第二版)的配套辅助教材,但其内容又相对独立成篇。

全书各章的名称及顺序与主教材完全相同。对每章的内容按“掌握、熟悉和了解”三个层次提出了学习要求并给出了较详细的内容提要;每章有适量的测试题(包括填空、选择、是非、计算和问答题)供学生练习,其中少数较难的题用“*”号标出,供学生选作。为便于学生自学,所有测试题均给出参考答案,对某些较复杂的测试题给出了解答提示,计算题不仅指出解题思路,还给出了较细的解答步骤。学生通过这些练习不仅可以巩固和加深对基础化学的基本概念和基本理论的理解,同时也能够扩大知识面。在本书的普通化学部分和有机化学部分之末分别附了两套自我测试题,供学生作自我考核,检查学习效果。

此书由长期从事医学基础化学教学的北京大学医学部的教师编写。李荣昌教授编写第一、二、四、六、七、八章及两套普通化学部分结业自我测试题,刘湘陶教授编写第三、五章;李树春老师编写第九、十、十一、十二、十三章,刘俊义教授编写第十四、十五章及两套有机化学测试题。

此书可作为医学、口腔、护理、预防医学、医学检验及药学各专业专科学生、教师学习和教授基础化学(含有机化学)的参考教材,也可作为这些专业的本科学生、教师的参考教材,还可供其他专业特别是生命科学有关专业的师生学习、教授基础化学时参考。

由于编者水平所限,书中难免有不妥和错误之处,诚望读者批评指正。

编者

2005年4月

目 录

18	1
88	1
88	1
88	1
88	1
第一章 溶液和胶体	1
89	基本要求	1
89	内容提要	1
90	测试题	3
90	参考答案	8
第二章 化学热力学和化学动力学基础	12
90	基本要求	12
90	内容提要	12
91	测试题	15
91	参考答案	20
第三章 电解质溶液	24
93	基本要求	24
93	内容提要	24
93	测试题	28
93	参考答案	34
第四章 酸碱滴定法	38
93	基本要求	38
93	内容提要	38
96	测试题	40
96	参考答案	44
第五章 原子结构和分子结构	49
96	基本要求	49
96	内容提要	49
97	测试题	53
97	参考答案	59
第六章 氧化还原与电极电势	63
96	基本要求	63
97	内容提要	63
98	测试题	65
98	参考答案	70
第七章 配位化合物	75
99	基本要求	75
99	内容提要	75
99	测试题	78

参考答案	81
第八章 分光光度分析法	86
基本要求	86
内容提要	86
测试题	88
I 参考答案	91
普通化学部分结业自我测试题(I)	94
I 普通化学部分结业自我测试题(I)参考答案	98
普通化学部分结业自我测试题(II)	100
II 普通化学部分结业自我测试题(II)参考答案	104
第九章 烃	107
I 基本要求	107
II 内容提要	107
III 测试题	115
IV 参考答案	119
第十章 醇 酚 醚	123
I 基本要求	123
II 内容提要	123
III 测试题	126
IV 参考答案	129
第十一章 醛 酮	133
I 基本要求	133
II 内容提要	133
III 测试题	136
IV 参考答案	140
第十二章 羧酸和羧酸衍生物	143
I 基本要求	143
II 内容提要	143
III 测试题	147
IV 参考答案	151
第十三章 胺和杂环化合物	155
I 基本要求	155
II 内容提要	155
III 测试题	158
IV 参考答案	162
第十四章 立体化学基础:手性分子	165
I 基本要求	165
II 内容提要	165
III 测试题	172

参考答案.....	179
第十五章 生物分子	183
基本要求.....	183
内容提要.....	183
测试题.....	194
参考答案.....	199
有机化学模拟试题(一)	203
参考答案.....	206
有机化学模拟试题(二)	208
参考答案.....	211

第一章 溶液和胶体

基本要求

1. 掌握物质的量浓度及质量浓度,并能熟练地进行有关浓度的计算。
2. 掌握渗透压定律及有关计算;了解渗透现象和渗透压及其在医学中的重要意义。
3. 了解溶胶的性质、胶团结构及影响其稳定性的因素,了解高分子溶液的形成及其一般特性。

内容提要

一、分散系统和溶液的浓度

一种或几种物质以较小颗粒分散在另一物质中所形成的系统称为分散系统。可根据分散相粒子大小将分散系统分为粗分散系、胶体分散系、分子分散系(溶液)。分散相粒子直径大于100nm的为粗分散系,小于1nm的为分子分散系,在1~100nm之间的为胶体分散系。溶液由溶剂和溶质组成。由于用途的不同,溶液组成有不同的表示方法。常用的有:

物质的量浓度: $c_B = n_B / V$

式中 n_B 为物质 B 的物质的量, V 为溶液的体积。 c_B 常用的单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 等。

质量浓度: $\rho_B = m_B / V$

式中 m_B 为质量, V 为溶液体积, ρ_B 常用单位为 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 等。

质量分数: $\omega_B = m_B / m$

式中 m_B 为 B 的质量, m 为混合物或溶液的质量, ω_B 无单位。

从各种浓度的基本定义出发,可进行各种浓度的换算。如 ρ_B 与 c_B 之间的换算:

$$c_B = \frac{\rho_B}{M_B}$$

上式中 M_B 为溶质 B 的摩尔质量。

又如溶液的稀释: $c_1 V_1 = c_2 V_2$

式中 c_1 和 V_1 表示稀释前溶液的物质的量浓度和体积, c_2 和 V_2 表示稀释后溶液的物质的量浓度和体积。也可以用质量浓度 ρ_B 和质量分数 ω_B 代替物质的量浓度。

二、渗透现象和渗透压

用半透膜将溶液与溶剂或浓溶液与稀溶液隔开时将发生渗透现象。渗透方向总是溶剂由稀溶液(或纯溶剂)一侧向浓溶液一侧转移。渗透的结果是减小了膜两边的浓度差。如果在溶液一侧的液面上施加一压力 Π ,使其恰好能阻止溶剂由纯溶剂一侧向此溶液渗透,这一压力称

为此溶液的渗透压,单位为 kPa 或 Pa。溶液渗透压 Π 与温度、浓度有关,按范特荷夫(van't Hoff)公式:

$$\Pi = cRT$$

式中, Π 为溶液的渗透压,单位为 kPa; c 为溶液的物质的量浓度,单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; R 为气体常数,其值为 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T 为绝对温度,单位为 K ($K = 273.15 + t^{\circ}\text{C}$)。

溶液渗透压 Π 与溶液中溶质的质点(分子或离子)数目成正比,与溶质的本性无关。例如 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 蔗糖和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 葡萄糖的水溶液,在同样温度下,两者的渗透压相同。对于强电解质稀溶液,对范特荷夫公式需加以校正:

$$\Pi = icRT$$

i 为校正因子。对于 AB 和 A_2B (或 AB_2) 型强电解质稀溶液,当粗略近似计算时,其 i 值分别取 2 和 3。

利用范特荷夫公式可以测定溶质(特别是大分子)的相对分子质量 M_B , 因为从范特荷夫公式可得到:

$$M_B = \frac{m_B RT}{\Pi \times V}$$

在医学中,把具有渗透效应的物质统称为渗透活性物质。医学上常用渗透浓度表示血浆等体液的渗透压大小,它是指溶液中渗透活性物质的质点总浓度。可用符号 c_{os} 表示,其常用单位也是 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。在计算溶液的渗透浓度时,应注意,对于强电解质溶液,其渗透浓度等于溶液中溶质的离子总浓度;对于弱电解质,其渗透浓度等于溶液中未解离的弱电解质分子的浓度和解离出的离子浓度的总和;而对于非电解质,其渗透浓度等于其溶液浓度。

溶液渗透压的高低是相对的。医学上的等渗、高渗、低渗溶液是以血浆的渗透压(或渗透浓度)为标准确定的。临床上规定渗透浓度在 $280 \sim 320 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 范围内的溶液为等渗溶液;渗透浓度大于 $320 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液为高渗溶液;渗透浓度小于 $280 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液为低渗溶液。渗透现象在医学上具有重要意义,对于维持细胞形态及体内盐水平衡起重要作用。

三、溶胶和大分子溶液

溶胶是多相分散系统,其分散相是许多原子(或分子、离子)构成的固相聚集体,其粒子的直径在 $1 \text{ nm} \sim 100 \text{ nm}$ 之间。溶胶具有丁铎尔(Tyndall)现象、布朗运动、电泳等特性。丁铎尔现象是胶粒对入射光的散射造成的。布朗运动是作热运动的介质分子对胶粒从不同方向撞击时,胶粒由于受力不平衡而产生不规则的运动。布朗运动是对抗胶粒聚结沉降的原因之一。在电场中,带电胶粒向一定方向运动称为电泳。胶核选择性吸附带电离子或胶粒成分中某些基团的解离是胶粒带电的原因。

带电胶粒彼此排斥及水化膜的保护作用是溶胶具有一定稳定性的原因。电解质可引起溶胶聚沉。电解质中与胶粒电荷相反的离子在溶胶聚沉中起主要作用。

高分子溶液因其分散相粒子直径在 $1 \sim 100 \text{ nm}$ 之间,所以属于胶体分散系统。但因其分散相粒子与介质间无界面,是分子分散系,所以又是稳定的真溶液。高分子溶液的丁铎尔效应很弱。溶剂化作用是高分子溶液稳定的主要原因。用无机盐和某些有机溶剂可使高分子从溶液中析出。

测试题

一、填空题

- 按照分散相粒子的大小可以把分散系统分为_____三大类。注射用葡萄糖水溶液属_____分散系统,其中葡萄糖是_____,水是_____。
- 物质的量的符号用_____表示,单位为摩(mol),1mol表示系统内含_____个基本单元。
- 当不知道溶质的相对分子质量时,可用质量浓度 ρ_B 表示溶液的组成, $\rho_B =$ _____,单位可为_____。
- 产生渗透现象的必要条件是_____。
- 溶液渗透压 π 与浓度 c 及温度 T 的关系是_____。
- 医学上常用渗透浓度来表示渗透压的大小,临床上把渗透浓度在_____范围内的溶液称为等渗溶液。
- 溶胶的三大基本性质是指_____、_____和_____。
- 胶粒带电的主要原因是_____。
- 溶胶的丁铎尔(Tyndall)效应是由于_____,高分子溶液的丁铎尔效应比溶胶_____。
- 加入大量无机盐使蛋白质从溶液中析出的方法称为_____。

二、选择题

1. 关于胶体分散系,下列说法正确的是()

- 其分散相的颗粒直径小于 1nm
- 其分散相颗粒直径大于 100nm
- 其分散相颗粒直径小于 100nm,大于 1nm
- 其分散介质只能为水

2. 在下列单位中,哪一个是物质的量浓度的单位()

- $g \cdot L^{-1}$
- $g \cdot mol^{-1}$
- $mol \cdot mL^{-1}$
- $mol \cdot L^{-1}$

3. 物质的量浓度定义为()

- $c_B = \frac{n_B}{V}$
- $m_B = \frac{n_B}{V}$

$$C. c_B = \frac{m}{V}$$

$$D. c_B = \frac{n_B}{m}$$

4. 质量浓度 ρ_B , 物质 B 的摩尔质量 M_B 及物质的量浓度 c_B 之间的关系为()

$$A. c_B = \frac{\rho_B}{M_B}$$

$$B. M_B = \rho_B c_B$$

$$C. \rho_B = \frac{c_B}{M_B}$$

$$D. c_B = \frac{M_B}{\rho_B}$$

5. 溶液稀释时的计算公式 $c_1 V_1 = c_2 V_2$, 它表示()

- 稀释前后溶剂的物质的量相等
- 稀释前后溶质的物质的量相等
- 稀释前后溶质的物质的量浓度相等
- 稀释前后溶质的质量浓度相等

6. 这里有一份医院化验室给出的血清检验结果:

Terms (项目)	Results (结果)	unit (单位)	Expectation (期待值)
T-Bil (总胆红素)	22.5	$\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0~18.8
TP (总蛋白)	70	$\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$	60~85
K	4.0	$\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$	3.5~5.5
Na	140	$\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$	135~145

下列说法正确的是()

- A. T-Bil, K, Na 都以物质的量浓度表示, TP 以质量浓度表示
- B. T-Bil, K, Na 都以质量浓度表示, TP 以物质的量浓度表示
- C. T-Bil, K, Na 都是以非法定浓度单位表示
- D. TP 是以非法定浓度单位表示
7. 测得 100mL 某溶液中含有 8mg Ca^{2+} , 则溶液中 Ca^{2+} 的浓度是()
- A. $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $0.2\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $2\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
8. 欲配制 $0.100\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液 500mL, 需取 $1.60\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液体积为()
- A. 62.5mL
- B. 3.125L
- C. 31.25mL
- D. 312.5mL
9. 在较早的教材中, 生理盐水的浓度是以质量-体积百分浓度(m/V)表示, 它为 0.9% 的 NaCl 溶液, 即 100mL 溶液中含 NaCl 0.9g, 则其物质的量浓度 $c(\text{NaCl})$ 为()
- A. $9.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $0.308\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $0.154\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D. $0.154\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

10. $200\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液中 Ca^{2+} 的质量浓度 ρ 等于()

- A. $0.0018\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $22\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $80\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. $8\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$
11. 将 350g ZnCl_2 溶于 650g 水中, Zn 的质量分数 ω_B 为()
- A. 0.1683
- B. 0.0665
- C. 0.1817
- D. 0.350
12. 将 12.5g NaCl 溶于水, 配制成 250mL 溶液, 该溶液的质量浓度 ρ 是()
- A. $25\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $50\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $0.050\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. $0.025\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
13. 市售新洁尔灭消毒液的质量分数为 5%, 临床用的是 0.1% 的溶液, 配制 1000mL 0.1% 的新洁尔灭溶液, 需 5% 新洁尔灭消毒液()
- A. 2.0mL
- B. 20mL
- C. 200mL
- D. 50mL
14. 质量分数为 37% 的 HCl 溶液(密度为 $1.19\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$)的质量浓度为()
- A. $440\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $44.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $37.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. $11.9\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
15. 配制 $1.00\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液 1000mL, 需质量分数为 37% (密度为 $1.19\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$) 的体积为()
- A. 829mL
- B. 0.829mL
- C. 82.9mL
- D. 119mL

16. 用只允许水透过不允许溶质粒子透过的半透膜将此溶质的稀溶液与浓溶液隔开, 关于渗透作用下面描述正确的是()
- A. 水从浓溶液向稀溶液渗透, 最后达到平衡
- B. 水从稀溶液向浓溶液渗透, 最后达到平衡
- C. 水从稀溶液向浓溶液渗透, 不能达到平衡
- D. 水分子能自由透过半透膜, 所以不会发生渗透
17. 反向渗透可用于海水淡化。当用一坚固的半透膜(只允许水透过)将海水与纯水隔开, 要制备纯水需()
- A. 在海水一侧加一小于海水渗透压的压力
- B. 不需外加任何压力, 任其自由渗透
- C. 在纯水一侧加压
- D. 在海水一侧加一大于海水渗透压的压力
18. 渗透压与溶液浓度及温度的关系式: $\Pi = cRT$, 下列表述中正确的是()
- A. c 单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; R 为 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T 为绝对温度, 则 Π 的单位为 kPa
- B. c 单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; R 为 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T 为绝对温度, 则 Π 的单位为 Pa
- C. c 单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; R 为 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T 为绝对温度, 则 Π 的单位为大气压(atm)
- D. c 单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$; R 为 $8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T 为绝对温度, 则 Π 的单位为 J
19. 关于溶液渗透压与温度的关系, 下列说法中正确的是()
- A. 与温度无关
- B. 温度越高, 渗透压越小
- C. 当溶液浓度固定时, 温度越高, 渗透压越大
- D. 渗透压与温度的关系无规律可循
20. 若下列四种稀溶液的质量浓度均为 $10 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 则渗透压最大的是()
- A. 葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)溶液
- B. NaCl 溶液
- C. 蔗糖($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)溶液
- D. CaCl_2 溶液
21. 两种稀溶液的渗透压相等, 则()
- A. 两溶液的物质的量浓度 c_B 相等
- B. 两溶液的质量浓度 ρ_B 相等
- C. 两溶液的溶质的质量分数 ω_B 相等
- D. 两溶液的渗透浓度 c_{os} 相等
- (提示: 按渗透压定律 $\pi = i c_B RT$, 当两种稀溶液的渗透压相等时有 $i_1 c_{B,1} RT = i_2 c_{B,2} RT$, 因温度 T 相同, 所以 $i_1 c_{B,1} = i_2 c_{B,2}$, 如果两种物质类型不同, 如一种为强电解质, 另一种为非电解质; 或一种为 AB 型强电解质, 另一种为 A_2B 型强电解质, 则 i_1 和 i_2 不同, $c_{B,1}$ 和 $c_{B,2}$ 也可能不等。同此不能选 A)
22. 25°C , $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)溶液的渗透压为()
- A. 25 kPa
- B. 248 Pa
- C. 248 kPa
- D. 496 Pa
23. 正常人血浆的渗透浓度 c_{os} 范围为()
- A. $280 \sim 320 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $250 \sim 350 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. $320 \sim 760 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. $28 \sim 32 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
24. 按照医学中的习惯, 体液的渗透压可分为晶体渗透压和胶体渗透压, 关于这两种渗透压, 下面说法正确的是()
- A. 体液中的小分子、离子产生胶体渗透压
- B. 体液中的大分子产生晶体渗透压
- C. 体液中的小分子、离子产生晶体渗透压, 大分子产生胶体渗透压
- D. 在血浆总渗透压(约 766 kPa)中胶体渗透压

透压占绝大部分

25. 在 37°C , $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$ 溶液的渗透压为()
- A. 515.4kPa
B. 257.7kPa
C. 515.4Pa
D. 44.8kPa
26. 37°C 时血液的渗透压为 775kPa , 与血液具有相同渗透压的葡萄糖静脉注射液的浓度为()
- A. $0.47\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
B. $0.030\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
C. $0.301\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
D. $0.047\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
27. 生理盐水 ($9\text{g}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaCl}$) 的渗透浓度等于()
- A. Na^{+} 的渗透浓度
B. Cl^{-} 的渗透浓度
C. Na^{+} 的渗透浓度与 Cl^{-} 的渗透浓度之差
D. Na^{+} 的渗透浓度与 Cl^{-} 的渗透浓度之和
28. 红细胞放入下面溶液中, 导致溶血的溶液是()
- A. $9.0\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$
B. $0.09\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$
C. $50\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液
D. $100\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液
29. 红细胞放入下面溶液中, 导致细胞皱缩的溶液是()
- A. $10.0\text{g}\cdot\text{L}^{-1}\text{CaCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M_r=147$)
B. $12.5\text{g}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHCO}_3$ ($M_r=84.0$)
C. $50\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液 ($M_r=180$)
D. $112\text{g}\cdot\text{L}^{-1}\text{C}_3\text{H}_6\text{ONa}$ ($M_r=80$)
(提示: NaHCO_3 解离成 Na^{+} 和 HCO_3^{-} , HCO_3^{-} 的解离可忽略, 而 $\text{C}_3\text{H}_6\text{ONa}$ 解离成 Na^{+} 和 $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}^{-}$)
30. 溶胶的丁铎尔(Tyndall)现象是胶粒对光的()
- A. 散射作用

- B. 反射作用
C. 折射作用
D. 透射作用
31. 扩散和沉降都是溶胶动力学性质, 下面的说法正确的是()
- A. 溶胶扩散作用使溶胶趋于稳定, 而沉降作用使溶胶不稳定
B. 溶胶扩散作用使溶胶不稳定, 而沉降作用使溶胶稳定
C. 对溶胶稳定性的影响, 扩散作用与沉降作用是一致的
D. 当达到沉降平衡时, 胶粒呈均匀分布
32. 在电场中, 胶粒在分散介质中定向移动, 这称为()
- A. 电泳
B. 电渗
C. 扩散
D. 电解
33. 溶胶在一定时间内能稳定存在而不聚沉主要是因为()
- A. 溶胶的分散相粒子比分子还小
B. 溶胶的分散相粒子很大, 扩散速度慢
C. 溶胶胶粒呈均匀分布, 是均相系统
D. 胶粒带电荷, 相互排斥; 胶粒带有水化膜保护, 阻止彼此碰撞时聚结沉淀
34. 对于胶团 $[(\text{AgI})_m \cdot n\text{Ag}^{+} \cdot (n-x)\text{NO}_3^{-}]$, 下列说法错误的是()
- A. $(\text{AgI})_m$ 是胶核
B. Ag^{+} 是吸附离子
C. NO_3^{-} 是反离子
D. $m=n+x$
35. 如聚沉 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶胶(正溶胶)下列电解质中沉聚能力最大的是()
- A. AlCl_3
B. NaNO_3
C. Na_2SO_4
D. Na_3PO_4
36. 如聚沉 As_2S_3 溶胶(负溶胶)下列电解质中沉聚能力最大的是()

- A. AlCl_3
 B. KNO_3
 C. K_2SO_4
 D. K_3PO_4
37. 关于高分子溶液的性质,下列描述中错误的是()
- A. 高分子溶液是均相系统,真溶液
 B. 高分子溶液不会自发聚结沉淀,性质稳定
 C. 丁铎尔(Tyndall)现象明显
 D. 扩散慢
38. 高分子溶液属于胶体溶液主要是因为()
- A. 它的分散相粒子直径在 $1\sim 100\text{nm}$ 之间
 B. 性质稳定
 C. 扩散慢
 D. 高分子水化作用强
39. 下列物质中常用于盐析的是()
- A. CaCl_2
 B. NaNO_3
 C. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
 D. MgCl_2
40. 大分子物质的分子量可以通过测定大分子溶液的渗透压确定。如 1.00g 某蛋白质溶于水配制成 100mL 溶液, 27°C 测得其渗透压为 0.37kPa , 则此蛋白质的相对分子质量是()
- A. 6.7×10^3
 B. 6.7×10^4
 C. 6.7×10^6
 D. 1.0×10^6
41. 两个与血浆等渗的溶液以任意比例混合, 所得混合溶液为()
- A. 低渗溶液
 B. 高渗溶液
 C. 等渗溶液
 D. 无法判断
42. 制备 AgBr 溶胶的反应为: $\text{AgNO}_3 + \text{KBr} = \text{AgBr} + \text{KNO}_3$, 如 KBr 过量, 则胶粒()
- A. 带正电荷
 B. 带负电荷
 C. 呈电中性
 D. 无法判断
- (提示: AgBr 沉淀将优先选择性吸附溶液中过量的、与自身组成中某种成分相同的离子, 在这里是 Br^- 离子, 按静电相互作用原理, 在这些负离子周围将排列电量相等的正离子(K^+), 但有一部分 K^+ 离子由于热运动离开吸附层, 形成扩散层, 因此应选 B)。

三、是非题

1. 摩(mol)是物质的质量单位()
2. 用 c_B 表示物质的浓度时必须指出基本单元()
3. $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的蔗糖溶液与 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 葡萄糖溶液具有相同的渗透压()
4. 因 $c = \pi/RT$, 通过测定一定温度下的渗透压 π 即可求出溶质粒子的渗透总浓度, 即此处的 $c = c_{os}$ ()
5. 两个等渗溶液只有以等体积相混合才能得到等渗溶液()
6. 渗透压较高的溶液其溶质的物质的量浓度一定大()
7. 高分子溶液属于均相系统, 是真溶液()
8. 由于胶团带电, 所以溶胶在电场中可产生电泳现象()
9. 溶剂透过半透膜向溶液渗透的压力称为渗透压()
10. 渗透方向是溶剂分子由高渗透浓度的溶液向低渗透浓度溶液渗透()

四、计算题

1. 市售盐酸溶液 HCl 的质量分数为 37%，密度为 $1.19\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求其质量浓度 ρ_B 和物质的量浓度 c_B 。
2. 用体积分数 ($V/V_{\text{总}}$) 为 95% 的酒精溶液，配制 500mL 体积分数为 75% 的消毒酒精溶液，需取 95% 的酒精溶液多少 mL?
3. 某患者需补 0.10mol Na^+ ，应补多少克 NaCl，若用生理盐水 ($9.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaCl}$) 溶液，则需要多少 mL?
4. 计算下列各溶液在 37°C 时的渗透压：
 - (1) $10.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 蔗糖 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 溶液；
 - (2) $10.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ KCl 溶液；
 - (3) $10.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液。
5. 将 0.500g 某蛋白溶于水，制备成 100mL 溶液，在 25°C 测得此溶液的渗透压为 0.717kPa ，试求此蛋白的相对分子质量。
6. 将 $10\text{mL } 0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KBr 溶液和 $100\text{mL } 0.04\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液混合制备 AgBr 溶胶，试写出 AgBr 溶胶的胶团结构式，并指出溶胶中胶粒的电泳方向。
7. 今有质量浓度为 $500\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 溶液和 $125\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHCO_3 溶液，分别求其物质的量浓度；如稀释 10 倍，求其渗透浓度，这两种溶液是否与血浆等渗。
8. 试证明两种等渗溶液按任意体积比混合（两溶液不发生化学反应），得到的混合液仍为等渗溶液。
9. 蛙肌细胞内液的渗透浓度为 $240\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，若将此蛙肌细胞分别置于 $10.0\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $7.00\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $3.00\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液中，将各呈现什么形态？
10. 测得 37°C 时人泪液的渗透压为 720kPa ，求此泪液的渗透浓度。
11. 测得正常人血浆的渗透浓度为 $304\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，今有 500mL 质量浓度为 $10\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 溶液，问
 - (1) 此溶液的渗透浓度是多少？是否与血浆等渗？
 - (2) 需加入多少 g NaCl 才能与血浆等渗？（假定加入 NaCl 后溶液体积变化忽略不计）

参考答案

一、填空题

1. 分子分散系、粗分散系及胶体；分子；分散质；分散介质
2. n_B , 6.022×10^{23}
3. m_B/V ; $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
4. 有半透膜、半透膜两侧溶液有浓度差
5. $\pi = cRT$
6. $280 \sim 320\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
7. 电学性质，光学性质；动力学性质
8. 选择性吸附和胶粒表面基团电离

9. 胶粒对入射光的散射;弱

10. 盐析

二、选择题

- | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. A | 4. A | 5. B | 6. A | 7. C | 8. C |
| 9. C | 10. D | 11. A | 12. B | 13. B | 14. A | 15. C | 16. B |
| 17. D | 18. A | 19. C | 20. B | 21. D | 22. C | 23. A | 24. C |
| 25. A | 26. C | 27. D | 28. B | 29. D | 30. A | 31. A | 32. A |
| 33. D | 34. D | 35. D | 36. A | 37. C | 38. A | 39. C | 40. B |
| 41. C | 42. B | | | | | | |

三、是非题

- | | | | | | | | |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. × | 2. ✓ | 3. ✓ | 4. ✓ | 5. × | 6. × | 7. ✓ | 8. × |
| 9. × | 10. × | | | | | | |

四、计算题

1. [解析]: 质量分数不涉及溶液体积, 而质量浓度 ρ_B 和物质的量浓度 c_B 均与溶液体积有关, 两者要靠溶液密度联系起来。先求 ρ_B , 再通过 ρ_B 与 c_B 的关系求 c_B 。

解:

$$\rho(\text{HCl}) = 0.37 \times 1.19 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} \times 1000 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} = 440.3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{HCl}) = \frac{\rho(\text{HCl})}{M(\text{HCl})} = \frac{440.3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}}{36.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 12.1 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

2. 解: 这相当于溶液的稀释, 设需取 95% (φ_1) 的酒精溶液为 V_1 (mL), 用水稀释至 V_2 (即 500mL), 则

$$\varphi_1 \times V_1 = \varphi_2 \times V_2$$

$$V_1 = \frac{\varphi_2 \times V_2}{\varphi_1} = \frac{0.75 \times 500 \text{ mL}}{0.95} = 395 \text{ mL}$$

3. 解: 因 n mol NaCl 中含 n mol Na^+ , 所以需补 0.10mol Na^+ 即需补 0.10mol NaCl, $M(\text{NaCl}) = 58.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$,

$$\text{需补 NaCl 的质量 } m = 0.10 \text{ mol} \times 58.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5.85 \text{ g}$$

$$\rho(\text{NaCl}) = 9.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\therefore \rho_B = \frac{m_B}{V} \quad V = \frac{m_B}{\rho_B}$$

$$\therefore V = \frac{5.85 \text{ g}}{9.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}} = 0.65 \text{ L} = 650 \text{ mL}$$

或者

$$c(\text{NaCl}) = \frac{\rho(\text{NaCl})}{M(\text{NaCl})} = \frac{9.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}}{58.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.154 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = \frac{n(\text{NaCl})}{c(\text{NaCl})} = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.154 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 0.65 \text{ L} = 650 \text{ mL}$$

4. [解析]: 题中给出的都是质量浓度 ρ_B , 而溶液的渗透压公式 $\Pi = ic_B RT$ 中, c_B 是物质的量浓