

改
夏
外科
大全

1665年



外科大成卷之四

太醫院御醫燕越祁坤廣生甫 輯著

不分部位小疵部

此皆小症不可紊亂於太毒之內故另分之

無名腫毒

無名腫毒者以其隨處而生不按穴次不可以命名也皆由風邪寒熱客於經絡之所致但其因風邪內作者則無頭無根因氣血相搏則有頭有根因風寒而成者則腫堅而色白因熱毒而成者則腫軟而色赤治法有表症者散之有裏症者下之外兼敷貼等藥總不外乎首卷腫瘍之例並宜參考

灸曲池穴甚効穴見首卷灸門

漏蘆湯 治癰疽疔腫不問陰陽初起者及初潰紅腫尚未消盡者並濕爛疥瘡等毒

漏蘆五錢紫花地

荊芥

當歸

連翹

薄荷

白芷

升麻各一錢麻黃三錢

大黃二錢生甘草四分

水二鍾煎八分食遠溫服蓋衣取微汗渣再煎溫服次日麻黃用二錢大黃用錢半甘草用六分溫服第三日則麻黃大黃甘草各用一錢溫服如其紅腫尚未消盡照第三日方再三服無不愈者是方也如不欲汗則麻黃少用溫服之如大便不實及不欲下者則少用大黃不用亦可隨病上下在食前食後服 如便毒服利藥正氣傷皮厚未穿者服此一汗不礙而穿

飛騰神駿膏 治癰疽腫毒瘰癧鼠瘻

麻黃去節杏仁泡去皮尖

木別子用一觔頭髮洗淨

共入大銅鍋內入水二桶炭火煎減半取汁渣再煎二次絹濾淨并一處復將燈草頭髮黑鉛同汁

共入大銅鍋內入水二桶炭火煎減半取汁渣再煎二次絹濾淨并一處復將燈草頭髮黑鉛同汁

煎至成膏去此三味再煎稠收罐內香甜久貯不壞每服三錢熱酒調服隨飲至醉為度蓋卧出汗避風一日次日食猪蹄補之 此方於初起時及將潰時服之神驗

軍門立効散 治癰疽諸毒對口閉骨等症

皂角刺三錢炒熟入乳香五七分炒天花粉三錢甘草節一吋長川椒三十粒

黃酒二鍾煎一鍾溫服未成者即散已成者即潰已潰者不宜服

一用皂刺三錢乳香三錢天花粉三錢甘草節三錢

炒製如法酒煎服治紅腫喉痛便秘者甚捷

壺公妙劑散 一切諸毒乳癰便毒筋骨疼痛不問新久悉皆神驗

川山甲炒葫蘆巴 槐花 黑丑炒 當歸等

為末每服五錢用溫酒調成塊挑入口內隨用溫酒送下隨飲幾盃以助藥力

榮衛返魂湯

赤芍 木通 白芷 何首烏 枳殼 烏藥 當歸各一小茴香五甘草三

水一鍾酒一鍾煎八分溫服

初起堅硬如石者加川芎麻黃獨活蔥頭水煎熱服出汗 胃寒生痰者加半夏 鬱熱生痰者加

桔梗久不愈食少色痿者涼藥太過也去木通加當歸倍加陳皮厚樸甚者再加白豆蔻 肺癰腸

癰內癰等症倍加忍冬藤此藤治內癰之神藥也補加大附子利用酒大黃 隧痰失道陽少陰多

者加升麻以除其寒 久潰無膿時流薄血壞肉如絮努肉如突者宜之外用枯礬朴硝末滲之忌

用刀針蝕藥

老弱者患於上部去木通恐導虛下元氣血盛者減當歸多能生血恐再結不已泄瀉者先服蠟礬

丸米湯下瀉止再服 腰痛經年不愈者加草薢玄胡索 腳氣加檳榔木瓜川山甲 熱痰咳嗽

加紫蘇 疔氣嘔逆加木香 此藥救壞症活死肌強患於未萌之前拔毒於既愈之後扶胃本而

不傷元氣更不分經絡但漫腫堅硬不紅不痛者用之悉驗

托裏溫經湯 治寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中不得伸越聚毒腫痛惡寒發熱或相引肢體疼痛者

麻黃 防風 蒼朮 白芷 升麻 葛根 人參 當歸 白芍 甘草

再服去麻黃防風加牛旁子連翹

麻黃苦溫防風辛溫發散者也升麻苦平葛根甘平專陽明解肌者也血留則痛歸芷辛溫破血散

滯濕盛則腫蒼朮苦溫瀉湊裏之邪參甘草溫白芍酸寒調中托裏水煎熱服蓋卧之使陽氣伸而

汗出其腫自消去麻防加旁翹其痛自止

加減瓜婁散 治內癰腦疽背腋諸毒瘰癧便毒乳疽乳岩等症未成者即消已成者連潰

大瓜婁者用二箇子多者佳少 當歸三錢沒藥二錢乳香一錢甘草三錢金銀花五錢生薑五錢

用無灰酒二碗煎一碗服 將潰者加皂角刺五錢 乳癰腦疽加蒲公英土貝母各五錢潰後用

參芪補之

滌風散 熨風腫疼痛 羌活 防風 白芷 芫花 官桂 當歸 芍藥各五

羌活 防風 白芷 芫花 官桂 當歸 芍藥各五

移險散

為粗末赤皮葱連鬚切用醋醋拌勻炒熟帛已於瘡上熨之稍冷易之痛止為率

南星 白芨 草烏 黃柏略二文蛤炒一

為末調如糊隨血圍匝如牆壁可移險處就不險處

水調此藥敷前圍藥之內提起內毒制之有理

葫蘆化毒丹 治一切腫毒熱癰

大黃 黃柏 遠志等分

為末用猪膽汁和成錠雄黃為衣陰乾用時以米醋磨如墨以鵝翎蘸藥頻塗患處

醒肌膏 治腫毒惡瘡及風氣腫疼鶴膝風冷濕痛腰痛脚氣痛婦人產後受風經絡冷痛

廣膠四兩用葱薑取汁各一碗 浸膠過宿文火煎膠化入硫黃一兩 草烏一兩 蔥粉一兩 薑粉一兩 煎成膏再加蟬酥錢

麝香分 乳香錢 沒藥錢

各末和勻煨滾水內刷絹帛上貼之以熱鞋底熨之俟痛止變麻木則允肌活矣 一制皮紙上

用時隨大小煎貼熨之宜與首卷牛膠蒸法參考 取薑葱粉法薑葱各半計三二碗薄鋪磁器內晒乾成粉

滲雪膏 治一切風熱攻注頭面四肢腫痛

朴硝二升於臘月中入新瓦礮內中熱水令滿攪勻掛簷下俟硝滲出礮外陸續收之用人乳調

瑞龍膏 敷一切腫毒對口乳癰便毒紅腫焮痛者不問未成已成悉效

鮮鯽魚大者一條 鮮山藥如魚長一條去皮

先將魚入石臼內杵爛次入山藥再杵如泥量加水片和勻攤敷腫處綿紙蓋之黃酒潤之

凡腫毒已成者如純陽症則孔似蜂窩用貝葉膏貼之日換七八次善能止痛呼膿生肌完口更無粘連

之苦 半陽半陰症者則漫腫無頭微紅微熱用紺珠膏貼周圍腫處中留頂塗玄珠膏再以黑膏蓋

之則餘腫自消膿從孔出內服托裏之劑 純陰症者內服辛熱大補之劑外用神妙拔根方以疎其

毒已上諸方俱見首卷

丹毒

丹毒者為肌表忽然變赤如丹塗之狀也經曰少陽司天客勝則丹疹外發及為丹燦然二症亦有紅濕乾濕痒痛之殊故用藥則分表裏補瀉之異如赤色而乾發熱作痛者為丹毒屬肝心之火宜化班解

成片皮色不變者為冷膜故天陰則劇風中亦劇晴暖則減身暖則瘡由風邪外襲熱鬱於肌膚也宜
藿香正氣散發之外以枳殼煎湯浴之忌用風藥 再如丹毒由胃氣虛極致令虛火遊行於外者又
宜補以降之用人參^{五錢}當歸白朮^{各一錢}水煎服之 又如女子十五歲而經脉未通者多發丹疹此
由血有風熱乘之也治宜涼血虛則補之慎投風藥
化斑解毒湯 治二焦風熱上攻致生火丹延及遍身而作痒痛

玄參

知母

石膏

黃連

牛蒡子

人中黃

升麻

連翹

甘草五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分服

除濕胃冷湯

治脾肺濕熱致生火丹作爛疼痛者

防風

蒼朮

白朮

赤茯苓

陳皮

厚朴

猪苓

枝子

木通

澤瀉

滑石^{各一錢}薄桂

甘草^{各三錢}

水二鍾燈芯二十根煎八分服

藿香正氣散

治冷膜由風寒外襲者

藿香

白朮

白芷

桔梗

紫蘇

陳皮

半夏

大腹皮

厚朴

甘草

水二鍾生薑三片紅棗二個煎八分服

芸臺菜方

治丹毒

芸臺菜子一兩黃酒一鐘和研濾去渣煎四五沸溫服之

一杵芸臺菜葉數之乾者為末^{水調}

柏葉散

治丹毒痒痛并效

側柏^剉

黃柏

大黃^{各五錢}

赤豆^{三錢}

蚯蚓^糞

雜菜^{田內}

輕粉^{三錢}

為末新汲水調敷

一搗大蒜厚塗之乾則易之

赤白遊風

遊風者為肌膚條然赤腫痛遊走無定由風熱壅滯榮衛不宜則善行而數變矣較之丹毒只紅腫起
粟而不走故與遊風為異耳其風熱者則色赤宜小柴胡湯加防風連翹清之內熱甚者紫雲散下之腫
勢甚者破之風寒者則色白宜荆防散毒散散之再血熱者四物湯加紫胡枝子丹皮胃虛者補中益氣
湯加防風羌活肝腎虛熱者宜加味道遙散六味地黃丸以滋化源則火自息風自定痒自止矣誤用祛
風辛熱之藥復傷元氣則客風內淫血隨火化反為難治赤腫遊入腠者不治宜與小兒赤遊風門參攷
有因過飲燒酒而有是飲冷米醋一二杯即解此又是似而非也宜細之
荆防敗毒散 補中益氣湯 六味地黃丸 加味道遙散 小柴胡湯 俱見瘰癧

癰疹

癰疹者生小粒屬於皮膚之中憎寒發熱遍身搔痒經云勞汗當風薄為鬱乃瘡痒熱微色赤熱甚色黑
由痰熱在肺治宜清肺降痰解表如消毒飲子有可下者大柴胡湯虛者補中益氣湯或總以加味羌
活散治之 疹屬少陰君火班則無頭焮腫於外屬少陽相火自吐自利身溫身涼者吉忌敷涼藥首
尾慎下若復開者微利之故凡癰疹瘡痒疔瘡丹毒等症皆宜涼血潤燥如加味道遙散加味小柴胡
湯慎用風藥復傷元氣反致筋攣若愈後肌生白屑搔之如帛所隔者氣血虛也十全大補湯 或灸
油池穴 腧灸

加味羌活湯 治風寒暑濕外搏肌膚發為癰疹憎寒發熱遍身搔痒或赤或白甚則心迷悶亂口苦咽乾

羌活 前胡 一人參 桔梗 甘草 枳殼 川芎 天麻 茯苓 錢各五

蟬蛻 薄荷 錢各三

右為末每服三四錢生薑三片水一鐘煎七分去渣溫服

羽液膏 治斑疹風痒不止

白礬五兩童便一升黃酒三合

補中益氣湯

十全大補湯

加味小柴胡湯

加味逍遙散

諸痒

諸瘡痛痒皆屬於火又云風盛則痒蓋為風者火之標也凡風熱客於皮膚作痒起粟者治宜疎風如換肌丸苦參丸等若風熱內淫血虛作痒者又當涼血潤燥如逍遙散柴胡湯之類也

神仙換肌丸 治皮膚風熱如蚤虱叮咬痒不可忍者

蟬腿焙

鹽蚕焙

防風

片苓酒炒

何首烏各兩

枝子酒炒

白芷八錢

荆穗錢

羌活錢

地膚子

右為末酒糊為丸茶豆大每服三二十丸茶清送下

苦參丸

治風疹遍身痒痛難忍涎多不寐者

苦參一兩

為末用皂角

水一升搗濾取汁石器煎成膏和九子大每服二十丸溫水送下

四生丸

治渾身麻痒或麻痺不仁或生癰疹或外腫血風頑瘡骨節痛不能履

地龍土

鹽蚕炒

白附子

五靈脂

草烏皮尖

為末米糊丸桐子大每服三四十丸茶清送下

二味消毒散

治遍身起瘰作痒用此乾擦之自止

明礬

雄黃

共為末

遍身痒如蟲行者用鹽一斗水一石煎七斗澄清洗之

加味通聖散

治風餅風丹作痒

防風

川芎

當歸

白芍

白朮

甘草

連翹

薄荷

枝子

桔梗

麻黃

石膏

滑石

荆芥

黃芩

杜硝

大黃

蟬腿

枳殼

用水二鐘煎八分熱服

一用鹿角磨酒熱服煎鳳仙花科洗之

蛇床子湯

狼毒膏

俱見腎囊風

三因四生散

俱見腎囊風

羽液膏

俱見癰瘡

諸痛

諸痛之為症也有各門之所未備其立方也有各門之所未載今彙之於一以便採用庶無遺失

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦痛惡寒心煩腹悶脈沉而逆項背腰脊髀骨膝等痛

蒼朮四兩水二碗煎 黃柏二錢 羌活 柴胡 升麻 藁本 白朮

蠲痛無憂散 治一切腫毒痛筋骨痛頭痛風寒濕痺遍身疼痛脚氣痛風及大麻風等症

蒼朮米泔水浸 半夏薑汁 川山甲陳土炒 川烏黑豆酒煮 草烏生薑 苦食麻油 當歸酒洗 甘草略二

麻黃三兩 藏靈仙兩 開楊花醋浸炒黃

各製為末和勻每服五七分至一錢無灰酒調服再飲以醉為度蓋卧出汗立驗避風

尋痛丸 治遍身走注疼痛并一切腫毒疼痛

五靈脂 草烏炮 杏仁略一 沉香 木香略五 麝香錢 右為末酒糊為丸桐子大每服二

十九溫黃酒送下如治腫毒杏仁易桃仁沉香木易乳沒各等分燒酒下

桑皮飲 治皮膚痛不可以手按者

桑白皮二錢 乾葛 柴胡 黃芩 玄參略一 地骨皮 天門冬 麥門冬略一 錢木通

甘草各五 用水二鐘生薑三片葱頭一個煎一鐘熱服出微汗

槐花散 治皮膚痛雖蒼蠅飛上即痛者

槐花炒 為末每服三錢溫黃酒調服

魚鱉散 治遍身酸軟作痛者腰痛

魚鱉四兩 為末每服五錢溫黃酒送下

藏靈仙桂湯 治產後經風痛不可忍并痢後風

威靈仙 肉桂
六合散 治一切腰疼

木香

乳香

沒藥 錄二

水二鍾煎八分服

羌活

獨活

大茴香

小茴香

杜仲

當歸 錄二

鵝寶散

治脇痛疝氣痛

鵝眼積實焙

小茴香炒

各為末等分和勻每服二錢用小黑豆同艾葉炒熱沖黃酒於內去渣調前末藥食前服之立止

不龜手膏

治冬月手足裂痛

猪脂油

四兩 白蠟 二兩 融化

白芷

升麻 錢一

猪牙皂 錢一

丁香 五

麝香 二

為細末入前油蠟內和勻先用葱湯洗手淨拭乾烘手熱取前膏一塊於手心內搓之令手掌油潤去藥則隻手於火上烘之搓之以油乾為度則裂痛立愈更且滋潤肌膚勝裂口藥多矣

大麻風

大麻瘋癩瘋也由水枯火盛乘天地肅殺之氣所致形雖見於皮毛瘋毒積於臟腑上而下者為順下而

上者為逆漸來可治頓發難醫必先麻木不仁次發紅斑再次浮腫破爛無膿再久之熱濕生蟲攻蛀

臟腑如蟲蝕肝則眉落蟲蝕心則目損蟲蝕脾則唇反蟲肺則聲嘶蟲蝕腎則耳鳴足底穿為之五敗

又皮死麻木不仁肉死割截不痛血死內潰成瘡筋死指節脫落骨死鼻梁崩塌為之五不治夫瘋之

中人也必從虛入故須絕情慾必癰滯經絡故須食清淡必先麻痺故須用疏通如麻黃桂枝之類是

也今則初以紺珠丹汗之次以蘆薈丸清熱殺蟲用神應養真丹如白花蛇等分久服可愈然諸痺諸

瘡不得舍六味丸八味丸六君子湯十全大補湯補中益氣湯以培補之

再造丹

治大麻風

生漆 松香各半斤和勻大蟹一隻和小者倍之此益一個埋半截於土內日晒之以

雄黃 半斤飛蛇蛭條 川烏 草烏浸鹽汁人參天麻各二

右為末用蟹漆汁為丸聽用 初用麻黃蘇葉各半防風荆芥各四煎湯一桶沐浴浸洗換新衣服

九藥錢黃酒送下再飲至醉蓋卧出汗汗乾脫去衣於空地焚之另換新衣至午再服三錢黃酒下

至醉再用夏枯草蒸鋪席下卧之不取汗次日沐浴服藥至醉鋪夏枯草卧照前將舊衣舊草取出

焚之如此七日其病盡出如豆如瘡再服一七瘡俱脫殼五七日全瘡真至藥也終身忌螃蟹并狗肉

再造散 治大麻瘋眉落脚爛底穿者

苦參 六兩半 乾漆 兩 甘草 錢五 川山甲 炒二兩

右為末每服五分用鮮蟹二隻杵爛取汁加酒調服日進二服至十日則長肉生眉

梧桐葉散

臭梧桐葉同捲的陰乾為末初服七分每日加一分至錢四分為率又每日退一分至七分為率俱用無反酒調服避風初一服則小便如油至四服渾身骨响至八服汗出如泉冷至十二服麻木處有紅點則知痛痒至十五日發班如雲片以磁鋒砭出黑血仍用梧桐末搽之愈忌食鹽醬母猪牛

羊燒酒麪食房勞一切發物

白茅藤酒 治大麻瘋并三十六種瘋

白茅藤根於石臼內杵粉每用粉四兩糯米一斗蒸飯做酒或每酒一升用藥三兩煮服以醉為

度

何首烏酒

何首烏 四兩 生地 熟地 歸身 歸尾 川山甲 蠟蜈蚣 一 川烏 草烏

五加皮 公針 則白各四

用黃泥一斗同入鐵內封固重湯煮三炷香埋臘七日時時服之令醺醺然作汗過服

加減地黃丸 治大麻瘋將愈服此以培元氣

熟地四兩 山藥 山萸 茯苓 丹皮 五加皮 杜仲 牛膝 金銀花

遠志各二兩 猪腎四具 紫河車一具 共末煉蜜為丸梧子大每服百丸空心淡鹽湯送下

紺珠丹觀腫 蘆薈丸觀疳 神應養真丹見服部

癩瘋

癩瘋亦由犯肅殺之氣所致有烏癩白癩之殊蓋烏者皮毛變黑痒如蟲行或如癰疹結核手足頑麻針

刺不痛脚如拘肘如縛眼見物如垂絲心常恐怖言語及食時出氣而鳴若白者皮色變自四肢頑疼

肉如針刺手足緩縱背脊拘急鼻生息肉腫生白沫目暗聲嘶身熱心煩為異耳

希發膏丸 治癩瘋作痒及癰瘕

希發草杵汁煎膏和希發草末為丸每服三錢黃酒送下老弱者用人參蘇木煎膏量用數匙和酒

送丸藥

松漆丸 治癩瘋麻瘋紫雲瘋

漆樹頭四兩 松節醋炒九次 皂角刺燒酒炒九次

各為末和勻酒糊丸胡椒大每服錢許早晚二服茶清送下七日見效藥盡自愈

二聖不老丹 治癩瘋麻瘋眉髮脫落

側柏葉酒浸九次 白松香煮煉九次

大黑神膏 治諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏 川芎 升麻 防己 黃柏 黃連 藜蘆各五錢 巴豆 杏仁各十粒

亂髮雞子大 猪脂二斤煎藥溶化 雄黃 雌黃 胡粉 白礬各五錢 松脂雞子大

右為末入油內攪勻收磁器內先以熱鹽湯洗淨次搽藥日三次勿令入口

搜風順氣丸 治三十六種瘋七十二般氣瘋氣脚氣惡瘡下注上熱下虛腰腿疼痛四肢無力一應男

婦老幼不問虛實並宜常服潤三焦和五臟調腸胃除風濕瘰癧瘰癧言語蹇澁理腸風使血除根

大黃酒浸九蒸

火麻仁微火焙

獨活

郁李仁滾水浸

枳殼炒

檳榔

車前子酒炒

兔絲子酒煮

山藥

牛膝酒浸

山茱萸去核酒浸

各二兩加羌活

活雨

右為末煉蜜為丸梧子大每服三十九茶酒任下早晚各一服

癰瘍瘋

癰瘍瘋腫於頭項其色紫而點點相連且無痛痒若白駿風形如雲片為異耳

藏靈仙散 治癰瘋囊瘋紫雲瘋頭瘋歷節瘋破傷瘋皮膚瘋痒及疥癬癰癰腫毒

藏靈仙酒拌九晒

為末每服二錢酒下或米糊為丸服惟忌茶麪

松漆丸

希發膏丸

搜風順氣丸癰見

白駿瘋

白駿瘋起於頭面其色駿白亦無痛痒形如雲片宜先刮患處至燥痛取鰻魚脂敷之三上自效內服浮

浮萍丸蒼耳膏等或可奏效

浮萍丸 治一切瘋麻瘋頭瘋瘋瘋疹此藥味辛氣寒輕清入肺達膚出汗與麻黃同功

浮萍取紫背大者置篋墊

為末煉蜜丸為彈子大用豆淋酒下 豆淋酒法黑豆半升炒烟起冲入酒三升浸一周時去豆取

酒送藥

台者風風濕四肢拘攣一切瘡疹

蒼耳子連根帶葉取五七十斤洗淨以碎入大鍋內煮取汁入酒一斗煮至一斗五升去渣取汁以桑木匙挑一匙於口內噙之然後用黃酒送下有回生之功服後如有瘋處出小瘡如豆粒此瘋毒出也刺破出汁盡自愈

紫白癩瘋

癩瘋

俗名汗斑也

紫因血滯白因氣滯皆由熱體被風濕所侵留於腠理搔之起皮而不痛此從外來治宜汗

之如紺珠丹松漆丸浮萍蒼耳之類再灸夾白穴擦入葳靈散自當獲效非若白駁瘋之難療也

八葳靈散

治擦紫白癩瘋

大附子

錢川烏

草烏路一雄黃

硃砂各五

紅砒四

硫黃三

麝香二

共為細末用雞子清稀漿小麻布手巾二條陰乾用河水薑汁米醋三味和一處以藥手巾蘸濕擦

患處待行動汗出時擦之夏月治尤佳

灸夾白穴法

先以墨塗兩乳頭次令兩手直伸夾之染墨處是穴灸二十七壯或針刺出血亦愈

浮萍茯苓丸

治紫白癩瘋

浮萍一

茯苓半

右為末煉蜜為丸梧子大每服三二錢黃酒下

紺珠丹觀腫

松漆丸觀癩

蒼耳膏觀胎

諸瘡

諸瘡者以其隨處而生不按穴次不可以命名也經云諸瘡痛痒皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土是中濕

熱相合潰敗肌膚而成瘡也然有淺深表裏之異治有汗下補瀉之宜如瘡在皮膚者則當因其輕而

揚之汗之浴之以散膚腠之邪外以殺蟲潤燥等藥敷之瘡在肌肉者則當因其重而減之清之涼之

以瀉經絡之熱外以化膿生肌等膏燭之瘡在顛頂者則當因其上而射之用寒涼藥以酒浸之灸之

更以風藥升而上之外以殺蟲解熱等藥敷之明此三者其於治瘡思過半矣

救苦黃芪散 治一切瘰癧端午日合尤佳

黃芪

當歸

芍藥

天花粉

甘草

各兩

五錢

金銀花

木瓜

熟地

皂角

刺楸

右為粗末磁罐密收之每服五錢用無灰酒一升或酒水各半入瓶內封口重湯煮藥氣透出為度取出澄清飲之

洗諸瘡藥方

二兩枯礬四兩椒半觔野菊一觔硝七分分開煎數滾一日一換洗三遭淫濕疥癩頑癰膿血風瘡一藥拋 一用苦參大腹皮煎洗

碧螺膏

見葉膏韻觀

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

翻花瘡

元如道遙散歸脾湯之類外摻貴金散或烏梅煨灰敷之或馬齒莧煨灰猪脂調敷甚者用銅錄鉛粉等分香油調敷

一人患穿踝疽形翻突如剖破石榴但其色紅而不艷余以銀針於肉珠上遍刺之流紫黑血共約碗許隨以玄珠膏塗之黑膏蓋之次日縮小大半又如前刺三日三刺消完方露瘡口內服大補丸湯以培元氣外摻生肌藥方能收口

逍遙散

歸脾湯

貴金散

瘰癧門

玄珠膏

生肌散

見葉膏 韻觀

疥瘡

疥者微疾也亦從臟腑而生必先出於手何則疥云吾不根而生不母而成稟陰陽氣育濕熱化形益手掌乃大陰濕土所主手心屬太陽相火所司此無情而化有情如腐草為螢朽麥為蝶之意也夫形有

五如多痔少痛為蟲疥屬肝宜蘆薈丸火鬱者逍遙散煖赤細粒為砂疥屬心宜涼膈散犀角飲子久則酒蒸黃連九黃泡脹痛為濕疥即膿疥屬脾宜蒼朮膏升麻和氣飲膿清色淡不腫為水疥屬腎宜六味地黃九加味逍遙散碎粒抓之起皮為乾疥屬肝宜搜風順氣九久則天門冬膏蜜湯下諸疥宜炙曲池穴間使穴各二十七壯

疥生於頭面胸背者氣血虛也十全大補湯加金銀花何首烏牛蒡子則胸背之瘡先愈便利熱渴脾肺虛熱也竹葉黃芪湯飲冷作痛脾熱也清熱消毒飲體倦食少脾虛也補中益氣湯肺熱內熱及寒熱者肝虛也加味逍遙散六味地黃九盜汗少寐脾鬱也加味歸脾湯逍遙散地黃九發熱盜汗腎虛也六味地黃九

犀角飲子 治心經細粒砂疥

犀角屑 石菖蒲 木通

玄參

赤芍

甘菊花

甘草

赤小豆炒

用水二鐘生薑三片煎八分服

酒蒸黃連九 治砂疥

黃連酒二兩用黃

為末米糊為丸梧子大每服二錢滾白水下

蒼朮膏 治膿濕疥

南蒼朮十觔切片砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以米無味為度并汁一處用小鍋煎如前

一寸加汁一寸煎成膏加蜜四兩空心滾白湯調服

升麻和氣飲 治膿疥及熱腫脹痛大便閉者

升麻 葛根

蒼朮

桔梗各一錢

枳殼

茯苓

白芷

當歸

赤芍

錢一乾薑

甘草各五

大黃腫

生薑三片水煎食遠熱服

加味補中益氣湯 治膿疥而無完膚者

黃芪^{二錢} 人參 白朮 當歸^{各五分} 粉草^{一錢} 陳皮^分 柴胡 升麻^{各五分} 蒼朮^錢

防風 玄參^{各八分} 黃連 黃芩 黃柏^{各五分}

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食遠溫服

涼血四物湯 治膿疥寒熱腫脹作痛者血虛也

當歸 川芎 赤芍 生地 蘇木 連翹 黃連 防風^{各一錢} 甘草^{五分}

水二鍾煎八分食遠服

黃芪化毒湯 治乾疥搔痒見血無膿者

黃芪^{錢五} 連翹^{二錢} 防風 當歸 何首烏 白蒺藜^{各一錢} 水煎服能化毒生膿如日久不

乾再加白朮^{二錢} 茯苓^錢 以燥之

蒼朮湯 薰洗膿窠等疥

南蒼朮片^{一錢} 水一鍋煎至八分去渣取汁浸洗久之次取渣置炭火於斗內加末於火上焚之以手

架斗上薰之上以綿帛蓋之勿令泄氣立驗

薰疥方

核桃^{一個} 油者^{仁更佳} 膠棗肉^{一錢} 水銀^{二錢} 研勻入殼內合口糊紙條封縫二層用時取紅炭置爐內將

藥桃安火上不住撥轉令挑殼遍熏火將入內時將爐入被內令患者曲膝駕被薰之以絹帛護陰

囊塞被頭露頭面候烟盡取出次日其疥更盛由內毒盡發於外也避風二日照前再薰一箇則瘡

結痂陸續脫愈至重者不過三箇

薰疥餅子

銀硃^錢 桑木炭^{五錢} 紅棗肉^{二錢} 共搗如泥分六丸晒乾每用一丸薰被