

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛 己立齋補註
鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷六

婦人熱勞方論第一

婦人熱勞。由心肺壅熱。傷於氣血。以致心神煩躁。頰赤頭疼。眼澀唇乾。口舌生瘡。神思昏倦。四肢壯熱。食飲無味。肢體酸疼。心怔盜汗。肌膚日瘦。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其病自愈矣。

愚按前症乃壯火食氣。虛火煎熬真陰之所致也。王太僕云。如大寒而甚。熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。是無火也。當治其心。如大熱而甚。寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽往來。時動時止。是無水也。當助其腎。心

盛則生熱。腎盛則生寒。腎虛則寒動於中。心虛則熱收於內。竊謂前症。若肝脾血虛。用四物、參、朮、肝脾鬱怒。小柴胡、合四物湯。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝脾血虛。加味逍遙散。肝經風熱。加味小柴胡湯。心經血虛。天王補心丹。肺經氣虛。人參補肺湯。肝經血虛。加味四物湯。大抵午前熱屬氣分。用清心蓮子飲。午後熱屬血分。用四物、參、朮、丹皮。熱從左邊起。肝火也。實則四物、龍膽、山梔。虛則四物、參、朮、黃耆。熱從臍下起。陰火也。四物、參、朮、黃柏、知母。酒拌炒黑。五味、麥門、肉桂。如不應。急用加減八味丸。不時而熱。或無定處。或從脚心起。此無根虛火也。用加減八味丸。及十全大補湯。加麥門、五味主之。

附治驗

一婦人經行不調。飲食少思。日晡熱甚。余以爲肝脾氣血俱虛。用十全大補。加山茱、山藥、丹皮、麥門、五味而愈。次年秋。寒熱如瘧。仍用前藥而愈。

一婦人生育多胎。月經不調。兩足發熱。年餘。其身亦熱。勞則足痠痛。又年許。脣腫裂痛。又半年。脣裂見血。形體瘦倦。飲食無味。月水不行。此氣血俱衰之症。彼誤用通經丸等藥。復傷氣血。遂致不起惜哉。

黃耆散 治發熱羸瘦心躁口乾。不欲飲食。或盜汗晡熱。

人參

黃芩炒焦

當歸各三錢

柴胡五分

黃耆炒

地骨皮

白茯苓

麥門冬去心

生地黄

白芍藥炒各錢

甘草炒三錢

右水薑煎。

猪肚丸 治熱勞羸瘦。

柴胡

赤茯苓

人參

黃耆各一兩

黃連炒三兩

地骨皮

木香各五錢

黃桃仁去皮

鱉甲各一兩

右爲末。用嫩猪肚一枚。入藥縫合。蒸熟研爛。丸桐子大。每服三五十丸。食前米

飲下。日二服。

附方

清心蓮子飲 治熱在氣分。口乾。小便白濁。夜間安靜。晝則發熱。又治口舌生瘡。或口苦咽乾。煩躁作渴。小便赤澀。下淋不止。或莖中作痛。

黃芩炒

麥門冬去心

地骨皮

車前子炒

甘草各一錢半

石蓮肉

茯苓

黃耆炒

柴胡去苗

人參各一錢

右每服五錢。水煎。

補中益氣湯

加味四物散

四物湯三方見二十卷第六論

加味小柴胡湯

小柴胡湯二方見二十卷第二論

十全大補湯

加味逍遙散二方見二十卷第四論

天王補心丹。寧心保神。益血固精。壯力強志。令人不忘。清三海。化痰涎。祛煩熱。

除驚悸。療咽乾。育養心神。

人參去蘆

茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志各五錢

當歸酒浸

五味

麥門冬去心

天門冬

柏子仁

酸棗仁炒各一兩

生地黃四兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。用硃砂爲衣。每服二三十丸。臨臥。竹葉煎湯送下。

方。多石菖蒲、熟地黃、杜仲、百部、茯神、甘草。此方內天麥門冬、玄參、生地。雖能降火。生血化痰。然其性沉寒。損傷脾胃。尅伐生氣。若人飲食少思。大便不實者。不宜用。

人參補肺湯

方見二十四卷第十二論

加減八味丸

方見二十四卷第十一論

婦人客熱方論第二

婦人客熱。由元氣虛而外熱乘之。以致口燥心煩。四肢壯熱。肌肉消瘦。治法當審其因而調補之。

愚按前症若客邪所侵。用補中益氣。加川芎、防風。肝虛血少。六味地黃丸。胃火飲冷。錢氏瀉黃散。胃虛飲湯。七味白朮散。潮熱時熱。八珍湯。晡熱內熱。逍遙散。發熱體倦。補中益氣湯。恚怒發熱。小柴胡湯。鬱怒發熱。加味歸脾湯。寅卯酉戌時熱。升陽益胃湯。

附治驗

一婦人素有胃火。服清胃散而安。後因勞役。燥渴內熱。肌肉消瘦。月經不行。此胃

火消鑠陰血。用逍遙散。加丹皮、炒梔以清胃熱。用八珍湯、加茯苓、遠志以養脾血。元氣充足。而經自行矣。

麥門冬散 治四肢倦痛。煩悶不食。或寒熱往來。

麥門冬 去心

柴胡

赤茯苓

羚羊角 鑊

赤芍藥

桑白皮 炒

黃耆 炒各四分

生地黃

甘草 炒各三分

右薑水煎。

附方

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

瀉黃散

方見五卷第三論

七味白朮散

方見二十一卷第二論

八珍湯

加味歸脾湯

逍遙散

三方見二十四卷第四論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

升陽益胃湯

見三卷第九論

清胃散

見二十四卷首論

婦人寒熱方論第二

經曰陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。皆由勞傷氣血。陰陽不調。寒熱如瘧也。當分氣血虛實而治之。

愚按前症若寸口脈微。名曰陽不足。則陰氣上入於陽中。用補中益氣湯。若尺部脈弱。名曰陰不足。則陽氣下陷入陰中。用益陰腎氣丸。若因氣血俱虛。用八珍湯。若因怒動肝火。用小柴胡湯。若陰陽俱不足。則氣血不歸其本部。以致寒熱交爭也。

附治驗

一婦人年六十有四。久鬱怒。頭痛寒熱。春間乳內時痛。服流氣飲之類益甚。時有血如經行。又大驚恐。飲食不進。夜寐不寧。兩乳腫脹。兩脇腋痛。午後色赤。余以爲肝脾鬱怒火躁。先以逍遙散。加酒炒黑龍膽一錢。山梔一錢五分。服二劑。腫痛頓愈。又二劑全愈。再用歸脾湯。加炒梔。貝母。諸症悉愈。

地骨皮散 治血風氣虛。時作寒熱。或晡熱內熱。

柴胡

地骨皮各一兩

桑白皮炒

枳殼麵炒

前胡

黃耆各五分

白茯苓

五加皮

人參

甘草

桂心

白芍藥各三分

用薑水煎服。

柴胡散 治寒熱體痛。口乾心煩。飲食少思。肌體消瘦。

柴胡

黃耆炒

赤茯苓

白朮各一錢

人參

地骨皮

枳殼麴炒

生地黃

苦梗

桑白皮炒

赤芍藥各三分

鱉甲炙二錢

麥門冬去心一錢

甘草三分

用薑水煎服。

益陰腎氣丸

治諸臟虧損。發熱晡熱。潮熱盜汗。或寒熱往來。五心煩熱。或口乾

作渴。月經不調。或筋骨痠倦。飲食少思。或頭目不清。痰氣上壅。咳嗽晡甚。胸膈

痞悶。或小便赤數。兩足熱痛。或脚足痿軟。肢體作痛等症。此壯水之主。以制陽

光之劑也。

澤瀉

茯苓

生地酒拌

牡丹皮

山藥

萊菔肉

當歸

五味子炒并

熟地自製
枏膏

右爲末。入二膏。加煉蜜。丸桐子大。硃砂爲衣。每服五十丸。空心。淡鹽湯下。

補中益氣湯方見二十四
卷第六論

六味丸方見二十四
卷第十一論

小柴胡湯方見二十四
卷第二論

八珍湯

逍遙散

歸脾湯三方見二十
卷第四論

寡婦寒熱如瘧方論第四

倉公傳與褚氏論。皆云師尼寡婦。獨陰無陽。慾心萌而不遂。是以慊慊成病。以致乍寒乍熱。而類瘧狀。久則爲勞。又有經閉白淫。痰逆頭風。膈氣痞悶。面黧瘦瘠等證。皆寡婦之病。診其脈。獨肝脈弦出寸口而上魚際。皆血盛而致。經云。男子精盛則思室。女人血盛則懷胎。觀其精血。思過半矣。

愚按。前症若肝脈弦出魚際。用生地黃丸。血虛。佐以四物湯。若兼怒動肝火而寒熱。佐以加味逍遙散。若虧損肝經而寒熱。佐以八珍湯。若虧損元氣而寒熱。佐以補中益氣湯。若鬱傷脾氣而寒熱。佐以濟生歸脾湯。

附治驗

一寡婦不時寒熱。脈上魚際。此血盛之症。用小柴胡湯。加生地黃治之而愈。但畏風寒。此脾胃氣虛。用加味歸脾。補中益氣。二湯兼服而止。

一婦人因夫久出經商。發寒熱。月經旬日方止。服降火涼血藥。內熱益甚。自汗盜汗。月經頻數。余曰。內熱自汗。乃脾氣虛弱也。月經頻數。乃血不歸脾也。用歸脾湯。六味丸而愈。

一室女寒熱。肝脈弦長。而出寸口。用小柴胡湯。加生地。烏梅治之而愈。既嫁而諸症悉痊。

一室女久患寒熱。月經失期。以小柴胡湯。加生地。治之少愈。更以生地黃丸而痊。生地黃丸。許學士云。有一師尼惡風體倦。乍寒乍熱。面赤心煩。用大小柴胡湯雜進。其病益劇。予診視之曰。三部脈無寒邪。但肝脈強長而上魚際。服此丸而愈。

柴胡

秦艽

黃芩各半

生地黃一兩酒

赤芍藥一兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服三十丸。烏梅湯下。日三服。

附方

補中益氣湯

四物湯

二方見二十六卷第六論

加味逍遙散

八珍湯

加味歸脾湯

歸脾湯

四方見二十四卷第四論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

六味丸

方見二十四卷第十一論

婦人惡寒方論第五

婦人惡寒。有陰陽二證。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者。脈浮數。宜解表。發於陰者。脈沉細。宜溫裏。凡惡寒不可過覆衣被。及近火熱。若寒熱相搏。令人寒甚。若寒氣入腹。血氣結聚。最難治療。

愚按前症若怠惰嗜臥。洒淅惡寒。乃陽不能伸發。用升陽益胃湯。若勞傷形氣而惡寒。乃無陽以護衛。用補中益氣湯。若飲食傷脾胃而惡寒。乃元氣虛損。用六君子湯。若加煩躁妄言。或欲飲水。仍進前劑。但加薑桂。若體倦煩渴。頭痛自汗。用補中益氣。加五味。麥門。東垣云。晝則發熱惡寒。是陰氣上溢於陽分也。夜中惡寒。是陰血自旺於陰分也。海藏云。六月大熱之氣。反得大寒之症。當捨時

從症。治以薑、桂之類。丹溪云。久病惡寒。乃痰鬱於脾。抑遏陽氣。不得外泄。治當解鬱。

附方

升陽益胃湯 方見三卷第九論

補中益氣湯

六君子湯 二方見二卷第六論

婦人血風煩悶方論第六

婦人血風煩悶。由勞傷氣虛。而風邪乘之。血氣不和。以致肢節熱疼。口乾不臥而煩悶也。當調補元氣爲主。

愚按。前症多屬肝脾血虛發熱。當參照前寒熱方論主治。

赤芍藥散 治煩悶不食。體倦頭眩。身體疼痛等症。

赤芍藥酒炒

白茯苓 各一錢

甘草炒

柴胡 各五分

右薑棗水煎。

婦人血風攻脾不食方論第七

夫脾爲中州。意智之臟也。諸經皆賴其養。與胃爲表裏。胃主司納。脾主腐化。若勞傷真氣。外邪乘之。諸症生焉。

愚按。經云。胃乃脾之剛。脾乃胃之柔。傷胃則脾無所稟受。傷脾則不能爲胃運化。是以脾胃爲之表裏。藉飲食以滋養百脈者也。竊謂前症若飲食所傷。六君子湯勞役所傷。補中益氣湯。若風寒所傷。用人參理中湯。木旺乘土。六君加柴胡。嘔吐腹痛。或小便不實。前湯加木香。胸膈虛痞。或肚腹不利。六君子湯。鬱怒傷損肝脾。歸脾湯。命門火衰。八味丸。仍審諸經錯雜之邪而治之。假如不能食而肌肉削。乃脾胃經本病。右關脈緩而弱。乃脾胃之本脈。若見弦緊。或四肢滿悶。淋瀝便難。轉筋。此肝之脾胃病也。若兼洪大。或肌熱煩熱面赤。此心之脾胃病也。若兼浮澀。或氣短而喘急。咳嗽痰盛。此肺之脾胃病也。若兼沉細。或善恐善欠。此腎之脾胃病也。各當於本經藥中。加兼症之藥。此東垣先生之治法也。

附治驗方案

一婦人停食飽悶。或用人參養胃湯。木香檳榔丸。而泄瀉吐痰。腹中成塊。又與二陳。黃連。厚朴。反加腹脹不食。余以爲脾胃氣虛。不能消磨。用補中益氣。加茯苓。

半夏五十餘劑。脾胃健而諸症痊。

一婦人飲食每用碗許。若稍加。非大便秘。必吞酸噯腐。或用二陳、黃連、枳實。反加內熱作嘔。余曰。此本虛寒中。不信。仍作火治。虛症悉至。月經不止。余用六君加炮薑、木香數劑。諸症漸退。又以補中益氣加炮薑、木香、茯苓、半夏數劑全愈。後因飲食勞倦。兼以怒氣。飲食頓少。元氣頓怯。仍用前藥。更加發熱。脈洪大。按之而虛。兩尺如無。此命門火衰。用補中益氣加薑、桂及八味丸兼服。兩月餘。諸症尋愈。此症若因中氣虛弱。用人參理中湯。或六君子加木香、炮薑。不應。用左金丸。或越鞠丸。虛寒加附子理中湯。無有不愈。

一婦人飲食後。或腹脹。或吞酸。自服枳朮丸。飲食日少。胸膈痞滿。腿內酸痛。畏見風寒。或用養胃湯。腿痛浮腫益甚。月經不行。余以爲鬱結所傷。脾寒濕熱下注。侵晨用四君、芎歸、二陳。午後以前湯送越鞠丸。諸症漸愈。又用歸脾入珍。二湯兼服。兩月餘而經行。

一婦人胸滿少食。或腹脹吞酸。或經候不調。此中氣虛而不能施化也。用補中益氣加砂仁、香附、煨薑而飲食進。更以六君、芎歸、貝母、桔梗而經自調。

一婦人年三十餘。忽不進食。日飲清茶水果。三年餘矣。余謂脾氣鬱結。用歸脾湯。加吳茱萸四劑。遂飲食如常。若人脾腎虛而不飲食。當以四神丸治之。一婦人不進飲食三年矣。日飲淡茶果品之類。肝脾二脈弦浮。按之微而結滯。余謂肝脾氣鬱。用六君。木香。吳茱。下痰積甚多。飲食頓進。形體始瘦。臥床月餘。仍服六君之類而康。

越鞠丸。治鬱傷氣滯。以致胸膈痞悶。或肚腹膨脹。或咽喉不清。或痰氣不爽。或飲食少思。或吞酸噯腐。宜用此藥清之。若人脾胃虛弱。用六君子湯爲主。大凡中氣虛弱。變症百出。難以名狀。但用四君補其脾胃。元氣漸復。諸症自退。若用治病之藥。則誤矣。

香附

蒼朮炒

川芎

梔子炒

神麴炒

山楂各等分

右爲末。用神麴糊丸。菉豆大。每服六七十丸。食遠。白湯送下。

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見第二十卷第六論

八味丸

方見第十四卷第十一論

人參養胃湯

方見七卷六論

二陳湯

左金丸 方見七卷第十七論

人參理中湯

附子理中湯 方見二十六卷第六論

歸脾湯

八珍湯 方見二十四卷第四論

二神丸

四神丸 方見八卷第八論

婦人夢與鬼交方論第八

人稟五行秀氣而生。承五臟神氣而養。若調理失節。血氣虛甚。則鬼邪干其正。隱避而不欲見人。時獨言笑。或時悲泣。是其候也。脈息遲伏。或如鳥啄。或綿綿而來。不知度數。面顏不變。亦其候也。

愚按前症多由七情虧損心血。神無所護而然也。宜用安神定志等藥。則正氣復而神自安。若脈來乍大乍小。乍短乍長。亦爲鬼祟也。宜灸鬼哭穴。以患人兩

並用錢繫繫當合縫處。牛肉半甲。間灼艾炙七壯。若果是邪祟病者。即乞求免。灸云我自去矣。

茯神散 治妄有所見。言語雜亂。時或昏昧痰熱。

茯神 半兩

茯苓

人參

石菖蒲 錢各一

赤小豆 五分

右水煎服。

桃仁丸 治與鬼魅交通。

辰砂另研 檳榔

水銀一錢棗肉一箇研令星盡

麝香 當歸

阿魏各三錢裹煨

沉香各半兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服十九。空心桃仁湯下。

辟瘟丹

虎頭骨二兩

硃砂

雄黃

雌黃

鬼臼

阜茨

蕪荑仁

鬼箭羽

藜蘆各一兩

右爲末。煉蜜丸。彈子大。囊盛一丸。男左女右。繫臂上。及用一丸。當病人戶前燒之。一切邪鬼不敢近。

妙香散 治心氣不足。精神恍惚。夢與鬼交。語言錯亂。先服此以補氣血。鎮心安神。然後以前方治之。方見三卷