

則血塊停滯。熱則新血流崩。至若虛中外感。見三陽
表正之多。以可下也。產後而用桂枝。則血氣耗
散。有食母專消導。熱不可用。芩連寒不可多。桂附寒
憂驚勞格。氣血暴虛。諸症乘虛易襲。如有氣母專耗
若能用充。方用藥。則治產可以無大過矣。夫產後
寸雖有他症。以未治之。此三言者。已盡產之大旨。



總論產症治方

凡病起於血氣之衰。脾胃之虛。而產後之氣血脾胃。虛衰尤甚。是以丹溪朱先生論產。必以大補氣血爲主。雖有他症。以末治之。此三言者。已盡醫產之大旨。若能擴充。立方用藥。則治產可以無大過矣。夫產後憂驚勞倦。氣血暴虛。諸症乘虛易襲。如有氣母專耗散。有食母專消導。熱不可用芩連。寒不可多桂附。寒則血塊停滯。熱則新血流崩。至若虛中外感。見三陽表症之多。似可汗也。在產後而用麻黃。則重竭其陽。

見三陰裏症之多。仍可下也。在產後而用承氣。則重
亡陰血。耳聾脇滿。乃腎虛惡露之停。休用柴胡。讖語
汗出。乃元弱似邪之症。母同胃實。厥由陽氣之衰。雖
分寒熱。非大補不能回陽而起弱。瘥因陰血之虧。毋
論剛柔。非滋榮不能舒筋而活絡。又如乍寒乍熱。發
作有期。症類瘧也。若以瘧治。遷延難愈。神不守舍。言
語無倫。病似邪也。若以邪論。危凶可待。去血多而大
便燥熱。蓯蓉加於生化。非潤腸承氣之能通。患汗多
而小便短澁。六君倍用參芪。必生津助液之可利。加

癩症

參生化頻服救產後之危。長生活命。屢用甦絕穀之
人。癩痢脫肛。多是氣虛下陷。補中益氣之方。口噤拳
挛。乃因血燥類風。加參生化之湯。產戶入風而痛甚。
宜服羌獨養榮方。產門傷冷而不閉。五味倍參生化
湯。怔忡驚悸。生化湯加遠志。似邪恍惚。安神丸助歸
脾。因氣而滿悶虛煩。生化湯加磨木香爲佐。因食而
噯酸惡食。六君子加神麴麥蘖爲良。蘇木稜蓬大能
破血。青皮殼實最消滿脹。一應破血耗氣之劑。汗吐
宣下之策。止可施之於少壯。豈宜用之於弱虛。大抵

新產之後。先問惡露如何。塊痛未除。未可遽加芪朮。
腹中痛止。塊愈。補中益氣無疑。至若陽亡脫汗。氣虛
喘促。頻灌加參生化。是從權也。又如陰亡大熱。血崩
厥暈。速煎生化原方。乃救急也。蓋產後氣血暴虛。欲
欲攻之。又恐元氣有虧。惟行中帶補。化舊生新。始
爲萬全。故生化湯。產後諸症。加減用之。無有不愈。
此雖未盡產症之詳。然未必無小補云。

產後宜戒

一戒怒氣。

二戒勉強起居。

三戒七日內沐浴。

梳頭。

四戒忌食厚味暈腥。

產後禁藥

- 一產後氣不順。禁服枳實厚朴耗氣等藥。
- 二戒產後傷食。禁服大黃三稜蓬朮。
- 三戒產後身熱。禁服芩連梔枳。
- 四戒七日內服地黃芍藥。
- 五戒有血塊。服牛膝蓬稜蘇木。
- 六戒大便不通。禁服大黃芒硝。
- 七戒服濟坤丹。大損氣血。
- 八戒產前服瘦胎藥。大損氣血。

產後忌物

一菓忌梨藕柑柿西瓜。

二食忌冷粉菜豆冷粥麪食蕎麥。

三肉忌鷺犬及猪牛之首。

四菜忌莧菜生菜白菜菠菜。

五忌砂糖酒損新血。

六忌山查湯損新血。

七忌胡椒艾酒行血致崩。

八忌生姜酒發汗行血。

九忌濃茶性寒停塊

產後生化血論

產後氣血暴虛。欲補之則恐惡露停滯。欲攻之又恐元氣有虧。惟行中帶補化舊生新方始萬全。世之治產者。往往用四物湯。竊謂地黃性滯膩血。芍藥酸寒無補。恐非治新產之良劑也。如衣被不暖。或感風寒。食冷物。胎中宿血凝停作痛。或半月不散。或如腫毒高起。或身熱減食倦甚。用生化湯加蓬索丹桂之類。攻補並施。其塊自消。

一論血塊

夫產後血塊。是孕成餘血之所積也。醫家所當先論。毋視爲輕症而忽之。因產婦送兒。又送胞衣。勞倦無力。或調護之際。腹欠溫暖。故至血塊作痛。日久方散。或痛之甚。甚至有氣不運而昏迷暈厥者。治法只頻服生化湯。以助血行血。外用衣服烘熱以煖腹。卽時塊消痛止。神清氣爽。此爲治塊痛之良法也。切不可妄謂惡露搶心。輕用蘇木三稜蓬朮散血之劑。以重虛產婦也。俗用山查砂糖消塊。姜椒艾酒定痛。亦不可

多服恐過傷大熱易致崩淋昏暈等症。而新血未免
損失多矣。慎之慎之。概觀時醫其治塊痛有用紅花
生地以行之。蘇木牛膝以攻之。其治氣脹有用烏藥
香附以順之。枳殼厚朴以舒之。甚有用青皮枳實蘇
子以下氣定喘。芩連梔栢以退熱除煩。至於血枯大
便燥結。反用承氣湯下之而愈結。汗多小便短澁。反
用五苓散通之而愈秘。古之所謂實實虛虛者。此類
是也。執此治產。非徒無益而反害之。可不戒哉。
古方消塊。或益母丸。或鹿角灰。或元胡索散。或獨行

散 就用生化湯送下一錢服一方見效不須易方

加味生化湯○治血塊日久不消

川芎 一錢

當歸 二錢

干姜

四分

炙甘

四分

肉桂 六分

元胡

六分

三稜

六分

蓬朮

六分

桃仁 十粒

水煎服

交加地黃丸○治血塊服湯藥消半宜服此丸凡半

產塊痛經水不調並可服之

淮生地

四兩

川芎

七錢

當歸

七錢

老薑

四兩

人參

七錢

木香

二錢

芍藥 五錢

沒藥 五錢

香附 一兩
醋炙

先將地黃汁浸薑渣薑汁浸地黃渣晒焙燥用
諸藥爲末醋糊爲丸如菜豆大空心溫酒送四
五十丸

二論血暈

凡分娩之後眼見黑花頭眩昏暈不知人事謂之血
暈其因有三一因勞倦甚而氣竭神昏二因血大脫
而氣欲絕三因痰火乘虛上而神不清患此三者
皆魂不隨神往來而幾暈幾息也急服生化湯以行

塊定痛。化舊生新。卽時血遂生而氣轉。神漸清而心有主。頻服二三帖完。其昏亂氣血卽定。乃芎歸性有化生之功也。若偏信古方認暈症爲惡血搶心。而輕用蘇木等破血之劑。認爲痰火而遽用牡丹奪命等消降之方。誤之甚矣。叮嚀臨盆之際。預煎生化湯服一二帖。加參一錢尤妙。更燒秤錘。淬熱酒。候兒下地。速飲兩三盞。又婦房中宜行醋韭冲鼻之法。燒漆之方。決無暈症。又兒生下。舉家不可喜。子慢母產母不可顧。子忘倦。不可產訖卽臥。不可忿怒氣加。皆

要血逆致暈至囑至囑

加味生化湯。治產後三等暈症

川芎 三錢 當歸 六錢 炮薑 四分 甘草 五分

荆穗 一錢 炒黑桃仁 十粒 棗二枚 水煎服

加減法。如勞倦甚而暈。及血崩氣脫而暈。並宜速灌兩帖。如形色脫。或汗多而脫。皆宜急服一帖。後卽加人參三四錢。肉桂四分。決不可疑參爲補而緩服。如痰火乘虛。汎上而暈者。方內加橘紅五分。虛甚加人參二三錢。肥人多痰加竹瀝一酒鐘。薑

汁少許

從權救急加味生化湯。治產後形色脫暈。或汗多

脫暈。

川芎

二錢

當歸

四錢

炮薑

四分

荆穗

一錢
炒黑

炙甘

四分

人參

三錢

桃仁

十粒

水煎服

如血塊痛甚而暈。加肉桂七分。口渴加麥冬一錢。

五味子十粒。汗多加麻黃根一錢。如塊不痛。加黃

芪一錢。以止汗。或傷飯麪食。加炒神麪八分。炒麥

芽五分。傷肉食。加山查砂仁各五分。

附血暈治案 一姪婦產暈口噤形已脫舉家視

死余速令撬口灌藥不嚥速插鵝毛入喉中漸引藥下腹至一鐘氣轉又灌一鐘知人事兩時辰內服生化湯四帖完其人神清方進粥食服至十帖而安由此觀之產婦因崩因勞而暈脫必當速灌前藥用火暖腹不可棄而不救若在冬天產婦身欠溫暖亦有大害是以不肖重複囑告

古方 清魂散治產暈甚妙 一法加眞珠三四分以安神定志其暈立愈奇哉 再加龍眼肉煎

歌曰清魂散用澤蘭芍荆穗人參國老同
產後血虛昏暈病酒煎一服見神功

又方治正產半產血暈屢驗

淮熟棗仁麥冬歸身人參各一錢

龍眼肉七個如血痛加干姜灰一錢水煎服

三論產後厥症

凡產用力過多。勞倦傷脾。孤臟不能流注於四旁。故足逆冷而厥氣上行也。經云陽氣衰於下。則爲寒厥是也。非急方不能攝氣以歸原。非大補不能回陽而復神。宜用加參生化湯。倍參連服兩帖。斯氣血旺而