

卷六十四

外科

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行



終

加批詳評景岳全書

卷六十四

春集外科鈴古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評

古吳江家楨忍庵訂

外科

仙方活命飲一 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也

穿山甲蛤粉炒黃白芷 防風 天花粉 赤芍藥 歸尾 乳香 沒藥 貝母 皂刺 甘

草各二錢金銀花 陳皮各三錢 酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散二 治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉即去

新肉即生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主

氣血俱虛者十全大補湯為主并忌寒涼消毒之劑

人參隨症增減黃耆鹽水炒當歸 川芎 芍藥炒白朮炒茯苓各一錢金銀花 白芷各七甘草

連翹各五錢 右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡

秘方托裏散三 治一切瘡毒終始常服不致內陷

瓜蒌大者一個當歸酒洗黃耆鹽水炒白芍藥 甘草各一兩半熟地 天花粉 金銀花 皂刺各

一兩 右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮

至藥香取出。分服。直至瘡愈。○立齋曰。此方藥品平易。消毒之功甚大。且不動臟腑。不傷血氣。不問陰陽腫潰。屢用屢效。真仙方也。常治發背。腦疽。勢盛者。更用隔蒜灸之。若脈沉實。大小便秘者。先用疎通。而後用此。功甚捷。若火毒已退。不作膿。或不潰者。更宜托裏。潰而不斂。及膿清者。用峻補。

神功托裏散

四

一名金銀花散。○治癰疽發背。腸癰乳癰。及一切腫毒。或焮痛。憎寒

壯熱。

金銀花

黃耆

當歸

甘草

等分

右用酒水各一鍾。煎至一鍾。分病上下。食前食後服。

之少頃再服一劑。浮數患處。不問老少虛實皆可服。若為未酒調服尤妙。

參耆托裏散

五

治瘡瘍氣血俱虛。不能起發。或腐潰不能收斂。及惡寒熱者。

人參

氣虛者用之

黃耆

炒

白朮

炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓 陳皮各一

水煎服。

參耆內托散

六

方在痘疹七。

治癰疽膿毒不化。及潰後作痛。

托裏養營湯

七

治瘰癧流注。及一切癰疽不足之症。不作膿。或不潰。或潰後發熱。或惡寒。

肌肉消瘦。飲食不思。睡卧不寧。盜汗不止。

人參

黃耆

灸當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

錢熱地

二錢

五味子

炒研

分

水二鍾

薑三片

棗一枚

煎七分

食遠服。

托裏黃耆湯八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃耆蜜炒六錢

甘草錢各一

水二鍾煎八分頻服之。○加入參一錢亦可。○若氣血俱

虛膿血大泄而作渴。或兼發熱者。宜用托裏養營湯。

內補黃耆湯九

治癰毒內虛不起化。及潰後諸虛迭見。

黃耆受

麥冬各一兩

熟地

茯苓

甘草受

芍藥各七分

當歸

川芎

遠志

官桂

各五分

右每服一兩。薑棗水煎服。

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛。或補熱內熱。寒熱往來。或婦人諸瘡。經候不調。小便頻數。

大便不實等症。但瘡瘍氣血虛而發熱者。皆宜服之。久服亦收斂瘡口。

人參

黃耆

當歸

熟地

川芎

芍藥各一錢

柴胡

甘草各五分

右水煎服

托裏健中湯十一

治瘡瘍元氣素虛。或因涼藥傷胃。飲食少思。或作嘔瀉等症。

人參

白朮

茯苓各二錢

半夏

炮薑各一錢

黃耆半錢

炙甘草五分

肉桂三分

右薑棗水

煎服。

托裏溫中湯十二

治瘡瘍膿潰。元氣虛寒。或因起伐。胃氣脫陷。腸鳴腹痛。大便溏泄。神思昏

潰。此寒變內陷。緩則不治。

附子

炮去皮臍二錢

乾薑錢三

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服。

托裏益中湯 十三

治中氣虛弱。飲食少思。或瘡不消散。或潰而不斂。

人參 白朮

茯苓 炮薑

陳皮 半夏

木香 炙甘草

各五錢

右薑棗水煎溫服

托裏溫經湯 十四

治瘡瘍寒熱。皮毛鬱遏。經絡不得伸越。熱伏營中。聚結赤腫作痛。惡寒發

熱。或痛引肢體。若頭面腫痛。甚。仍宜砭之。

麻黃 升麻

防風 乾葛

白芷 人參

當歸 芍藥

甘草 蒼朮

各一錢

右水二

鍾煎一鍾服。卧煖處得汗乃散。或加柴胡。

托裏益黃湯 十五

治脾土虛寒。水反侮土。以致飲食少思。或嘔吐泄瀉等症。

人參 白朮

茯苓 陳皮

半夏 炮薑

丁香 炙甘草

各五錢

右薑棗水煎溫服

托裏清中湯 十六

治脾胃虛弱。痰氣不清。飲食少思等症。

人參 白朮

茯苓 陳皮

各一錢 半夏 八分

桔梗 七分

甘草 五分

右薑棗水煎服

托裏益清湯 十七

治肝木侮脾。脾土虛弱。以致飲食少思。或胸膈不利等症。

人參 白朮

半夏 茯苓

陳皮 芍藥

柴胡 甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏營衛湯 十八

治瘡瘍外無焮腫。內便調和。乃邪在經絡也。宜用此藥。

人參 黃耆

當歸 甘草

炙紅花 柴胡

連翹 蒼朮

米泔炒羌活

防風 黃芩

各一錢

桂枝 七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯 十九

治六鬱所傷。脾胃虛弱。飲食少思等症。

人參 白朮各三錢 陳皮 半夏各一錢 山梔 川芎 香附 蒼朮各七錢 炙甘草五錢 右薑棗水煎服。

定痛托裏散二十錢 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也。

粟穀去蒂炒 當歸酒拌 白芍藥炒 川芎各一錢半 乳香 沒藥 肉桂各一錢 右薑棗水煎服。

內托復煎散二錢 治瘡瘍焮腫在外。其脈多浮。邪勝必侵於內。宜用此托之。

人參 白朮炒 當歸 黃耆炒 芍藥炒 茯苓 甘草炙 地骨皮 肉桂 防己酒炒 黃芩

各一錢 防風錢二 右先以蒼朮一升。水五升煎去朮入藥。再煎至二升終日飲之。

內托羌活湯二錢 治臂癱堅硬腫痛。兩尺脈緊無力。

羌活 黃柏錢一 防風 當歸尾 藁本 肉桂各一錢 連翹 蒼朮米泔浸炒 陳皮各五錢 黃耆鹽水

炒一錢半 右水酒各一鍾。煎八分。食前服。

內寒散二三錢 治陰虛陽和湊襲患腫。或潰而不散。或風寒襲於患處。血氣不能運行。久不能

愈。遂成漏證。

附子童便浸 肉桂皮去 赤小豆 炙甘草 黃耆鹽水炒 當歸酒拌 茯苓 白芷 桔梗炒 川芎 人參 遠志去骨

厚朴製各一兩 防風錢四 右為末。每服二錢。空心溫酒下。或酒糊丸。鹽湯下。或煉蜜為丸亦可。

沖和湯二四錢 治瘡屬半陰半陽。似潰非潰。似腫非腫。此因元氣虛弱。失於補托所致。

人參 陳皮各二錢 黃耆 白朮 當歸 白芷各一錢半 茯苓 川芎 皂角刺炒 乳香 沒藥

金銀花 甘草節錢一 右水酒各半。煎服。

神效酒煎散 二五 治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參 沒藥 另研當歸尾各一錢 甘草 三錢 括萆 一個半生半炒 右以酒三碗煎二碗分四服。或以為

末酒糊丸桐子大每服五十九用酒下善消毒活血

人參黃耆湯 二六 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參 白朮 蒼朮 麥冬 陳皮 當歸 升麻 各五分 黃耆 一錢 黃柏 炒四分 右水煎服

黃耆人參湯 二七 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃耆 鹽水炒二錢 人參 白朮 蒼朮 酒洗 當歸 酒洗 麥門冬 五味子 炒各一錢 甘草 炙 升麻

神麴 炒 陳皮 各五分 黃柏 酒炒三分 水二鍾薑三片棗二枚煎服

黃耆建中湯 二八 內托癰疽諸毒

黃耆 蜜炙 肉桂 各三兩 甘草 炙二兩 白芍藥 六兩 右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 二九 治肺疽脾氣虧損久咳吐膿或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否

則不治

人參 白朮 各二錢 黃耆 半錢 茯苓 當歸 陳皮 各一錢 麥冬 七分 北五味 四分 桔梗 六分 炙

甘草 五分 右薑棗水煎服

參耆補肺湯 三十 治肺證咳嗽短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴

小便短澀

人參 黃耆 白朮 當歸 陳皮 茯苓 各一錢 山藥 山茱萸 各二錢 五味子 炙甘草 各五錢

熟地黃 一錢 麥門冬 牡丹皮 各八分 右薑棗水煎服

益氣養營湯 三一 治懷抱抑鬱。或氣血損傷。四肢頸項等處患腫。不問軟硬赤白腫痛。或日

晡發熱。或潰而不斂。

人參 黃耆 炒鹽水 當歸 川芎 熟地 芍藥 炒貝母 香附 陳皮 茯苓 各一錢 白朮 二錢

柴胡 六分 甘草 桔梗 各五分 右薑水煎服。○口乾。加五味子。麥門冬。往來寒熱。加軟柴胡。地

骨皮。膿清。加人參。黃耆。膿多。加川芎。當歸。膿不止。加人參。黃耆。當歸。肌肉遲生。加白欬。官桂。

補陰八珍湯 三二 治瘰癧等瘡。足三陰虛者。

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 熟地 芍藥 黃柏 炒酒 知母 炒酒 各七分 右水煎服

參朮薑附湯 三三 治瘡瘍真陽虧損。或誤行汗下。或膿血出多。失於補托。以致上氣喘急。

自汗盜汗。氣短頭暈。泄瀉。

人參 附子 各一兩 乾薑 泡 白朮 各五錢 右作二劑。水煎服。

附子理中湯 三四 治瘡瘍脾胃虛寒。或誤用攻伐。手足厥冷。飲食不入。或腸鳴腹痛。嘔逆吐瀉。

附子 人參 白茯苓 白芍藥 各三錢 白朮 四錢 右水煎服。

六物附子湯 三五 治四氣流注於足太陰經。骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。或手足浮腫。

附子 製防己 桂枝 各四錢 炙甘草 二錢 白朮 茯苓 各三錢 右作二劑。水一鍾半。薑三片。煎一

鍾食遠服

附子八物湯 三六 治瘡瘍陽氣脫陷。嘔吐畏寒。泄瀉厥逆。

附子 炮 乾薑 炮 芍藥 炒 人參 炙甘草 茯苓 肉桂 各一錢 白朮 二錢 右水煎食遠溫服。

四物湯 三七 治脾腎虛寒。瘡屬純陰。或藥損元氣。不腫痛。不腐潰。或腹痛泄瀉。嘔吐厥逆。及

陽氣脫陷等症。

人參 白朮 黃耆 各三錢 乾薑 炮 附子 炮 甘草 陳皮 當歸 各二錢 柴胡 升麻 各五分 右

水煎服。如不應。倍加薑附。

薛氏加減八味丸 三八 治瘡瘍痊後。及將痊口乾渴甚。或舌上生黃。或未患先渴。此皆腎水枯

渴。不能上潤。以致心火上炎。水火不能相濟。故煩躁作渴。小便頻數。或白濁陰痿。飲食不多。

肌膚漸消。或腿腫脚先瘦。服此以降心火。滋腎水。則諸症頓止。及治口舌生瘡不絕。

熟地 八兩酒 山茱萸 酒浸 山藥 各四兩 澤瀉 蒸焙 白茯苓 牡丹皮 各三兩 桂心 一兩 北五味 兩

半炒 右為細末。入二膏。加煉蜜少許。丸桐子大。每服六七十丸。五更初言語前。或空心用鹽

湯送下。此即陳氏加減八味丸也。○方在補陣一二三。

加味地黃丸 三九 治肝腎陰虛瘡毒。或耳內瘡痛出水。或眼昏痰氣喘咳。或作渴發熱。小便

赤澀等症。

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各為末 右將地黃

搗碎。酒拌濕蒸爛。杵膏入諸藥和勻。加煉蜜為丸。桐子大。每服百丸。空心白湯送下。如不應

用加減八味丸。

當歸川芎散 四十 治手足少陽經血虛瘡證。或風熱耳內癢痛。生瘡出水。或頭目不清。寒熱

少食。或婦女經水不調。胸膈不利。脇腹痞痛。

當歸 川芎

柴胡

白朮

芍藥

山梔

炒一錢

牡丹皮

茯苓

各八分

蔓荊子

甘草

各五

右水煎服。

加味敗毒散 四一

治足二陽經熱毒流於腳根。焮赤腫痛。寒熱如瘧。自汗短氣。大小便不利。

或無汗惡寒。表裡和實者宜之。

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

大黃

蒼朮

錢各一 水二鍾。薑三片。煎服。

九味羌活湯 四二

方在散陣四四。

治瘡瘍風熱鬱遏。焮腫作痛。或遍身作痛。或拘急不利。

及頭痛惡寒。脊強。脈浮緊。

加味羌活湯 四三

即前湯加金銀花。連翹。用解瘡毒。

白芷胃風湯 四四

治手足陽明經氣虛風熱。面目麻木。或牙關緊急。眼目睜動。

白芷

升麻

各二錢五

葛根

蒼朮

米泔炒

炙甘草

當歸

各一錢半

草豆蔻

黃柏

炒

柴胡

羌活

麻黃

去節各四分

蔓荊子

僵蠶

各三分

右水煎服。

葛根牛蒡湯四五 治時毒腫痛而便利調和者

葛根 管仲 甘草 豆豉 牛蒡子半炒半生 各二錢 右水煎服

犀角地黄湯四六 治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角鎊為末 生地 牡丹皮 芍藥各一錢半 黃芩炒 升麻各一錢 右水煎熟入犀角末服

犀角升麻湯四七 治時毒或風熱頭面腫痛或咽喉不利或醫疽疔腮等症

犀角鎊 升麻 防風 羌活各錢半 白芷 白附子 黃芩各一錢 甘草六分 右水煎熟入犀角末服

玄參升麻湯四八 治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連頰兩邊腫痛或咽痛發斑并治之

玄參 升麻 赤芍藥 犀角鎊末 桔梗炒 管仲 黃芩各一錢 甘草五分 水二鍾煎八分

入犀角末食後服

升麻黃連湯四九 治胃經熱毒腮腫作或發寒熱

升麻 川芎 當歸各一錢半 連翹 黃連 牛蒡子 白芷各一錢 右水煎服○若腫連太陽

加羌活連耳後加山梔柴胡

傳秘連翹湯五十 治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹 升麻 朴硝各一兩 玄參 芍藥 白薇 防風 射干各三錢 大黃一兩二錢 甘草五錢 杏仁

八十個去皮共同麴炒黃另研

五香連翹湯五一 治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行者

乳香 木香 沉香 丁香 香附 黃耆 射干 連翹 升麻 木通 獨活 桑寄

生甘草各一錢 右水煎服。

復元通氣散五二 治乳癰便毒腫痛。及一切氣滯腫毒。或打撲損傷。閃跌作痛。及疝氣尤效。

木香 舶上茴香炒青皮 陳皮 白芷 甘草 貝母去心 川山甲炙 漏蘆等分 一方。

有玄胡索 白牽牛炒用。無白芷 漏蘆。右為末。每服二三錢。溫酒調下。

當歸散五三 通經絡。行血滯。

當歸 川山甲反炒 蒲黃炒各半兩 辰砂一錢 麝香少許 右為末。每服三錢。熱酒調下。如不飲

酒。薄荷醋湯亦可。

方脈流氣飲五四 治瘰癧流注。鬱結腫塊。或走注疼痛。或心胸痞悶。咽塞不利。脇腹膨脹。嘔

吐不食。上氣喘急。咳嗽痰盛。面目四肢浮腫。大小便秘。

當歸 川芎 芍藥炒 茯苓 黃耆炙 炙甘草 紫蘇 青皮 烏藥 半夏製 桔梗炒 枳

實炒 防風 陳皮各一錢 木香 大腹皮 枳殼炒 檳榔各五分 水二鍾。薑三片。棗一枚。

煎八分。食遠服。

蒼科流氣飲五五 治流注。及一切恚怒氣結腫痛。或胸膈痞悶。或風寒濕毒。搏於經絡。致成

腫塊。肉色不變。或漫腫木悶無頭。

人參 當歸酒拌 黃耆鹽水炒 芍藥 官桂 厚朴製 甘草 防風 紫蘇 枳殼 烏藥

桔梗炒各七分 檳榔 木香 川芎 白芷各五分 右水煎服

陳氏獨聖散五十六 凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子薑汁侵一宿焙乾研末 右無時以白湯調服二錢漬以局方小烏沉湯為尤妙

乳香定痛散五十九 治瘡毒損傷血凝氣滯墮腫拘攣筋骨疼痛

乳香 沒藥各另研 羌活 五靈脂 獨活各三錢 川芎 當歸 真綠豆粉 肉桂 白芷

白膠香各半兩 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下手足損痛不能

舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散五十八 治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜先服人參敗毒散一二劑方可

服此藥如無前證即服此藥二三劑或腫不消宜服托裏散

金銀花 青皮 天花粉 柴胡 殭蠶炒 貝母 當歸酒拌 白芷各二錢 水二鍾煎一鍾

食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心服

清熱消毒散五十九 治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸 甘草各一錢 川芎 芍藥 生地各一錢半 金銀花二錢 右水煎服

東垣黃連消毒散六十 治腦疽背疽喉腫疼痛或麻木

黃連炒 羌活各一分 黃芩 黃柏 桔梗 藁本 防己各五分 歸尾 連翹 防風 獨活

知母炒生地各四分 人參 甘草各三錢 黃耆 蘇木 陳皮 澤瀉各二分 右水煎服

連翹消毒散六一 治癰疽濕熱諸症。○亦名清涼飲。亦即局方涼膈散。

連翹二兩 梔子 大黃 薄荷 黃芩各五錢 甘草半兩 朴硝二錢 右每服一兩。水煎溫服。

加味解毒湯大二 治癰疽實熱大痛不止。

黃耆鹽水炒 黃連炒 黃芩炒 黃柏炒 連翹 當歸酒拌各七分 甘草炙 白芍藥 梔子炒各錢 水二

鍾煎服痛即止。

解毒防風湯六三 治斑疹或癰或痛。

防風錢黃耆 芍藥 地骨皮 枳殼炒 荊芥各二錢 水煎徐徐服。

陳氏解毒防風湯六四 方在痘疹五六。治痘疹毒氣熾盛。

散腫潰堅湯六五 治癰瘰堅硬氣血無虧宜用之。

柴胡 黃芩各四錢 白芍藥炒 升麻 連翹 黃柏酒炒 蓬朮 三稜酒炒 乾葛 歸尾各三錢

知母酒炒 龍胆草酒炒 天花粉 桔梗 昆布各五錢 炙甘草二分 右水煎服。

瓜窠托裏散六六 治瘡瘍毒盛者。未成則易消。已成則易潰。既潰則生肌。

黃瓜窠一個 枳殼一個 忍冬藤 乳香各一錢 蘇木五錢 沒藥三錢 甘草二錢 右用酒三碗。煎二碗。空心日午臨

睡分三服。○或以此為末。酒糊丸。彈子大。硃砂為衣。細嚼。用當歸酒送下。治打撲損傷尤妙。

萬金散六七 一名內托散。○治癰疽已潰未潰者。有消毒破血之功。

括萆一個沒藥一錢大甘草節二錢右用酒二碗煎一碗去滓後入沒藥服

製甘草湯六八

治懸癰不拘腫潰亦治癰疽用大甘草一兩切三寸長用澗水一碗浸透

以漫火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却挫細用無灰酒二鍾煎七分空心服嘗有人患此已破服兩劑瘡即合○一國老膏方用大甘草二斤以河水浸取漿汁去滓用銀石器熬成膏磁罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一方治癰疽用生甘草為末酒調服二錢連進數服自消

梅花飲子六九

癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎 乾葛

天花粉 黃耆 烏梅 甘草 蘇木各一兩忍冬藤四兩

右作四劑水煎服

牛膠散七十

治癰疽便毒不內攻不傳惡症有益無損

牛皮膠者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白湯

明膠飲子七一

治一切癰疽腐毒

明廣膠蛤粉炒珠

粉甘草各一兩橘紅五錢

右作三劑水煎服

護心散七二

解金石砒硫發疽之毒

綠豆末一兩

明乳香研細

右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散七三

一名金花散

解毒清心流行氣血散滯清火凡焮腫熱痛飲食如

常者大宜用之

綠豆四兩研末 硃砂另研 人參 甘草 白茯苓各三錢 朴硝另研 白豆蔻各五錢 麝香另研 雄黃各一錢

冰片五分 右為末。每服一二錢。蜜湯調下。

蠟礬丸七四 一名黃礬丸。○治金石發疽一切癰疽。托裏止疼。痛護藏府。神妙。不問老少。皆可服之。

黃蠟一兩黃色佳者。溶開。離火入礬末。一方止用七錢。 白礬一兩。明亮淨者。研末。 右二味和勻。衆手急丸。桐子大。每服二三

十丸。漸加至四五十丸。熱水或鹽湯送下。日進二三服。至三四兩之上。愈見其功矣。○如

服金石發疽。別用白礬末一兩。作三五服。酒溫下。尤效。○有人遍身生瘡。狀如蛇頭。名曰蛇

頭瘡。凡宜用之。○治蛇蝎毒蟲咬傷。溶化熱塗傷處。痛止毒出。仍服兩許。○此方不惟止痛

生肌而已。其護膜止瀉。消毒化膿。及內癰排膿。托裏之功甚大。

千金化毒丸七五 治諸惡毒。用白礬三錢。糊丸。以葱頭七莖煎湯送下。則腫痛俱退。再用

仙方活命飲二劑。以去其餘毒。此本方原用礬末。以葱湯調服。因湯難服。故易為丸。○一方

士治瘡疽。不問腫潰。先用此藥二三服。後用消毒藥甚效。常治芻蕘之人。用此即退。不用托

裏藥亦愈。若金石毒藥發疽者。尤效。蓋礬能解金石之毒也。○一方。用礬末五錢。硃砂五分。

熟酒下。亦效。此藥托裏固內。止瀉解毒。排膿不動藏府。不傷氣血。有益無損。其藥易得。其功

甚大。偏僻之處。不可不知此方。或毒蟲所傷。溶化熱塗患處。更以熱酒調末服。皆效。

五福化毒丹七六 治咽喉牙口瘡。毒腫痛。並小兒一切熱毒瘡癰。驚惕煩躁。口舌生瘡。夜卧

不寧等症

玄參 桔梗各二兩半 茯苓三兩半 人參 牙硝 青黛各一兩半 麝香少許 金箔二十片 右為

末。煉蜜丸。芡實大。每服一丸。薄荷湯化下。○若豆毒上攻。口齒生瘡。以生地黄汁化服。及用雞翎掃敷患處。

奪命丹七七 治疔瘡發背等症。或麻木。或嘔吐。重者昏憤。此藥服之。不起者即起。不痛者即痛。

痛甚者即止。昏憤者即甦。嘔吐者即解。未成者即消。已成者即潰。有奪命之功。乃惡症中之至寶也。

蟾酥酒化 輕粉 麝香各五分 枯礬 寒水石煨 銅綠 乳香 沒藥各一錢 硃砂三錢 蝸牛十二

個另研 無亦可 右為末。用蝸牛或酒糊搗丸。綠豆大。每服二三丸。溫酒葱湯下。或用葱白三四寸。

病者自嚼爛。吐於手心。包藥在內。熱酒和湯送下。如人行五七里。汗出為效。重者再服一二

丸。或外用一丸入瘡孔內。以膏藥貼之。

飛龍奪命丹七八 治一切疔毒瘡毒。出汗則愈。神效。

乾蟾酥二錢 沒藥 硼砂 寒水石煨 雄黃各三錢 乳香 硃砂 血竭嚼成餅 枯礬各一錢 輕

粉 冰片各五分 蜈蚣一條去頭 蝸牛四十九個研為膏或無亦可 右各研為細末。取蝸牛。蟾酥。研勻。入

諸末。熟杵丸。綠豆大。硃砂為衣。每服四五丸。嚼葱白一口。吐在手心。將藥包葱內。用溫酒吞

下。須臾汗出。或少吐瀉。毒即解。○立齋曰。前回生丹。乃慄悍攻毒之劑也。蓋無經不至。無氣

不動者。後奪命丹尚緩。若食一切禽畜毒物。及瘡脈浮緊細數。毒蓄在內。並惡毒證。凡宜汗

吐者。當用前丹有神效。若老弱之人。或瘡毒稍輕者。宜用後丹。或更以隔蒜灸之。為良。