

幼
幼
集
成
卷二

汪
侶
樵

鼎錄幼幼集成卷之二

羅浮陳復正飛霞氏

輯訂

廬陵劉

勳案孟氏

校正

潞陽周宗願盧中氏

泰定

○胎病論

見之初生有病亦惟胎弱胎毒二者而已矣胎弱者稟受於
氣之不足也子於父母一體而分而稟受不可不察如稟
肺氣爲皮毛肺氣不足則皮薄怯寒毛髮不生稟心氣爲
血脉心氣不足則血不華色面無光彩受脾氣爲肉脾氣
不足則肌肉不生手足如削受肝氣爲筋肝氣不足則筋

不束骨機關不和受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強母弱生女必羸父弱母強生兒必弱故小兒有頭破顙解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不齊髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足之故也

胎毒者卽父母命門相火之毒也命門者男子以藏精女子以繫胞道家謂之下丹田也夫二五之精妙合而凝純粹之精鎔液而成胎淫佚之火蓄之則爲胎毒矣蓋人生而靜天之性也感物而動人之欲也成胎之後其母之關係尤繫片思慮火起於心毒怒火生於肝悲哀火鬱於肺火

胎火積於脾。淫縱火發於腎。五欲之火。隱於母胞。遂結爲胎毒。凡胎毒之發。如蟲疥。流丹。濕瘡。癰。瘰。結核。重舌。木舌。我口口瘡。與大胎熱。胎寒。胎搐。胎黃之類是也。昔大士曰。之。臍風百日之痰。嗽半歲之真搐。一週之流丹。此又毒之至酷至烈而不可解者也。

胎寒者。母娠時患熱病。多服寒涼之藥。又或過食生冷。令兒受之。生後昏昏多睡。間或吮乳。瀉白。此內因也。或百日之內。忽病戰慄。口冷。手足蹇曲。不伸。腹痛啼叫不止。此生後受寒得之。治宜溫散。指迷七氣湯。助胃膏爲佳。

胎熱者。母娠時喜食辛熱炙搏之物。或患熱病。失於清解。使

兒受之生後目閉而赤眼胞浮腫腎身呢呢作聲或啼呀
驚煩遍身壯熱小便黃澀此胎熱也若不早治則丹瘤瘡
癰由此而至宜集成洗灌丹徐服解之以平爲度

胎搐者母娠時會因驚恐氣傳於子生後頻頻作搐其後身
熱百青手足搐掣牙關緊閉腰直身僵睛邪目閉多啼不
乳此乃胎癰不治之證如因身有熱而作者必先啼叫雖
曰胎病由外因也宜天麻丸後以六味地黃湯滋其化源
久服自愈

盛腸氣者幼科稱內吊者是也皆因胎氣鬱積壅結榮衛五
臟六腑無一舒暢其氣不能升降築隘腸胃之間抵心而

痛其聲轉轉如貓

吐惡乾啼口開手足皆冷宜疎散

調中散及木香丸

臍突者小兒多啼所致也臍之下爲氣海啼哭不止則觸動氣海氣動於中則臍突於外其狀突出光浮如吹起者捏之則微有聲用亂髮燒灰枯礬等分爲細末敷突臍上以膏藥貼之自消

不乳者小兒生下一

二日間忽然不乳當詢問之勿以不乳

作臍風治蓋臍風有多啼搥口之證此則無之但不乳耳有此乳乳之又吐者或因拭口不淨惡穢入腹也宜用檳榔木香甘草煎湯與服如啼哭不乳者腹痛也亦胎寒之

證宜木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服如無已上諸證
無故不乳宜問其母之乳汁多少乳多者傷乳也宜少節
之不久自思乳矣乳少者必有他證細心察之

胎黃者兒生下面目渾身皆黃如金色或目閉身上壯熱大
便不通小便如梔子汁皮膚生瘡不思乳食啼哭不止此
胎中受濕熱也宜茵陳地黃湯母子同服以黃退爲度

胎肥者兒生下遍身肌厚肉色通紅面赤亦紅而黑睛多時
時生痰自滿月以後漸漸肌瘦五心熱而大便難白睛粉
紅色此名胎肥是亦在胎時母食甘肥湯熱太過流入胞
中以致形質虛肥血分壅熱也加減大連翹飲外以浴體

法浴之

胎怯者生下面無精光肌肉瘦薄大便白而身無血色目無精彩時時哽氣多噓者此卽胎怯也非育於父母之暮年卽生於產多之孕婦成胎之際元精旣亡澆漓受胎之後氣血復難長養以致生來怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散助之

○又方

指迷七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出入無刻不與天

道陰陽之氣通故六淫外襲則感而致病翕受之理也內
氣閉塞則天道不通升者不升降者不降寒熱由此而生
也是方陳利臟腑神化無窮最宜領會

廣陳皮 杭青皮 藿香葉 芽枯梗 蓬莪朮

香附米 法半夏 上肉桂 公丁香 益智仁

老生薑 大紅棗 炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏

治胎寒內釣胃氣虛弱胸脇脹滿嘔乳便青

白豆蔻 肉豆蔻

麝包煨
去油

官揀參

廣木香

各五

錢

公丁香三錢

藿香葉

雲茯苓

漂白朮

上炒

真青桂

西砂仁

炙

甘草

各一兩

廣陳皮

二錢

兩

洋沉香

二錢

懷山藥

五兩

爲末蜜丸芡實大每一丸炒米湯化服

集成沉瀝丹

音亢械乳斗
所降之甘露也

按半

治小兒一切胎毒胎熱

胎黃面赤目閉

口口瘡重舌

舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉結麻疹斑瘰

風痧癰流丹癰疹痰食風熱疔腮面腫十種火丹諸般風

搐並皆神效

此方古書未載得之異授微似古之神芎丸近有能者妙

出化裁而增損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之
至治蓋凡臟氣流通者必不鬱滯或受毒於妊前或感邪
於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證方內所用黃芩清
下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新上焦之
熱黃栢清之功活血除煩之力能導三焦鬱火從魄門而
出猶慮苦寒凝膩復加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之
佐使川芎薄荷引頭面風熱從高而下趨連翹解毒除煩
赤芍調榮活血牽牛利水走氣分而舒鬱滑石清潤抑陽
火而扶陰又能引邪熱從小便而出用治以前有餘諸證
應如桴鼓予生平最慎攻伐惟此方用之最久功效莫能

殫述真濟世之良方也

杭川芎

九錢酒洗

錦莊黃

九錢酒蒸

實黃芩

九錢酒炒

厚黃柏

九錢酒炒

黑牽牛

炒取頭末六錢

薄荷葉

四錢五分

粉滑石

水飛六錢

尖檳榔

七錢五分童便洗晒

陳枳殼

四錢五分炒

淨連翹

除去心隔取淨六錢

京赤芍

六錢炒

右十一味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜爲丸如茨

實大月內之兒每服一丸稍大者二丸俱用茶湯化服乳

母切忌油膩但覺微有泄瀉則藥力行病卽減矣如不泄

再服之重病每日三服以愈爲度此方斷不峻厲李母疑

畏惟胎寒胎怯面青白者忌之

天麻丸 治胎搐先以此丸通其經絡次服地黃丸

明天麻

萬製

法半夏

北防丰

川羌活

牛膽星

直殭蠶

北全蝎

各五錢

為末蜜丸芡實大每一丸鈎藤湯下

六味地黃丸

即仲景所製金匱地黃丸原治腎水虧損小便淋瀝頭目

眩暈腰腿酸軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困

壯水之主以制陽光此方是也

錢仲陽以之治小兒胎怯稟受先天不足併肝疳白膜遮

睛瀉血失音身瘦瘡疥腎怯語遲解顱行遲等證

薛立齋又以治小兒肝經血虛燥熱腎經虛熱作渴小便淋秘痰氣上壅或風淫客乳癰癰結核或四肢搐搦眼目瞤動或欬血吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌生瘡或稟腎不足解顱失音五遲五軟腎疳肝疳凡腎肝不足之證皆宜用此以滋化源其功不能盡述

予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足誠卓然有識者予所敬佩奈今之小兒體質元氣更不及前古以地黃丸爲補劑今則實爲涼劑矣此藥用於陰虛枯燥者誠爲得宜倘兒肌肥面白脾弱多痰者服此必致膩膈變生他證其害不小非方之不良由今稟受愈薄也予故爲之掇

酌其炮製必使地黃陰凝之質稍近陽和不致沉寒沍滯始能免臍膈損脾之患矣

大懷地四兩以西砂仁一兩不必搥碎生薑二兩切片縫

晝夜方入好酒煮一晝夜以地黃麻燭為度取起其袋不用以地黃搗膏聽候

白雲苓二兩乳 懷山藥三兩乳 淨棗皮二兩

粉丹皮一兩 宜澤瀉一兩 水炒焦

右依炮製和勻一處焙燥研為細末和前地黃膏少加煉

蜜者曰內杵勻重一錢一顆半週一歲者每用一九三五

歲者二九俱空腹鹽湯化下倘九一時未備即以前藥十

分之一但宜炮製不可生用水煎服之名六味地黃湯功

效更捷

調中散 治嬰孩盤腸氣腹內作痛

青木香 川練子 暗沒藥 白雲苓 上青桂

杭青皮 萊菔子 陳枳殼 尖檳榔 炙甘草

等分人葱白二寸鹽一錢水煎空心服

茵陳地黃湯

治初誕小兒面曰渾身其黃如金胎中受濕熱也

懷生地 京赤芍 正川芎 大當歸 天花粉

赤茯苓 結猪苓 茵陳蒿 宜澤瀉

諸藥隨時定分兩水煎母子同服

大連翹飲 治胎肥解熱毒

淨連翹 瞿麥蕙 白滑石 牛蒡子 車前子

一川木通 羌防風 炒梔仁 片黃芩 京芥穗

大當歸 北柴胡 京赤芍 淨蟬蛻 炙甘草

竹葉十片燈心十莖水煎熱服

浴體法 治胎肥

明天麻 淨全蝎 去毒 箭礞砂 各五分 烏蛇肉 酒浸

枯白礬 洋青黛 各二錢 真麝香 分

共研勻每用三錢水三碗 桃枝一握同煎十沸溫熱浴之

但勿浴背