


阿虎医考

临床执业医师资格考试
押题秘笈
模拟试卷二

阿虎医考命题研究中心 组编



上海科学技术出版社

临床执业助理 医师资格考试

押题秘笈



模拟试卷二

阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

临床执业医师资格考试

第一单元

姓 名：_____

准考证号：_____

A1 型选择题(1~62 题)

答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 判断疝是否绞窄依据
 - A. 疝内容物是否有血液循环
 - B. 疝局部是否有红肿或疼痛
 - C. 疝内容物是否能完全回纳
 - D. 嵌顿时间的长短
 - E. 有无肠梗阻表现
2. 对老年体弱的慢性阻塞性肺疾病急性发作期,痰量多时下列处理哪项是不正确的
 - A. 控制感染
 - B. 氧疗
 - C. 镇咳
 - D. 祛痰
 - E. 解痉平喘
3. 医德评价的标准是
 - A. 有利于患者疾病的缓解、痊愈和生命的安全
 - B. 有利于医学科学的发展,揭示人类生命的奥秘
 - C. 有利于医疗人际关系的良性发展
 - D. 有利于医患关系的良性发展
 - E. 有利于人类生存环境的保护和改善
4. 细动脉玻璃样变最常发生于
 - A. 心、脾、肺、视网膜等处的细动脉
 - B. 肾、脑、脾、视网膜等处的细动脉
 - C. 心、肝、肾、脑等处的细动脉
 - D. 肺、胰、脾、肠等处的细动脉
 - E. 肺、脑、脾、视网膜等处的细动脉
5. 心肺复苏成功后治疗的关键是
 - A. 维持良好的呼吸功能
 - B. 防治肾功能衰竭
 - C. 防治感染
 - D. 确保循环功能的稳定
 - E. 防治脑缺氧和脑水肿
6. 主动脉瓣关闭不全的典型 X 线表现为
 - A. 烧瓶心
 - B. 靴形心
 - C. 心影正常或缩小
 - D. 梨形心
 - E. 全心大
7. 以下不属于突发公共卫生事件的是
 - A. 某城市发生甲肝暴发流行
 - B. 某城市严重大气污染造成居民肺癌死亡率上升
 - C. 某市常发生有死亡病例的食物中毒
 - D. 某核电站发生核泄漏
 - E. 某研究所发生烈性传染病菌株丢失
8. 对于急性上消化道出血,原因不明时,应行
 - A. 立即剖腹探查
 - B. 尽可能保守治疗
 - C. 立即 X 线钡餐检查
 - D. 急诊 B 超检查
 - E. 急诊胃镜检查
9. 排便时和便后肛门剧痛并带少量鲜血的病是
 - A. 直肠肛管周围脓肿
 - B. 直肠息肉
 - C. 肛裂
 - D. 混合痔
 - E. 血栓性外痔
10. 开放性气胸急救处理原则是
 - A. 立即剖胸探查
 - B. 清创缝合术

- C. 迅速封闭胸壁创口
D. 输血抗休克
E. 呼吸机辅助呼吸
11. 与幽门螺杆菌感染相关性**不确定**的疾病是
A. 消化性溃疡
B. 慢性胃炎
C. 反流性食管炎
D. 胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤
E. 胃癌
12. 甲亢危象的治疗**不宜**用
A. 丙硫氧嘧啶
B. 阿司匹林
C. 氢化可的松
D. 血液透析
E. 复方碘溶液
13. 肝硬化最常见的死亡原因是
A. 肝性脑病
B. 上消化道出血
C. 原发性肝癌
D. 自发性腹膜炎
E. 肝肾综合征
14. 下列症状是由肺癌的非转移作用所致，**除外**
A. 肥大性肺性骨关节病
B. 杵状指
C. 高钙血症
D. 上腔静脉阻塞综合征
E. 周围神经病
15. 急性胰腺炎发病急骤，主要症状为
A. 怕冷、发热
B. 恶心、呕吐
C. 腹部压痛及肌紧张
D. 剧烈上腹痛呈束带状向腰部放射
E. 腹胀和肠鸣音消失
16. 肌糖原分解**不能**直接补充血糖的原因是
A. 肌肉组织是贮存葡萄糖的器官
B. 肌肉组织缺乏葡萄糖激酶
C. 肌肉组织缺乏葡萄糖-6-磷酸酶
D. 肌肉组织缺乏磷酸酶
E. 肌糖原分解的产物是乳酸
17. 溃疡性结肠炎腹痛和腹泻明显时，应用较大剂量阿托品治疗，最可能引起下列哪种改变
A. 机械性肠梗阻
B. 肠穿孔
C. 中毒性巨结肠
D. 结肠大量出血
E. 腹痛加重
18. 核酸的一级结构，核苷酸的排列顺序实际指的是
A. 核酸分子中碱基的排列顺序
B. 核酸分子中磷酸的排列顺序
C. 核酸分子中核糖的排列顺序
D. 核酸分子中氢键的排列顺序
E. 密码子的排列顺序
19. 在医患交往的过程中，医护人员**不恰当**的交往方式是
A. 用专业术语进行交流
B. 重视患者的自我感受
C. 关注疾病本身和相关话题
D. 采取封闭和开放式的提问
E. 了解患者的安全需要
20. 行为外向、情绪兴奋性高，但心境变化剧烈，脾气暴躁的人属于
A. 多血质
B. 抑郁质
C. 黏液质
D. 胆汁质
E. 活泼质

21. 临床预防服务的对象是

- A. 健康人
- B. 患者
- C. 无症状的“患者”
- D. 健康人和无症状的“患者”
- E. 病人和无症状的“患者”

22. 关于下列输血描述不恰当的是

- A. 加强观察,输血后血袋立即处理掉,以减少对医务人员的污染
- B. 输血前必须仔细核对患者和供血者姓名、血型和交叉配血单
- C. 输注速度依病情而定,成人一般控制在5~10 ml/min,小儿10滴左右
- D. 老年人和心功能较差者应以较慢速度输注,急性大出血时,可加压快速输注
- E. 不向血液内加入任何药物或溶液,以免产生溶血或凝血

23. 抗结核治疗疗效的主要指标是

- A. 临床症状减轻
- B. 胸部X线病变吸收
- C. 体温正常
- D. 咯血停止
- E. 痰菌转阴

24. 有关肿瘤细胞分化的叙述,错误的是

- A. 恶性肿瘤的分化程度不同,其恶性程度亦不同
- B. 恶性肿瘤可分为高分化、中分化与低分化(或未分化)
- C. 酶的活性并不随分化程度的高低而增高或降低
- D. 未分化显示高度恶性,核分裂较多
- E. 高分化接近正常分化程度,恶性程度低

25. 洋地黄中毒所致的何种心律失常不宜补钾治疗

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 频发室性期前收缩
- C. 快速心房颤动

D. 三度房室传导阻滞

E. 室性心动过速

26. COPD急性加重期的治疗,最为主要的措施是

- A. 止咳祛痰
- B. 控制感染
- C. 解痉平喘
- D. 菌苗注射
- E. 吸氧补液

27. 治疗外周血管痉挛性疾病宜选用的药物是

- A. M受体激动药
- B. N受体激动药
- C. α 受体阻断药
- D. β 受体阻断药
- E. β 受体激动药

28. 肝硬化时下列临床表现中与内分泌失调有关的是

- A. 夜盲
- B. 黄疸
- C. 全身恶病质
- D. 蜘蛛痣
- E. 出血点或出血斑

29. 在下列氨基酸中属酸性氨基酸的是

- A. 半胱氨酸
- B. 脯氨酸
- C. 色氨酸
- D. 精氨酸
- E. 谷氨酸

30. 针对耐药菌株的新型抗结核药是

- A. 异烟肼
- B. 力排肺疾
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 乙硫异烟胺

31. 下列哪一项**不是**心力衰竭发病因素

- A. 冠心病
- B. 高血压病
- C. 风湿性心脏病
- D. 摄盐不足
- E. 心肌病

32. 患者大便变细,便意频繁,首先应行

- A. 直肠指检
- B. 粪便培养加药物敏感试验
- C. X线钡剂灌肠检查
- D. 纤维结肠镜检查
- E. 乙状结肠镜检查

33. 作为呼吸链组分的维生素有

- A. 尼克酸或尼克酰胺
- B. 泛酸
- C. 维生素 E
- D. 硫辛酸
- E. 维生素 A

34. 能生成酮体的器官是

- A. 骨骼肌
- B. 脑
- C. 心
- D. 肺
- E. 肝

35. 最有助于诊断感染性心内膜炎的辅助检查是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 心血管造影
- E. 心脏 CT

36. 胆道手术时,下述哪项**不是**胆总管探查的指征

- A. 胆总管、肝总管、肝胆管结石
- B. 黄疸或黄疸病史
- C. 胰头肿大,变硬

D. 胆总管增厚变粗

E. 胆囊积液

37. 中央型肺癌的特点应**除外**

- A. 位于肺门部
- B. 由段以上支气管发生
- C. 多属腺癌
- D. 巨大癌块环绕支气管
- E. 较易被纤支镜检查发现

38. 提示急性胰腺炎预后不良的指标是

- A. 血钙低于 1.75 mmol/L
- B. 血清淀粉酶超过 500 U(Somogyi)
- C. 淀粉酶,肌酐清除率比值超过正常 3 倍
- D. 血清淀粉酶升高持续不降超过 5 天
- E. 血钾、血镁同时降低

39. 下列哪一项**不是**职业病的预防措施

- A. 领导重视、积极贯彻劳动标准和劳动保护法规
- B. 开展群众性的预防工作
- C. 技术革新
- D. 定期预防接种
- E. 加强个人防护,监测职业有害因素

40. 胃大部切除术后患者出现贫血,其主要原因是

- A. HCl 减少
- B. 黏液减少
- C. 内因子减少
- D. HCO_3^- 减少
- E. 胃蛋白酶活性减弱

41. II 型呼吸衰竭时患者肺功能改变主要是

- A. 动-静脉样分流增加
- B. 通气/血流比例失调
- C. 肺泡通气功能障碍
- D. 弥散功能障碍
- E. 机体氧耗量增加

42. 患者戒烟的强化因素是
- A. 医生指导患者如何戒烟
 - B. 患者使用帮助戒烟的产品
 - C. 患者了解吸烟的危害
 - D. 医生对患者戒烟表示肯定和赞许
 - E. 吸烟者很难买到香烟
43. 标准误越大,则表示此次抽样得到的样本频率
- A. 系统误差越大
 - B. 可靠程度越大
 - C. 抽样误差越大
 - D. 可比性越差
 - E. 代表性越差
44. 属于疾病三间分布综合描述的是
- A. 中老年人群高血压患病率较儿童高
 - B. 乳腺癌多发于女性
 - C. 移民流行病学
 - D. 美国艾滋病感染率是中国的数十倍甚至更高
 - E. 人对狂犬病普遍易感
45. 腹部外伤伴有内出血休克,最重要的处理原则是
- A. 补充液体
 - B. 给予镇静药
 - C. 使用血管活性物质
 - D. 控制感染
 - E. 及时手术探查
46. 心理健康的标准不包括
- A. 人际和谐
 - B. 人格完整
 - C. 社会适应
 - D. 信仰坚定
 - E. 情绪良好
47. 下肢静脉曲张患者行高位结扎及剥脱术的禁忌证是
- A. 浅静脉瓣膜功能不全
 - B. 交通支瓣膜功能不全
 - C. 深静脉阻塞
 - D. 小腿慢性溃疡
 - E. 小腿色素沉着
48. 《突发性公共卫生事件应急条例》规定,医疗卫生机构应当对传染病做到
- A. 早发现、早观察、早隔离、早治疗
 - B. 早发现、早观察、早治疗、早康复
 - C. 早发现、早报告、早隔离、早治疗
 - D. 早发现、早报告、早隔离、早康复
 - E. 早预防、早发现、早治疗、早康复
49. 心绞痛的痛觉是由什么引起
- A. 冠脉痉挛
 - B. 心肌缺血缺氧代谢产物刺激神经
 - C. 迷走神经紧张性增高
 - D. 窦房结、房室结功能低下
 - E. 低钾血症
50. 治疗高血压伴有劳力型心绞痛,下列何种药物为宜
- A. β 受体阻断药
 - B. 利舍平
 - C. 甲基多巴
 - D. 硝苯地平
 - E. 可乐定
51. 红细胞不具有
- A. 运输氧和二氧化碳的能力
 - B. 较强的缓冲能力
 - C. 止血和凝血能力
 - D. 渗透脆性
 - E. 悬浮稳定性
52. 结合胆红素是
- A. Y蛋白与胆红素结合
 - B. Z蛋白与胆红素结合
 - C. Y、Z蛋白与胆红素结合
 - D. 胆红素与葡萄糖醛酸结合
 - E. 清蛋白与胆红素结合

53. 临床上最为常用的血液制品是
- A. 洗涤红细胞
 - B. 红细胞悬液(添加剂红细胞)
 - C. 浓缩白(粒)细胞
 - D. 普通冰冻血浆
 - E. 凝血因子
54. K_m 值与底物亲和力大小关系是
- A. K_m 值越大,酶和底物的亲和力越大
 - B. K_m 值越小,酶和底物的亲和力越大
 - C. K_m 值大小与酶和底物的亲和力无关
 - D. K_m 值越小,酶和底物的亲和力越小
 - E. K_m 值固定在某一个范围内时,酶和底物的亲和力最大
55. 不宜应用糖皮质激素治疗的疾病是
- A. 湿疹
 - B. 麻疹
 - C. 败血症
 - D. 急性粟粒性肺结核
 - E. 结膜炎
56. 左心衰竭最早出现的症状是
- A. 劳力性呼吸困难
 - B. 心源性哮喘
 - C. 咳粉红色泡沫样痰
 - D. 端坐呼吸
 - E. 夜间阵发性呼吸困难
57. 关于瘢痕性幽门梗阻的临床表现错误的描述是
- A. 呕吐量大,一次可达 1 000~2 000 ml
 - B. 呕吐物多为宿食,有酸臭味,含有胆汁
 - C. 上腹隆起,可有蠕动波
 - D. 可有振水音
 - E. 可有低钾低氯性碱中毒
58. 下列哪种为第三级预防
- A. 遗传咨询
 - B. 产前检查
 - C. 普查
 - D. 筛检
 - E. 康复治疗
59. 未经批准擅自开办医疗机构行医的,承担以下法律责任,除了
- A. 警告
 - B. 没收其违法所得及其药品药械,处 10 万元以下罚款
 - C. 对医师吊销执业证书
 - D. 给患者造成损害的,承担赔偿责任
 - E. 构成犯罪的,追究刑事责任
60. 在炎症局部,巨噬细胞增生形成境界清楚的结节状病灶称为
- A. 肉芽组织
 - B. 炎性息肉
 - C. 炎性假瘤
 - D. 肉芽肿
 - E. 炎细胞浸润
61. 在流行病学研究中,相对危险度主要应用于
- A. 现场试验
 - B. 病例对照研究
 - C. 现况研究
 - D. 生态学研究
 - E. 队列研究
62. 医学伦理学属于
- A. 环境伦理学
 - B. 社会伦理学
 - C. 元伦理学
 - D. 描述伦理学
 - E. 规范伦理学

A2 型选择题(63~116 题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

63. 男,62 岁。8 天前爬楼时突发胸痛,持续约 6 小时后缓解,心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 可见病理性 Q 波,T 波倒置。下列检查结果对明确诊断意义最大的是

- A. 乳酸脱氢酶水平
- B. 天门冬氨酸氨基转移酶水平
- C. CK-MB 水平
- D. 肌酸激酶水平
- E. 肌钙蛋白水平

64. 男,70 岁。吞咽困难 3 个月,食管钡透:中段有 3 cm 的不规整食管充盈缺损,镜取活体组织病理为鳞癌,心电图有 ST 段下降、T 波倒置,肺功能:严重障碍,其治疗方法为

- A. 药物治疗
- B. 根治性手术切除
- C. 姑息性手术
- D. 放射治疗
- E. 胃造瘘术

65. 女,35 岁。丈夫在一次车祸中去世,其来院就诊时痛不欲生,在心理咨询室痛哭流涕。对于这位来访者,心理咨询师在初始阶段一般不应采取的措施是

- A. 教会其放松
- B. 教会其乐观
- C. 对质其懦弱
- D. 争取其社会支持
- E. 增强其耐受挫折的能力

66. 某县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后,立即对该药店进行了查处,并依照《药品管理

法》的规定,将其销售给患者的保健食品认定为

- A. 按假药论处的药
- B. 假药
- C. 食品
- D. 劣药
- E. 按劣药论处的药

67. 男,60 岁。心前区痛间发 1 个月,多在夜间发作,与活动无关。每次发作 15 分钟,发作时心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段抬高。最可能的诊断为

- A. 稳定型心绞痛
- B. 恶化型心绞痛
- C. 急性心肌梗死
- D. 卧位型心绞痛
- E. 变异型心绞痛

68. 女,17 岁。因淋雨后突起畏寒、寒战、发热、咳嗽 1 天多,就诊前曾咳铁锈色痰。胸片示右下肺叶大片致密影。血常规:WBC $17 \times 10^9/L$, N 0.9, L 0.1。经青霉素治疗后体温降至正常,3 天后又再发热。其原因应考虑

- A. 诊断错误
- B. 未加用退热剂
- C. 青霉素剂量太小
- D. 有并发症发生
- E. 机体反应性太差

69. 男,55 岁。无痛性肉眼血尿 4 个月,IVU 显示左肾盂内有充盈缺损,膀胱镜检查见左侧输尿管口喷血。应考虑

- A. 肾结核

B. 肾癌

C. 肾盂肾炎

D. 肾盂癌

E. 肾炎

70. 男,45岁。平素身体健康,近2个月出现上腹饱胀不适,偶有隐痛,伴食欲缺乏,近2天有黑粪,最有诊断意义的检查是

A. 腹部B超

B. 粪便隐血试验

C. 胃液分析

D. X线钡餐检查

E. 胃镜+活检

71. 男,42岁,二尖瓣狭窄10年。查体:脉搏99次/分,BP 120/80 mmHg,心率108次/分,心律绝对不齐。该患者最可能的心律失常是

A. 心房颤动

B. 室性期前收缩

C. 阵发性室上性心动过速

D. 阵发性室性心动过速

E. 第三度房室传导阻滞

72. 女,21岁。突然发作持续性心悸1小时,既往有支气管哮喘史。心电图:心率180次/分,节律规则,QRS波群 <0.11 秒,未见明确P波。经采用刺激迷走神经方法无效。目前应首先选用哪种方法治疗

A. 静脉注射维拉帕米

B. 静脉注射奎尼丁

C. 肌内注射新斯的明

D. 静脉注射毛花苷C

E. 同步直流电复律

73. 女,25岁。反复发作下腹闷痛伴黏液脓血便2年,近来症状复发,伴全身关节酸痛,无发热,大便常规:黏液、白细胞(+),红细胞(++),大便多次培养阴性,该患者应试用以下哪种治疗为最适合

A. 抗结核治疗

B. 抗阿米巴治疗

C. 柳氮磺吡啶

D. 呋喃唑酮

E. 支持疗法

74. 女,24岁。近2个月来常四肢关节疼痛,伴皮肤结节、红斑。10天前发热($T 38^{\circ}\text{C}$)、咳嗽,咳少量痰。胸部X线片示右上肺斑片状影伴空洞形成。该患者最可能的诊断是

A. 肺囊肿继发感染

B. 肺脓肿

C. 肺结核

D. 支气管肺癌

E. 细菌性肺炎

75. 男,40岁。患肝硬化腹水2年,近2周来发热,腹痛,尿少,全腹压痛伴轻反跳痛,腹水征阳性,腹水常规为渗出液(白细胞分类以多核为主),周围血白细胞计数增高,应首先采取的治疗措施是

A. 早期、足量、联合应用抗生素

B. 积极治疗原发病

C. 加强支持治疗,输白蛋白

D. 按腹水培养结果选用抗生素

E. 利尿,止痛,对症处理

76. 男,70岁。慢性咳嗽20余年,近5年来呼吸困难渐进性加重,查体:消瘦,静息时亦气急,呈耸肩张口状。嘱其练习缩唇深呼吸,理由是

A. 改善肺泡-毛细血管膜氧交换

B. 减少呼吸运动氧耗量

C. 改善肺内气体分布

D. 纠正通气/血流比失调

E. 不使肺泡-口腔压力梯度下降过快,避免气道陷闭

77. 男,32岁。十二指肠球部溃疡患者,3天来上腹痛加重,反复呕吐,为胃内容物及咖啡样物,共3次约500 ml,无宿食,吐后疼痛缓解,最可能合并

- A. 幽门梗阻
- B. 穿孔
- C. 上消化道出血
- D. 癌变
- E. 弥漫性腹膜炎

78. 男,53岁。右季肋部胀痛1月余。查体:无黄疸,肝肋缘下3cm,质硬,无腹水征。B超示肝右叶低回声病灶,约11cm×10cm,肝左叶见多个小低回声区。AFP>1000 μg/L。最佳的治疗措施是

- A. 抗感染治疗
- B. 肝动脉插管栓塞化疗
- C. 剖腹探查术
- D. 放射治疗
- E. 中草药治疗

79. 某地区进行学龄儿童流脑疫苗接种率调查,首先将该地区各县分为好、中、差三类,然后在每类中随机抽1/10的学龄儿童进行调查,这种抽样方法属于

- A. 多级抽样
- B. 系统抽样
- C. 分层抽样
- D. 整群抽样
- E. 单纯随机抽样

80. 一老年人,喜欢吃水果及谷类食物,不愿吃动物性食品,最近感到手脚麻木,关节痛,并有“抽筋”现象,这种现象的最可能解释是

- A. 血清铁降低
- B. 血清钙降低
- C. 血清磷降低
- D. 血清钠降低
- E. 血清锌降低

81. 男,50岁。右侧下肢静脉曲张已10年,劳累后肢体肿胀、皮炎及溃疡经久不愈,应行

- A. 局部药物治疗

- B. 抗感染治疗
- C. 手术治疗
- D. 弹性绷带包扎治疗
- E. 物理治疗

82. 男,50岁。身高180cm,体重68kg,患2型糖尿病1年,经饮食控制、体育锻炼,血糖未达到理想水平。治疗方案首选

- A. 格列齐特治疗
- B. 二甲双胍治疗
- C. 胰岛素治疗
- D. 胰岛素+二甲双胍治疗
- E. 格列本脲+二甲双胍治疗

83. 男,28岁。右小腿急性蜂窝织炎,经抗炎、患肢抬高及湿敷,炎症继续向上蔓延波及整个下肢,WBC $25 \times 10^9/L$,中性粒细胞90%,体温39.5℃,脉搏120次/分,最佳治疗措施是

- A. 更换抗生素种类
- B. 局部理疗
- C. 加强全身支持疗法
- D. 广泛多处减张切开
- E. 少量多次输新鲜血

84. 男,68岁,急性前壁心肌梗死。为预防再梗和猝死,如无禁忌证,宜尽早使用的药物是

- A. 硝苯地平
- B. 阿托品
- C. 美托洛尔
- D. 地高辛
- E. 美西律

85. 有甲乙两患者,甲患者左心室舒张末期容积为140ml,收缩末期容积为56ml,乙患者左室舒张末期容积为160ml,收缩末期容积为64ml,两者的射血分数

- A. 相等
- B. 甲高于乙
- C. 乙高于甲

- D. 不能比较
- E. 均高于正常

86. 患者因感冒服扑热息痛 2 片,后感上腹不适,呕吐咖啡样物约 500 ml,首选治疗是

- A. 注射维生素 K
- B. 口服云南白药
- C. 注射垂体后叶素
- D. 口服甲硝唑
- E. 静滴奥美拉唑

87. 女,30 岁。车祸撞伤右上腰部 40 分钟,查体:P 118 次/分,BP 90/60 mmHg,痛苦貌,腹肌紧张,以右上腹为甚,有压痛和反跳痛,右下腹穿刺抽出含有胆汁的血液,术前处理最重要的是

- A. 防止休克
- B. 止血
- C. 防止感染
- D. 止痛
- E. 镇静

88. 女,44 岁。上腹灼痛 3 个月,柏油样便 2 日,为确诊首选

- A. X 线钡餐透视
- B. MRI
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. B 超

89. 女,32 岁。因发热、胸痛 5 天就诊,查体:T 38.5℃,BP 120/80 mmHg,双肺呼吸音清,心界不大,心率 92 次/分,律齐,胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及抓刮样粗糙音,屏气时仍存在,该患者最可能的诊断是

- A. 纤维蛋白性心包炎
- B. 急性胸膜炎
- C. 扩张型心肌病
- D. 肥厚型心肌病
- E. 病毒性心肌炎

90. 男,35 岁。反复活动后心悸、气促、下肢水肿半年。查体:双肺底少许湿性啰音。心脏明显扩大,心率 110 次/分,律齐,可闻及舒张期奔马律。肝肋下 3 cm,下肢水肿(+),超声心动图示全心扩大,室壁运动呈弥漫性减弱,心包少量积液,尿蛋白(+),最可能诊断为

- A. 慢性肾炎
- B. 缺血性心肌病
- C. 肝硬化
- D. 扩张型心肌病
- E. 结核性心包炎

91. 女,40 岁。月经正常,右乳癌根治术后。病理报告为右乳腺浸润性导管癌,右腋窝淋巴结(4/20)转移,雌激素和孕激素受体检测均为阴性。最合适的治疗是

- A. 应用芳香化酶抑制剂
- B. 应用他莫昔芬
- C. 联合化疗
- D. 应用雄激素受体抑制剂
- E. 卵巢切除

92. 女,32 岁。左下腹痛 2 个月。黄稀便,每日 3 次。结肠镜示:直肠、乙状结肠糜烂及浅溃疡,大范围充血、水肿。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 肠结核
- C. 结肠癌
- D. 慢性肠炎
- E. 溃疡性结肠炎

93. 男孩,10 岁。半个月前曾患“脓皮病”,近 3 天晨起眼睑水肿,且逐日加重,尿少,尿色深。查体:BP 140/90 mmHg,心率 114 次/分,肝肋下 1.5 cm,轻压痛。首选的治疗是

- A. 卡托普利
- B. 吸氧
- C. 利尿剂

- D. 泼尼松
E. 强心剂

94. 一种筛检乳腺癌的试验用于研究经病理检查证实患有乳腺癌的 400 例妇女和未患乳腺癌的 400 名妇女,结果患癌组有 100 例阳性,未患癌组有 50 例阳性,该试验能将实际无病判定为阴性的能力是

- A. $100/300=0.33$
B. $100/400=0.25$
C. $100/150=0.67$
D. $50/400=0.125$
E. $350/400=0.87$

95. 女,24 岁。因心悸、多食、消瘦、月经量少就诊,经查体及实验检查确诊为 Graves 病,病人幼年时有哮喘史,下述何种药物应禁忌

- A. 甲基硫氧嘧啶
B. 他巴唑
C. 甲亢平
D. 甲状腺素片
E. 普萘洛尔

96. 20 世纪 50 年代,发现某省部分地区的居民因长期饮用深井高碘水导致高碘性甲状腺肿,随即抽查得到该地区甲、乙两村常住居民的高碘性甲状腺肿患病率,甲村为 20.6%,乙村为 25.3%,则甲乙两村该病的合计患病率应为

- A. 甲乙两村调查人群中患该病总人数除以调查总人数
B. 两患病率的几何平均数,得 29.11%
C. 两患病率相加,得 45.9%
D. 两个患病率相乘,得 5.21%
E. 两患病率的平均数,为 22.95%

97. 一冠心病患者血中胆固醇 7.4 mmol/L, LDL-C 3.5 mmol/L, TG 1.4 mmol/L,宜用何种调脂剂

- A. 烟酸

- B. 益多酯
C. 辛伐他汀
D. 非诺贝特
E. 吉非洛齐

98. 男,30 岁。左下腹痛伴脓血便半个月。查体腹部无异常。检查方法首选

- A. 大便常规+培养
B. B 超
C. 钡灌肠
D. 全程钡餐
E. 全结肠镜检

99. 男,64 岁。突然发生胸骨后剧痛。心电图显示 II、III、aVF 均有深而宽的 Q 波,ST 段抬高,最可能诊断为

- A. 急性前间壁心梗
B. 急性下壁心梗
C. 急性前侧壁心梗
D. 急性高侧壁心梗
E. 急性广泛前壁心梗

100. 女,60 岁。头晕、心悸 3~4 年,心尖搏动向左下移位,呈抬举性搏动,于胸骨左缘第 3、4 肋间闻及叹气样舒张期杂音,为递减型,向心尖传导,在心尖区闻及隆隆样舒张早期杂音,股动脉可闻及射枪音,诊断为

- A. 二尖瓣关闭不全
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 主动脉瓣狭窄
E. 二尖瓣脱垂

101. 男孩,13 岁。脐周痛 12 小时,伴恶心,无呕吐,转移至右下腹 4 小时。查体:体温 38℃,右下腹明显压痛、反跳痛。白细胞计数为 $18 \times 10^9/L$,首选治疗为

- A. 给予抗生素,继续观察
B. 给予镇痛药
C. 物理降温
D. 急诊手术

E. 口服肠道抗生素

102. 女, 35 岁。间断咳嗽、咳痰伴咯血 20 年, 行 HRCT 检查示右中叶支气管囊状扩张, 其余肺叶未见异常。今日再次咯血, 量约 200 ml, 给予静脉点滴垂体后叶素治疗, 效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为

- A. 手术切除病变肺叶
- B. 换用酚妥拉明静脉滴注
- C. 静脉滴注鱼精蛋白
- D. 支气管镜下止血
- E. 支气管动脉栓塞

103. 一因车祸受重伤的男子被送去医院急救, 因没带押金, 医生拒绝为病人办理住院手续, 当病人家属拿来钱时, 已错过了抢救最佳时机, 病人死亡。本案例违背了病人权利的哪一点

- A. 享有自主权
- B. 享有知情同意权
- C. 享有保密和隐私权
- D. 享有基本的医疗权
- E. 享有参与治疗权

104. 老年女性, 反复咳嗽咳痰 10 年。近 3 个月来经抗炎等治疗后病情好转, 但仍有轻微咳嗽, 查体: 双下肺背部可闻少量细湿啰音。该病诊断应为

- A. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期
- B. 慢性阻塞性肺疾病稳定期
- C. 支气管扩张
- D. 阻塞性肺疾病慢性迁延期
- E. 慢性肺脓肿

105. 女, 42 岁。咳嗽、胸闷、气短 4 个月, 胸片示左肺上叶前段反复出现片状阴影, 白细胞: $10 \times 10^9/L$, 痰结核菌涂片 3 次(-), 经用青霉素治疗病情好转, 但肺部阴影消散不完全, 为确定诊断最重要的检查是

- A. 痰化脓菌培养及药物敏感试验

B. 继续查痰结核菌

C. 胸部 CT 检查

D. 纤维支气管镜检查

E. 结核菌素试验

106. 女, 29 岁。经前乳房胀痛及出现肿块, 经后自行消退, 应考虑为

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 浆细胞性乳腺炎
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳管内乳头状瘤

107. 女, 25 岁。足月妊娠, 因前置胎盘发生 DIC, 阴道大出血入院。查体: T 35°C , P 130 次/分, R 25 次/分, BP 90/40 mmHg。实验室检查: Hb 55 g/L, PLT $20 \times 10^9/L$, 血纤维蛋白原 1.6 g/L。不正确的输血处理措施是输注

- A. 新鲜冰冻血浆
- B. 浓缩血小板
- C. 普通冰冻血浆
- D. 冷沉淀
- E. 悬浮红细胞

108. 男, 40 岁。8 个月前行二尖瓣机械瓣置换术, 1 个月来发热, 体温 $37.5 \sim 38.0^\circ\text{C}$ 。化验 Hb 82 g/L, 尿 RBC 5~6 个/HP, 血培养结果未回报。治疗应首选哪种药物

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 头孢菌素
- D. 两性霉素
- E. 氯霉素

109. 随机选择 2 岁组儿童 1 000 名进行免疫接种预防某病的试验, 观察了 10 年, 结果表明 80% 的免疫接种者未得病, 由此研究者认为

- A. 该疫苗预防有效, 因为有较高的免疫率
- B. 该疫苗预防效果欠佳, 因为有 20% 儿童

生病

- C. 不能下结论,因为未进行统计学检验
- D. 不能下结论,因为未设对照组
- E. 不能下结论,因为 10 年观察时间不够长

110. 女,58 岁。患有慢性阻塞性肺疾病 15 年,加重 1 周入院。入院时神志清楚,动脉血气分析示 PaCO_2 50 mmHg, PaO_2 45 mmHg。吸入 40% 浓度氧后,患者呼之不应,查动脉血气分析示 PaCO_2 90 mmHg, PaO_2 75 mmHg。患者出现意识障碍的原因是

- A. 感染加重
- B. 气道阻力增加
- C. 呼吸中枢受到抑制
- D. 脑血管意外
- E. 感染中毒性脑病

111. 肝硬化失代偿期患者,经卧床、限盐及利尿剂治疗仍有中等量腹水,下肢水肿,血浆白蛋白 20 g/L,血钾 3.56 mmol/L,血钠 138 mmol/L,目前最重要的治疗措施是

- A. 继续利尿
- B. 导泻
- C. 腹腔穿刺放腹水
- D. 腹腔-颈静脉分流术
- E. 静脉输注白蛋白

112. 女,51 岁。突然出现头痛、黑矇及失语症状,测血压 220/130 mmHg。应首选下列哪种降压药物

- A. 卡托普利
- B. 呋塞米
- C. 普萘洛尔
- D. 硝普钠
- E. 维拉帕米

113. 对一个恐高症患者,医生一下子带他

到 20 层楼顶,让他充分地暴露于所恐惧的情景中,这是

- A. 示范法
- B. 恐惧疗法
- C. 满灌疗法
- D. 模仿疗法
- E. 厌恶疗法

114. 某患者诊断为初发劳力型心绞痛,已服硝酸异山梨酯和地尔硫草治疗,仍频频有自发性心绞痛发作。有必要加用下列何种药物

- A. 双嘧达莫
- B. 硝苯地平
- C. 卡托普利
- D. 阿司匹林
- E. 哌替啶

115. 某医院进行的一项动物实验结果显示,口服葡萄糖比静脉注射相同剂量葡萄糖引起的胰岛素分泌更多,这是由于口服葡萄糖可引起哪种刺激胰岛素分泌的胃肠激素释放

- A. 促胃液素
- B. 抑胃肽
- C. 缩胆囊素
- D. 胰高血糖素
- E. 促胰液素

116. 某患者长期住院,只靠静脉给养,血清检出二十碳三烯酸与花生四烯酸的比值为 0.5,最可能缺乏的营养素是

- A. 铁
- B. 蛋白质
- C. 必需脂肪酸
- D. 锌
- E. 脂肪