

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明 良甫編輯
明 古吳 薛 己 立齋補註
鄞縣 曹赤電 炳章圈校

卷二十一

產後寒熱方論第一

產後發熱。頭痛身疼。雖如傷寒時氣。雖當用麻黃。亦不可輕易。如早起勞動。爲寒所傷。則漸漸惡寒。翕翕發熱。頭項肩背骨節皆痛。至七八日乃差。若大便堅。作嘔不能食。用小柴胡湯。加生薑。地黃主之。

愚按。病機要云。治胎產之病。從厥陰經論之。無犯胃氣。及上中二焦。爲之三禁。不可汗。不可下。不可利小便。發汗者。同傷寒下之早證。利大便。則脈數而已動於脾。利小便。則內亡津液。胃中枯燥。製藥之法。能不犯三禁。則榮衛自和而寒

熱止矣。

人參當歸散 治去血過多。內熱短氣。頭痛悶亂。骨節作痛。或虛煩咽燥。

人參

當歸

生地黃

桂心

白芍藥

麥門冬去心各一兩

右粳米一合。竹葉十片。水二鍾。煎一鍾去之。入藥五錢。棗二枚。煎服。虛甚。用熟地黃。

小柴胡湯 治傷風四肢煩熱頭疼。若頭不疼而作煩。二物黃芩湯。方見二十四卷第二論

二物黃芩湯

黃芩半兩

苦參半兩

生地黃二兩

右每服四錢。水煎。

增損柴胡湯 治虛弱寒熱。少食腹脹等症。方見前

竹葉防風湯 治產後傷風發熱。面赤氣喘頭痛。

淡竹葉半把

防風

人參

桂枝

桔梗

甘草各半兩

葛根半兩

右每服五錢。薑棗水煎。汗出項強。加附子。嘔。加半夏。

治惡露不盡。晝則明了。暮則譫語。寒熱如見鬼。此熱入血室。用柴胡地黃湯。或四物加柴胡。方見六卷第十五論

產後頭痛方論第二

夫頭者。諸陽之會也。產後胃氣虛弱。飲食少思。陽氣微弱。不能上升。故頭痛。若因敗血。黑龍丹言之甚詳。

愚按前症。若中氣虛。用補中益氣湯加蔓荊子。若血虛。用四物加參朮。血氣俱虛。用八珍湯。若因風寒所傷。用補中益氣湯加川芎。

附治驗

一產婦患頭痛。日用補中益氣湯。不缺已三年矣。稍勞則惡寒內熱。爲陽氣虛。以前湯加附子一錢。數劑不發。
一婦人產後頭痛。面青二年矣。日服四物等藥。余謂腎水不能生肝木而血虛。用六味丸加五味子。兩月而痊。

芎附散 治氣虛頭痛。用大附子一枚。去皮臍切四片。拌礬醋一碗。炙附蘘盡。同

川芎一兩爲末。每服二錢。清茶調服。

治血虛頭疼。當歸、川芎。每服五錢。水煎。

產後頭痛。都梁丸亦可治。方見四卷第六論

附方

補中益氣湯

四物湯二方見二十卷第六論

八珍湯方見二十四卷第四論

六味丸方見二十四卷第十一論

產後咳嗽方論第二

夫肺主於氣。產後肺氣虛。故外邪感而咳嗽。所由作也。若食鹽醯之類而致者。難治。若因麵積滯而致者。服黑神散、五積散可愈。

愚按前症若陰血虛。四物湯加參、朮、陳皮、桔梗。肺氣虛。四君加芎、歸、桔梗。陰火上炎。六味地黃丸加參、朮。風寒所感。補中益氣湯加桔梗、紫蘇。若瘀血入肺發喘。兼口鼻起黑。或鼻出血。急用二味參蘇飲。亦有得生者。然而所患。悉因胃氣。

不足。蓋胃爲五臟之根本。胃氣一虛。五臟失所。百病生焉。經云。肺屬辛金。生於巳土。脾土既虛。不能生金。則腠理不密。外邪易感矣。治當壯土金。生腎水。以制火爲善。

附治驗

一產婦朝吐痰。夜發熱。無寐。泥用清痰降火之藥。肌體日瘦。飲食日少。余曰。早間吐痰。脾氣虛也。夜間發熱。肝血虛也。晝夜無寐。脾無耗也。遂用六君子湯。加味逍遙散。加味歸脾湯。以次調補。不月而痊。

一產婦咳嗽。見風則喘急惡寒。頭痛自汗。口禁痰盛。余爲脾肺氣虛。腠理不密。用補中益氣加肉桂。數劑而安。

一產婦咳嗽聲重。鼻塞流涕。此風寒所感。余用參蘇飲。一鍾頓愈。與補中益氣加桔梗茯苓。半夏。一劑將痊。又與六君。黃耆。以實腠理全愈。

一產婦咳嗽痰盛。面赤口乾。內熱晡熱。徹作無時。此陰火上炎。余用補中益氣湯。六味地黃丸而愈。

一產婦咳而胸滿不食。涕唾面腫氣逆。此病在胃而關於肺。用異功散而愈。

知母散 治惡露上攻咳嗽不已。

知母

貝母

白茯苓

人參各半兩

桃仁

杏

仁並生去皮尖各一兩

右每服五錢。水煎。

治風寒咳嗽。

甘草

桔

梗各六分

款冬花四分

麥門冬

生地黃各一錢二分

葱

白一握

用水煎服。

旋覆花湯

治咳嗽最良。

方見下有汗者去麻黃

附方

異功散

治脾胃虛弱。

飲食少思。或久患咳嗽。或腹滿不食。面浮氣逆等症。

人參

白

朮炒

甘

草炒

茯

苓

陳皮錢各一

用薑棗水煎。

六君子湯

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論

二味參蘇飲

方見後

參蘇飲

方見六卷第十一論

產後喉中氣急喘促方論第四

產後喉中氣急喘促。因榮血暴竭。衛氣無主。獨聚於肺。名曰孤陽。最爲難治。若因敗血停凝。服奪命丹。若因榮血暴絕。服芎藭湯。若因風寒所傷。服旋覆花湯。若因氣鬱結。服小調經散。若因傷飲食。服見睨丸。

愚按。前症若脾肺氣虛弱。用六君桔梗。若兼外邪。更加紫蘇。若中氣虛寒。用補中益氣。加炮薑肉桂。若陽氣虛脫。更加附子。若血症入肺。急用二味參蘇飲。

附治驗

一產婦喘促自汗。手足俱冷。常以手護臍腹。此陽氣虛脫。用參附湯四劑而愈。二味參蘇飲。治產後血入於肺。面黑發喘欲死者。

人參一兩

蘇木二兩

用水煎頓服。

旋覆花湯 治傷風寒暑濕。喘嗽太盛。坐臥不寧。

旋覆花

赤芍藥

前胡

半夏

荊芥穗

甘草

茯苓

五味子

杏仁

麻黃各等分

右每服四錢。薑棗水煎。有汗者莫服。

五味子湯 治產後喘促。脈伏而厥。

五味子并炒

人參

杏仁各二錢

麥門冬去心

陳皮各一錢

右薑三片。棗二枚。水煎服。

芎藭湯方見後

附方

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論參附湯方見十八卷第六論

產後口鼻黑鼻衄方論第五

產後口鼻起黑氣及鼻衄者。蓋陽明經脈之海。起於鼻。交頰中。還出頰口。交人中。左之右。右之左。此產後氣虛。榮血散亂。胃絕肺敗之症也。急取緋線一條。并產婦頂心髮兩條。緊緊繫中指節。更無藥可療。

愚按。胃脈頰口繞承漿。蓋鼻準屬脾土。鼻孔屬肺金。誠胃虛肺損。氣脫血死之症。急用二味參蘇飲。加附子五錢。亦有得生者。方見前

產後咳噫方論第六

夫肺主於氣而稟於胃。蓋產後脾胃傷損。風冷所搏。故咳噫也。急灸期門三壯。必愈。此穴乃胃之大絡。方見六卷第十五論

愚按。前症屬胃氣虛寒之惡候。如用後方未應。急投參附湯。亦有復生者。方見卷第六論

丁香散 治心煩咳噫。

丁香

白荳蔻

各半

伏龍肝 一兩

右爲末。煎桃仁吳茱萸湯。每服一錢調下。

羌活散 治咳逆。

羌活

附子炮

茴香炒兩

木香

白薑炮各錢

右爲末。每服二錢。水一盞。鹽一捻。煎服。
一方用桂心五錢。薑汁三合。水煎服。

產後血崩方論第七

產後血崩。因經脈未復而勞傷。或食酸鹹之味。若小腹滿痛。肝能已傷。最爲難治。
急服固經丸主之。

愚按前症若血滯小腹脹滿。用失笑散。血少小腹虛痞。芎藭湯。肝火血妄行。加
味逍遙散。脾鬱不統血。加味歸脾湯。脾氣虛不攝血。補中益氣湯。厚味積熱傷
血。清胃散。加槐花。風熱相搏傷血。四君子。防風。枳殼。

附治驗

一產婦血崩。小腹脹痛。用破氣行血之劑。其崩如湧。四肢不收。惡寒嘔吐。大便頻

瀉。余用六君炮黑薑。四劑稍愈。又十全大補。三十餘劑而痊。

一產婦血崩。因怒其血如湧。仆地口禁目斜。手足抽搐。此肝經血耗生風。余用六味丸料一劑。諸症悉退。但食少晡熱。佐以四君、柴胡、牡丹皮而愈。

固經丸

艾葉

赤石脂煨

補骨脂炒

木賊各半

附子炮一箇

右爲末。飯丸。桐子大。每服二十九。溫酒或米飲下。

芎藭湯

芎藭

當歸

芍藥各等分

右每服五錢。水煎。

附方

失笑散方見二十卷第五論

十全大補湯

加味逍遙散

加味歸脾湯方見二十四卷第四論

六君子湯

四君子湯方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

產後月水不調方論第八

產後月水不調。由血氣虛損。風邪所客。邪正相搏。以致經候失期。或多或少。而不得其平也。

愚按前症或過期而作痛者。氣血俱虛也。八珍加柴胡、丹皮。不及期而來。血熱也。四物、山梔、柴胡。將來而作痛。血實也。四物加桃仁、紅花。過期而來者。血虛也。四物加參、朮。紫黑成塊者。血熱也。四物加炒梔、炒連、丹皮。作痛而色淡者。痰多也。四物合二陳。治當臨症制宜。

附治驗

一產婦月經不調。內熱燥渴。服寒涼之劑。其血如崩。腹脹寒熱。作嘔少食。用六君子二十餘劑。諸病悉愈。以加味逍遙散調理而安。

琥珀散

治經脈不調。飲食少思。日漸消瘦。

琥珀

牛膝

生地黃

當歸

各半

桃仁

赤芍藥

各半

右每服五錢。水薑服。

附方

八珍湯

加味道遙散二方見二十四卷第四論四物湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

二陳湯

二方見二十四卷第五論

產後月水不通方論第九

產後乳子周歲而經不行。是其常也。若半歲而經行。此血有餘也。若一二歲不行而無疾。不必服藥。若肢體倦怠。食少內熱。是血少也。宜健脾胃。若以藥通之。則誤矣。

愚按。前症脾胃虛弱。用六君子湯。若兼鬱火傷脾。用歸脾湯。加丹皮、山梔。若怒火傷血。宜用四物合小柴胡。氣血俱虛。用八珍、牡丹皮。仍參前論主之。

附治驗方藥

一產婦月經年餘不通。內熱晡熱。服分氣丸。經行不止。惡寒作渴。食少倦怠。胸滿氣壅。朝用加味逍遙散。夕用四君子湯。月許。諸症稍愈。佐以八珍湯。兼服兩月。

而愈。

六君子湯

四物湯

四君子湯三方見二十卷第六論

歸脾湯

加味逍遙散

八珍湯三方見二十四卷第四論

小柴胡湯方見二十四卷第二論

產後四肢浮腫方論第十

產後四肢浮腫者。乃敗血乘虛流注。宜用小調經散。陳無擇云。若風邪所乘於氣分。皮膚腫而浮虛。乃氣也。若皮膚腫如熟李。乃水也。蓋氣腫者。宜發汗。水腫者。宜利小便。

愚按前症若寒水侮土。傷損脾肺。若氣虛浮腫。宜益脾胃。若水氣浮腫。宜補中氣。當參第一卷水分血分主治。

附治驗

一產婦飲食少思。服消導之劑。四肢浮腫。余謂中氣不足。朝用補中益氣湯。夕用六君子湯而愈。後因怒腹脹。誤服沉香化氣丸。泄瀉不止。飲食不進。小便不利。

肚腹四肢浮腫。用金匱加減腎氣丸而愈。

一產婦泄瀉。四肢面目浮腫。喘促惡寒。余謂脾肺虛寒。用六君子、薑、桂而泄瀉愈。又補中益氣而脾胃健。

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸各一錢

右爲末。每服半錢。薑汁溫酒調。

大調經散。最治腫滿喘急煩渴。小便不利。方見二十一卷第一論

漢防己散 治水腫

漢防己

猪苓

枳殼剉炒

桑白皮各一兩

商陸

甘草各三錢

右每服四錢。水煎。

治血虛氣腫水腫。

澤蘭葉

防己等分

右爲末。每服二錢。溫酒調下。醋湯亦可。

金匱加減腎氣丸。治脾腎虛寒。腰重脚腫。濕飲留積。小便不利。或肚腹腫脹。四肢浮腫。氣喘痰甚。或已成水症。其效如神。

白茯苓三兩

附子半兩

肉桂

川牛膝

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹各一兩

熟地黄四兩搗碎
酒拌杵膏

右爲末。和地黃膏。煉蜜丸。桐子大。每服七八十丸。空心米飲下。

附方

補中益氣湯

六君子湯二方見二十
四卷第六論

產後腹痛瀉利方論第十一

產後腹痛瀉利。因腸胃虛怯。寒邪乘襲。或水穀不化。洞泄腸鳴。兼手足逆冷。用補中湯治之。陳無擇云。若六淫七情而致者。當因所感而治之。愚按。前症若胸膈飽脹。或惡食吞酸。此飲食停滯。用六君。枳實。山楂以消導。若

食既消而仍痛。更或頭痛熱渴。惡寒欲嘔。此中氣被傷。用補中益氣。半夏、茯苓。以健脾胃。

附治驗

一產婦腹痛發熱惡食。余以爲飲食傷脾。彼反服破血之劑。加寒熱頭痛。嘔吐涎沫。用化痰理氣。四肢逆冷。泄瀉下墜。余用六君加炮薑、肉桂、木香。再用補中益氣湯而愈。

一產婦腹痛後重。去痢無度。形體倦怠。飲食不甘。脣腫盜汗。竟夜不寐。此脾經虛熱之症。用當歸六黃湯。內黃芩、連柏炒黑。一劑汗止。乃用歸脾八珍。兼服而愈。

調中湯

良姜

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎

各一兩

甘草

炒五錢

右每服三錢。水煎服。

附方

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十卷第六論
當歸六黃丸
方見十九卷第六論