

沈氏尊生
書附錄之
尤氏喉科

在
日
架
病
源
流
年
燭
西
方
二
十
四
卷
末



沈氏
尊生

尤氏
喉科

尤氏喉科秘傳

轉錄沈氏尊生書

喉症一二日腫痛。三四日勢定。

有形。每至三日必發寒熱。或形

痛。刻刻吹藥。總不可緩。方有

生机。喉痺者總名。屬風屬疫屬

熱。皆因火鬱而兼熱毒。致生乳

蛾等症。大要去風疫。解毒。其

症自愈。

單乳蛾：多因酒名熱鬱結而生。其症生

喉旁。初起一日痛。二日紅腫。三

日有形。如仰白星。發寒熱者凶。
四日凶勢定。大約四五日可愈。吹
青菜五分黃芩一分。以黃二青三同
吹出疫。兼服煎劑。宜喉症俟大便走
後。症自痊矣。如至三日。喉中但
紅腫而無白星。即為喉癰。宜辨
。

双

乳蛾：細白星左右俱有。藥照前用

。左房心右房肝。煎藥于主牙肉。
左宜加黃連犀角。右宜加赤芍柴胡

。双蛾則兼用之。大便閉加枳壳元明粉。

連珠蛾：二白星上下相連。又或狀如纏袋。用茶煎前。單蛾輕。双蛾重。連珠蛾更重。

喉癰：過食辛辣，燂唇，味醇酒，感熱而發。屬肺。無形狀。止紅腫而痛。

重者，不發寒熱頭痛。四五日可愈。

用青葙加黃芩少許。內服藥。宜膠子蜜。

調藥喉症主方

喉癰；為虛火上炎。肺金大旺。致攻
咽喉。生肌如哥蜜攸。如秋海棠
叶背攸。飲食阻梗。咽痛。雖不喪
命。不能速愈。用青茶頻吹。不時
嚙膠子菜。再服主藥。加土貝母
下元。須戒憂思怒憤酒色。忌一
切鮮食物及劫火之物。用茶醫治。
一月可愈。若不守戒。不忌口。用
茶遲延。必至症重難愈。久則聲啞
。而肺金受傷。不治。

喉菌：屬毒鬱血熱之滯。如人多患之。
• 狀如浮萍略高。面唇紫色。生喉
旁。初起用青九黃一。沒黃二青三。
• 內服主方。不可間斷。亦難速效。
• 輕則半月或二十日可愈。重則經
月或月餘。治之得法可愈。亦須守
戒忌口。

搗舌喉癰：凡肥人感熱性躁者多患此。
• 煎桑犀角地黃湯加減。吹用黃芩
• 但此須吹舌根下兩旁。時刻難間。

。方能速癒。喉內用青十黃一。亦須勤吹。凡舌下生如小舌樣者為撻舌。連喉腫痛。即為喉癰。喉不痛者非癰也。大抵撻舌兼喉癰而潰者。十有六七。其勢凶。

喉閉：傷寒後發。難治。為氣閉不通。無形無聲。

喉痹：曰纏者。目頤爛擾。赤色寒熱。心中躁急而潰。先兩日必胸膈氣緊。出氣短促。忽然咽喉腫痛。

手足厥冷。頸如絞轉。熱結于內。
腫擾於外。且麻且痒。喉內紅且澀。
緊。手指甲白色。手心壯熱。喉腫
而大。風疫壅盛如鋸是也。最為急
症。初起一日即用藥頻吹。更服藥
猶可治。若過一日。目直視。喉
中雷鳴者。不治。灯火近口即吹滅
者不治。若喘急額汗。危在旦夕矣。
偏下藥俱加半黃。

已上諸症。十難一生。不

可輕視。傷寒以患連珠蛾
及喉閉者。不治。其症項
硬。強。目睛上視。故多不
治也。

凡喉症非急者。一二日未必發寒熱。
症尚輕緩。至第三日必寒熱。症必
加重。須審二便通閉。如通症亦可
減。不過。浮游之火。上攻咽喉。
宜服清風清熱降火解毒藥。即愈。
若二便閉。乃內有實火。非用降火

解毒重利及通二便之菜。火从何滅。
病从何解。頭痛不痛。亦要問。

凡治喉症。必吹菜四五管。方可出度。
必出度三四次。可以全愈。初一
管必用黃菜多為要。宜對喉重口一
吹。急提出管。恐痰即欲嘔出故也。
餘俱輕口吹之。

凡喉症。先碎者。須先用羊肉菜吹之。
後用青菜。

凡出度。不但黃菜多用。須單用青菜。

吹入喉中。方能鉤出頑痰。初起一二日用青茶。漸多加黃茶。勢甚者。黃茶為君。或單用青茶。

凡喉症。必大便去后。方可望痊。如閉結。不可輕許其痊。凡喉症至度者。不治。

凡喉閉多因先患勞病重症。既久。虛火上升。柔血已竭。喉之上腭有紅點。如蚊蟲咬斑。此係危篤將殂。斷不可治。

凡喉連胸紅腫。此係肺癰之症。必用
蜜調藥。加百藥煎為要。

凡喉症初起。大便秘。宜大黃元明粉
下之。則火自降而易痊。若五七日
以不食而大便秘。用大黃元明粉。
以立斃。蓋以病後胃虛。元氣已弱
。故禁用此二藥。雖閉甚只宜蜜導
法。此秘訣也。

凡吹藥。不但患處要吹。并四圍好肉
上也要吹。方不延用。且易愈。

凡吹喉內藥。須用氣和平。用管周圍吹之為妙。

凡用青藥。看凶症。冰片多于甘草。將愈。甘草多于冰片。

凡藥入瓶須捺實。及用時。須將管散後。後。毋忽畧也。

青藥方

煉硫

牙硝各三

百草霜

硼砂各五

舊藥末下

灯草灰

冰片各下

煉硫法

明硫研細。

入傾銀管罐內。

小半罐。

將罐入爐。

用

稻炭火煨。

以銅篦針入底攪之。

至硫化為度。

即將

研田白礪砂投下 入礪內 亦十分之三 少頃由投入生礪末

逐漸投下 俟礪輝盡 並前投礪砂少許 如是逐漸逐層

投定為 直待礪鋪出罐內 高如覆頭而止 須加炭火

燒至礪枯干 然後用瓦片一大塊 覆罐上 一時取起 將牛黃

少許為細末 用水五六匙調和 以匙點滴礪內 將罐仍入

火內烘干 即取起 連罐覆合 沽淨地上 地上用低觀罐子

罐上再用碗覆之 過七日收貯 須煖礪至輕鬆之堅立反者

佳 如堅實有堅反印不堪用 煖時火候 初起並煖 亦不

可太煖 必礪強定 不易鑄化 至有堅反 中后須用

武火 若礪末輝盡 印投稍翻 亦不終鑄化 改有堅反

凡銀罐須要生者 先用炭火烘干 然後入礪 不改炮碎

亦不可放濕炭上烘 俟濕透入罐 經火亦必改炮碎矣

煖灯草法 擇肥白灯草一把 鋪淨桌上 清水噴濕 候

五灯心內潮濕為度 將筆套一個要定固不碎 兩頭有舊

相勻用水潮濕內 以濕紅低團 塞緊一頭 即將濕灯草

揲入管內 以竹筒打尖 傾去水 塞滿皮 再以濕低團塞

口 入楊炭火煖之 烟片為度 取出放淨磚地上 洗以水預

先噴濕地上 碗蓋之 待乾 剥去筆毫灰及低灰 拆

開灯草灰 須黑色成团者佳 煨時勿使筆毫炮碎

碎則無用 不可煨過性 过刻灰無用 又不可煨生

生刻灰不成 此藥最輕 煨時難(拉)得法 須平日

多製以備急用

取百草霜法 即鍋底灰也 燒茅柴者佳 須取近

鍋脐者可用 若鍋底心鍋口边者俱不用 先輕刮去

上面二層

配藥法配成印碧丹 每煉硫不加百草霜半匙研細

次入灯草灰一匙研勻如瓦灰色 面入甘草末三匙 膏

首荷末下研 面入上好冰片半分 多加尤妙研勻細

入磁瓶紙塞緊口 勿令出氣 用時以烏金紙包 此藥須

時用時配 若合过五日即不效 五日内遇陰雨亦不效

也 不

得草率

如吹喉症。欲出疫。加猪牙皂角末少许。

惟喉癰及單蛾輕症。單用青葉即效。
若遇重症。須兼黃葉用之。若二葉兼
用。前以多少。最為要訣。凡初起。
用青葉九分。配黃葉一分。吹過五管。
。次用青八黃二。再次用青七黃三。
如症重。青黃對半用。用到三五次。
痰涎必不壅。然後用黃六青四。將管
直對喉中。重吹一次。立刻收管。即
吊出痰。此要訣也。若症重甚。用黃
八青二尤妙。