

全国中等卫生学校教材
复习用书

外科学测试题 精选

主编：周家梁
主审：姜寿葆 陈文治
吴杰伟 沈明庆

全国中等卫生学校教材复习用书

外 科 学 测 试 题 精 选

主 编 周家梁

主 审 姜寿葆 陈文治 吴杰伟 沈明庆

编 者 沈筱靖 邢瑞元 盛瑞璋 李维邦

袁广鳌 杨通河 钱金方 倪克梁

任光圆 李银凤 刘根花 李春芳

杨松祥 刘 平 钱植民 周建生

周溢彪 章水根 吴海林 倪国华

编 者 的 话

考试这一重要的教学手段近几年来有了较大的改革与发展。多选题作为一种新型教学测量手段,已被我国医药院校广泛接受使用。目前国内各省市的理论统考多采用包括多选题在内的多类型试题。学生在平时和应试前的复习,确也需要有一本具有指导性的复习测试题。因此我们力图从各有关学校的试题库中和各有关省市的统考题中精选出这集多类型试题。其精选的原则是学生必须掌握和熟悉的基本概念,富有思考性,有助于学生记忆和思维。尽量组合一些前后连贯而又有启发性内容的试题。学生通过复习和自我测试,求得真正理解并牢固掌握书本知识。

本书根据医士(社会医学)专业《外科学》和护理专业《外科学及护理》新教学大纲规定的单元目标和再版教教材,对本书作了进一步整理和充实,精选试题增达1020道。试题类型有判断题、单项选择题、双项选择题、填空题、名词解释、简单问答题、病例分析和护理要点,并附有参考答案。本书特附有不同专业的标准试卷和试卷答案。

本书可供护士、医士、助产士等专业学生使用。

由于编者水平所限,错误之处在所难免,万望广大师生不吝指正,俾使本书日趋完善。

编 者

1995·1

主要参考书

《外科学及护理思考题解》 姜寿葆、周家梁主编

浙江科技出版社1988·7·

目 录

1. 判断题(1~170题).....()
2. 单项选择题(1~260题).....()
3. 双项选择题(1~260题).....()
4. 填空题(1~160题).....()
5. 名词解释和参考答案(1~100题).....()
6. 简答题(1~60题).....()
7. 病例分析和护理要点(1~10题).....()
8. 判断题参考答案.....()
9. 单项选择题参考答案.....()
10. 双项选择题参考答案.....()
11. 填空题参考答案.....()
12. 关于制订外科病例护理要点的基本要求.....()
13. 典型病例(五)参考答案.....()
14. ××省中等卫生学校一九××年毕业合格考护士
专业外科学及护理试卷(附: 试题分析).....()
15. ××省中等卫生学校一九××年毕业合格考医士
专业外科学试卷(附: 试题分析).....()

1 判 断 题

- () 1. 1 : 1000新洁尔灭溶液可用作膀胱镜消毒。
- () 2. 过氧乙酸可杀灭细菌和病毒,但对芽胞无效。
- () 3. 有钩直血管钳主要用于钳夹较厚易滑脱的组织。
- () 4. 调整泡手用酒精浓度时,加入的是95%酒精。
- () 5. 非挥发性酸和过剩的碳酸氢盐都必须经肾排出。
- () 6. 体内氯离子减少时,碳酸氢根离子代偿性增多。
- () 7. 影响抗利尿激素分泌的主要因素是血容量,而影响醛固酮分泌的主要因素是渗透压。
- () 8. 低钾血症和高钾血症临床上都可表现为软瘫。
- () 9. 低血钾可导致碱中毒,查尿液PH值增高。
- () 10. 高渗性脱水ADH分泌增多,可出现少尿及尿比重增高。
- () 11. 低渗性脱水早期尿量不减,而后期尿量减少。
- () 12. 血钠低于130mmol/L,并非都是低渗性脱水。
- () 13. “先盐后糖”是适用于任何情况下输液都必须遵循的原则。
- () 14. 术前焦虑症状突出者,可用多虑平等抗焦虑药。
- () 15. 酸中毒病人的尿呈酸性,碱中毒病人的尿均呈碱性。
- () 16. 酸中毒纠正后要警惕低血钾与低血钙。
- () 17. 代谢性硷中毒患者往往并发低血钾。
- () 18. 代谢性酸中毒 BE(剩余硷)小于-3。

- ()19. 碱中毒时因钾离子排出减少会引起高血钾。
- ()20. 低分子右旋糖酐主要不是用于扩充血容量。
- ()21. 葡萄糖浓度越高, 静脉滴注速度越快, 利尿作用愈强, 但机体利用率却降低。
- ()22. 引起有效循环血量锐减的因素都是休克的原因。
- ()23. 毛细血管静脉端对缺氧与酸中毒耐受性较高, 故在微循环扩张期仍处于收缩状态。
- ()24. 休克必然出现酸中毒。
- ()25. 休克代偿期病人, 允许在腰麻下行下腹部手术。
- ()26. 扩充血容量是抗休克措施中最基本的一项措施。
- ()27. 某休克病人, 测 CVP $5\text{cmH}_2\text{O}$ (0.49kPa), 血压 $80/60\text{mmHg}$ ($10.6/8\text{kPa}$), 应充分补液。
- ()28. 某休克患者, 扩容后测心率在 122 次/分, 此时应及时使用异丙基肾上腺素。
- ()29. 预防感染性休克患者发生休克肺, 应给予持续纯氧吸入。
- ()30. 休克患者, 测 CVP 偏高, 疑为休克肺, 应及时使用扩血管剂。
- ()31. 小儿感染性休克常在典型症状尚未出现时已迅速恶化, 危及生命。
- ()32. 对 DIC 后期出血病人, 宜用止血剂治疗。
- ()33. 急性肾衰早期少尿或无尿, 尿比重高而固定。
- ()34. 为急性肾衰病人纠正酸中毒, 使用碳酸氢钠前, 需静脉注射葡萄糖酸钙。
- ()35. 巴比妥类药物可作为各种麻醉的麻醉前用药。
- ()36. 术前肌注阿托品可预防腰麻引起的血压下降或

心动过缓。

- () 37. 苯巴比妥钠和安定均可减少局麻药毒性反应。
- () 38. 某男, 68岁, 背部脂肪瘤切除术, 采用普鲁卡因局麻, 为延长麻醉时间宜加少许肾上腺素。
- () 39. 普鲁卡因皮试阳性, 可考虑改用利多卡因。
- () 40. 硬脊膜外腔麻醉注入试探剂量药液后出现下肢发热和双腿麻木, 提示误注入蛛网膜下腔。
- () 41. 腰椎麻醉时血压下降, 可静注或肌注麻黄碱 15 mg。
- () 42. 骶管麻醉属硬膜外麻醉。
- () 43. 气管内全麻比硬膜外麻醉更为安全。
- () 44. 初期复苏自主呼吸未恢复前, 用呼吸兴奋剂会加速呼吸中枢衰竭。
- () 45. 脑复苏病人眼球开始活动, 可视为中脑功能开始恢复的先兆。
- () 46. 人工冬眠复温, 应先停降温辅助药后撤除冰袋。
- () 47. 肛门会阴部术后出现尿潴留, 应予立即导尿。
- () 48. 手术切口感染, 为避免裂开应推迟拆线时间。
- () 49. 严重腹胀会诱发肺部并发症和下肢静脉栓塞。
- () 50. 术后发生血栓性静脉炎, 应予以热敷和按摩。
- () 51. 二重感染是指二种以上细菌的混合感染。
- () 52. 破伤风实际上是一种毒血症。
- () 53. 丹毒、破伤风、绿脓杆菌感染者均需接触隔离。
- () 54. 寒性脓肿一旦形成, 应予立即切开引流。
- () 55. 对疑为全身化脓性感染病人作血培养, 最好采血时机是在寒战时。

- ()56. 杀菌类抗生素分次静脉注射治疗感染的效果比静脉滴注为好。
- ()57. 治疗破伤风的最重要环节是注射破伤风抗毒素。
- ()58. 大面积烧伤急救时,创面不需要涂任何药物。
- ()59. 小儿手和前臂Ⅱ度烧伤,应按大面积烧伤救治。
- ()60. 成人一侧上肢及一侧小腿Ⅱ°烧伤属大面积烧伤。
- ()61. 大面积烧伤和肠梗阻均可引起第三间隙积液。
- ()62. 烧伤休克宜用低分子右旋糖酐扩容。
- ()63. 治疗烧伤的关键是创面的处理。
- ()64. 酸、碱和磷烧伤均可先用冷水冲洗创面。
- ()65. 干石灰烧伤的首项急救措施是用清水冲洗。
- ()66. 烧伤创面有黑色出血性坏死斑,是大肠杆菌感染的危险征象。
- ()67. 毒蛇咬伤后8小时尚未排尿时,首先应考虑急性器质性肾衰。
- ()68. 毒蛇咬伤后应抬高伤肢可减轻肿胀和疼痛。
- ()69. 毒蛇咬伤时宜大量、快速输液以稀释蛇毒。
- ()70. 绿脓杆菌感染创面,应采用暴露疗法。
- ()71. 包扎腹带时,创口在上腹部者应自上而下包扎。
- ()72. 腮腺混合瘤属临界性肿瘤。
- ()73. 氮芥等抗癌药溢出血管外时,应即予热敷,促进外渗药液吸收消散。
- ()74. 肿瘤化疗完毕注射器应在保持轻度负压条件下拔除。
- ()75. 肿瘤放疗局部皮肤需经常用70%酒精消毒以防感染。

- () 76. 甲状腺腺瘤可继发甲亢但无恶变可能。
- () 77. BMR测定必须在安静、空腹时进行。
- () 78. 任何部位的乳房脓肿切开时均应作放射状切口。
- () 79. 乳房囊性增生病、乳管内乳头状瘤和乳癌 均 可 见乳头溢液。
- () 80. 乳癌临床分期为 $T_2N_1M_1$ 者可行根治术。
- () 81. 乳癌根治术后病人手臂不能上举可能损伤了胸背神经。
- () 82. 绝经前的晚期乳癌病人宜用雌激素治疗。
- () 83. 肠系膜血栓形成属绞窄性肠梗阻。
- () 84. 嵌顿疝行手法复位后应注意观察有无腹膜 刺 激 征。
- () 85. 福开森法疝修补术是加强腹后壁。
- () 86. 腹腔内有原发病灶的腹膜炎称原发性腹 膜 炎。
- () 87. 腹腔内脏损伤早期诊断腹腔灌洗比腹腔 穿 刺 更 准确有效。
- () 88. 腹腔内穿刺即使少量不凝固血, 即可诊 断 为 腹 内 脏 器 破 裂 出 血。
- () 89. 腹膜炎的腹膜刺激征最明显处通常为原 发 病 灶 所在部位。
- () 90. 空腔脏器穿孔多有膈下游离气体, 故阑尾 穿 孔 时 也 可 见 到 膈 下 游 离 气 体。
- () 91. 肝破裂表现为兼具内出血征和腹膜炎体征。
- () 92. 用胃管或M—A管施胃肠吸引, 一俟停止胃肠减 压 均 应 即 时 拔 管。
- () 93. 各种原因引起的幽门梗阻均伴有低氯低 钾 代 谢

性硷中毒。

- ()94. 胃迷走神经切断术主要用于治疗十二指肠溃疡而不是胃溃疡。
- ()95. 绝大多数胃溃疡急性大出血者需行手术止血。
- ()96. 幽门梗阻病人的血钙值常下降。
- ()97. 阑尾腔梗阻是导致阑尾炎发病的最重要因素。
- ()98. 小儿、老人、孕妇急性阑尾炎都以手术为宜。
- ()99. 老年人阑尾炎其病变与临床表现常不相符。
- ()100. 空气灌肠既可诊断又可治疗原发性肠套叠。
- ()101. 肠梗阻患者胃肠减压排气、排液的目的是减少腹胀与毒素吸收。
- ()102. 绞窄性肠梗阻和麻痹性肠梗阻均可表现肠鸣音减弱或消失。
- ()103. 先天性巨结肠病变并不在巨大结肠本身的肠壁。
- ()104. 前哨痔并不具备痔的病理特点。
- ()105. 仅切断外括约肌皮下部不会引起肛门失禁。
- ()106. 肛周脓肿常继发于肛裂感染。
- ()107. 截后位7点处属母痔所在位置。
- ()108. 如已决定做肛门镜、直肠镜检查,就不必再做肛门直肠指检。
- ()109. 门腔静脉吻合术后易发生肝性脑病。
- ()110. 静脉胆道造影时,需备好高脂餐。
- ()111. 胆囊炎胆石症诊断首选B型超声检查而不是口服胆囊造影。
- ()112. 胆色素结石多与胆道感染有关。

- ()113. 肝胆外科病人常因凝血酶原减少而影响凝血，应予术前口服足量维生素K。
- ()114. 放置“T”管引流后黄疸逐日减退，说明胆总管下端已基本通畅。
- ()115. 对急腹症病人，若诊断明确，治疗方案确定后可用镇静止痛剂。
- ()116. 血栓闭塞性脉管炎剧痛时，允许适当使用吗啡止痛剂。
- ()117. 颅后窝骨折属闭合性骨折。
- ()118. 诊断颅底骨折主要依据是X线发现。
- ()119. 头部损伤出现脑脊液耳漏者提示颅前窝骨折。
- ()120. 颅底骨折伴脑脊液漏者，需作腰穿送脑脊液常规检查。
- ()121. 脑震荡属于最轻的脑器质性损伤。
- ()122. 瞳孔大小变化对颅内血肿具有定侧意义。
- ()123. 处理脑挫裂伤便秘时，禁忌大量液体灌肠。
- ()124. 治疗脑水肿，不宜单独使用50%葡萄糖溶液。
- ()125. 颅底骨折和无休克重症脑损伤者应取头高位。
- ()126. 不能进食的颅脑损伤病人，24小时补液总量不应超过2000毫升。
- ()127. 颅内血肿必定出现中间清醒期。
- ()128. 脑室引流瓶应挂在床沿离头部10—15cm处。
- ()129. 正常胸膜腔内压力是负压，吸气时大于呼气时。
- ()130. 多肋多处骨折和慢性脓胸施胸改术后均会发生反常呼吸运动。
- ()131. 多肋多处骨折和开放性气胸均可发生纵隔摆动。

动。

- ()132. 开放性气胸时纵隔向患侧偏移。
- ()133. 不论哪种损伤性气胸，纵隔都向健侧移位。
- ()134. 凡是气胸均有伤侧肺萎陷。
- ()135. 肺萎陷未及20%的闭合性气胸，毋需特殊处理。
- ()136. 外伤性血胸穿刺液必定为不凝固血。
- ()137. 胸腔手术后常规放置胸腔闭式引流管。
- ()138. 胸腔闭式引流时，水封瓶长管内水柱无波动，常说明肺已复张。
- ()139. 胸腔闭式引流受阻时，禁用无菌等渗盐水冲洗。
- ()140. 一侧肺萎陷和另一侧肺正常者，对气体交换的影响要比一侧肺切除和另一侧肺正常者为大。
- ()141. 食管手术后应严格禁食，但不必严格禁水。
- ()142. 食道癌术后2—3天一旦胸蠕动恢复，即应拔除胃肠减压管，并进少量流汁。
- ()143. 急性膀胱炎常借膀胱镜检查来明确诊断。
- ()144. 尿三杯试验第一杯有变化表示病变在前尿道。
- ()145. 尿道损伤拔除导尿管后应每周扩张尿道一次，共持续三个月。
- ()146. 12.5%碘化钠不能作静脉肾盂造影。
- ()147. 尿道损伤出现下腹壁和会阴部尿外渗者，为后尿道损伤。
- ()148. 尿道球部损伤时尿外渗可达膀胱周围。
- ()149. 骨盆骨折常可合并尿道球部断裂伤。
- ()150. 右肾手术安置左侧卧位，应将病人左下肢伸直、右下肢屈曲。

- ()151. 前列腺增生症最早的症状是排尿不畅。
- ()152. 前列腺增生，致尿潴留者应试行导尿术。
- ()153. 无痛性间歇血尿为泌尿系肿瘤的典型表现之一。
- ()154. 如拔除气囊导尿管后仍有前列腺窝出血，可考虑再次插入。
- ()155. 拔除肾盂造口导管后，宜取患侧卧位。
- ()156. 肾盂造口管应每日作常规冲洗。
- ()157. 任何骨折，复位后均应立即固定在功能位。
- ()158. 下肢骨牵引时，需抬高床尾15~30cm，其目的是促进下肢静脉回流。
- ()159. 为骨折病人施牵引时，其目的既是为了复位，也是为了固定。
- ()160. 包石膏管型时，其方向应从肢体的近侧向远侧。
- ()161. 股骨颈骨折和股骨干骨折患肢均呈外旋畸形。
- ()162. 肩关节脱位时，上臂固定于内收内旋位。
- ()163. 髋关节脱位复位后3个月，才能下床负重活动。
- ()164. 化脓性骨髓炎X线摄片两周内就可见骨皮质散在虫蛀样破坏。
- ()165. 急性骨髓炎诊断明确后应及时使用抗菌药物，并尽早手术引流。
- ()166. 腰椎结核可形成髂窝部塞性脓肿。
- ()167. 胸腔引流管，T字引流管，脑室引流管及各类泌尿引流管拔管前均应作夹管试验。
- ()168. 任何原因引起的脑缺氧均可导致脑水肿，故多用人工冬眠与头部降温以降低氧耗量。

()169. 静脉胆道造影、B超和CT检查前均需禁食、禁水。

()170. 直肠指检对肠梗阻、直肠癌和胃癌均有诊断意义。

2 单 项 选 择 题

(每题1分。在四个备选答案中选出一个正确答案, 将答案标号填入括号内)

1. 指出下列哪项属污染手术?()
A. 乳房纤维腺瘤摘除术 B. 肠切除吻合术
C. 疝修补术 D. 骨髓炎开放引流术
2. 能使细菌蛋白凝固变性的化学药物是.....()
A. 过氧化氢 B. 新洁尔灭
C. 漂白粉 D. 酒精
3. 手术刀剪常用的消毒方法是:()
A. 煮沸法 B. 烧灼法
C. 高压蒸汽灭菌法 D. 器械液浸泡法
4. 巡回护士与手术护士应配合的工作有:()
A. 安置病人体位 B. 术中观察病情 C. 术中传递器械物品 D. 清点器械、敷料、缝针、线圈
5. 感染手术后需接台, 以下处理哪项正确? ...()
A. 术后先脱手套后脱衣 B. 脱去手套后即在酒精筒内浸泡 C. 流水清洗后酒精浸泡10分钟 D. 必须重新刷手和酒精浸泡
6. 食管贲门癌切除术应安置:()
A. 仰卧位 B. 颈仰卧位
C. 侧卧45° D. 侧卧90°
7. 水、电解质平衡的调节主要是通过:()

- A. 血液缓冲系统 B. 肺
C. 肾 D. 肾上腺

8. 高渗性脱水时, 应首先补充: ()

- A. 等渗盐水 B. 5% 葡萄糖
C. 平衡液 D. 右旋糖酐

9. 等渗性脱水伴酸中毒病人, 在补充等渗盐水和碱性溶液, 纠正脱水、酸中毒后需注意可能发生: ()

- A. 低钠 B. 低镁 C. 低钾 D. 低氯

10. 低渗性脱水早期症状可有: ()

- A. 口渴、尿少、尿比重低
B. 口渴、尿少、尿比重高
C. 口不渴、尿不少、尿比重低
D. 口不渴、尿少、尿比重低

11. 成人患者, 高热昏迷三天不能进水, 尿比重高, 应先静滴: ()

- A. 5% 葡萄糖盐水 B. 林格液
C. 右旋糖酐 D. 5% 葡萄糖液

12. 下列何种情况应迅速输液: ()

- A. CVP0.49kPa BP9.3/6.7kPa 尿少
B. CVP1.47kPa BP12.8/9.3kPa 尿少
C. CVP1.47kPa BP9.3/6.7kPa 尿少
D. CVP0.98kPa BP9.3/6.7kPa 尿少

13. 计算补液量时下列哪种情况应将内生水(代谢水)计算入内: ()

- A. 休克早期 B. 急性肾衰
C. 肠梗阻 D. 大面积烧伤

14. 某病人体重50kg, 体温持续39℃, 晚间用退热药后大汗淋漓, 渗湿一身衬衣裤, 估计以上两项额外失水约……………()

- A. 400ml B. 850ml
C. 1000ml D. 1400ml

15. 5% 葡萄糖液滴入最快速度是: ……………()

- A. 75滴/分 B. 100滴/分
C. 120滴/分 D. 150滴/分

16. 哪一种液体的渗透压和离子浓度更接近于血浆及组织间液: ……………()

- A. 等渗盐水 B. 平衡液
C. 5%葡萄糖 D. 右旋糖酐

17. 下列哪项不是低钾血症的原因: ……………()

- A. 长期不能进食 B. 碱中毒 C. 大量输入葡萄糖和胰岛素
D. 长期服用安体舒通利尿

8. 补钾前首先应考虑到病人的……………()

- A. 心功能 B. 肾功能
C. 肝功能 D. 肺功能

19. 静脉补钾时常用准许浓度为: ……………()

- A. 10%氯化钾5ml + 5%葡萄糖500ml
B. 10%氯化钾10ml + 5%葡萄糖500ml
C. 10%氯化钾15ml + 5%葡萄糖500ml
D. 10%氯化钾20ml + 5%葡萄糖500ml

20. 抢救高血钾症时, 下列哪项措施是错误的? ()

- A. 10%葡萄糖酸钙静注 B. 林格液静滴
C. 5%碳酸氢钠静滴