



彩色图解



青少年必读经典

世界地理一本通

黎娜 编著



华文出版社

彩色图解



世界地理一本通

黎娜 编著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界地理一本通 / 黎娜编著. —北京: 华文出版社, 2009.9

ISBN 978-7-5075-2829-9

I. 世… II. 黎… III. 地理—世界—普及读物 IV. K91-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 161073 号

书 名: 世界地理一本通

标准书号: ISBN 978-7-5075-2829-9

作 者: 黎 娜 编著

责任编辑: 杜海泓

封面设计: 王明贵

文字编辑: 徐胜华 张荣华

美术编辑: 王静波

部分图片来自: www.quanjing.com & www.ICpress.cn

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbbs.com.cn>

电子信箱: hwcbbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-58815874

经 销: 新华书店

开本印刷: 三河市华新科达彩色印刷有限公司

720mm × 1010mm 1/16 开本 14 印张 165 千字

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 16.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

目录


海洋

- 太平洋 2
- 大西洋 6
- 印度洋 9
- 北冰洋 13



欧洲

- 英国 18
- 荷兰 22
- 比利时 25
- 法国 28
- 葡萄牙 32
- 西班牙 36
- 意大利 40
- 瑞士 44
- 德国 47
- 丹麦 52
- 挪威 55
- 瑞典 58





俄罗斯 61

波兰 66

奥地利 69

匈牙利 72

希腊 75

美洲

加拿大 80

美国 83

墨西哥 87

危地马拉 90

洪都拉斯 92

巴拿马 94

古巴 96

哥伦比亚 98

厄瓜多尔 101


秘鲁 104

玻利维亚 107

巴西 110



智利 113

阿根廷 116



亚洲

日本	120
朝鲜	123
韩国	125
越南	128
泰国	130
新加坡	133
印度尼西亚	135
菲律宾	137
缅甸	139
印度	142
斯里兰卡	145
巴基斯坦	147
伊朗	150
沙特阿拉伯	152
乌兹别克斯坦	155
土耳其	158
叙利亚	161



非洲

- 埃及 164
- 利比亚 167
- 阿尔及利亚 169
- 突尼斯 171
- 摩洛哥 174
- 塞内加尔 176
- 尼日利亚 178
- 加纳 180
- 埃塞俄比亚 182
- 肯尼亚 184
- 刚果(金) 186
- 坦桑尼亚 188
- 莫桑比克 190
- 赞比亚 192
- 津巴布韦 194
- 南非 196




大洋洲

- 澳大利亚 200
- 巴布亚新几内亚 204
- 新西兰 206

南极洲

- 南极洲 210



海 洋


海洋平均深度为3795米,包括洋、海和海峡。洋是海洋的主体部分,有独自の潮汐和洋流系统,世界上有太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四大洋。海是海洋的边缘部分,没有独自の潮汐和洋流系统,面积较小,深度较浅,温度和盐度受大陆影响较大,海又分边缘海、内海和陆间海三种。海峡是两端连接海洋的狭窄水道。



太平洋

::概况


太平洋位于亚洲、大洋洲、南极洲和南、北美洲之间，南北长约15900千米，东西最大宽度约19900千米，面积17967.9万平方千米，占世界海洋总面积的49.8%，占地球总面积的35%。太平洋平均深度为4028米，最大深度为马里亚纳海沟，其西南角的查林杰深渊深达11034米，是目前已知世界海洋的最深点。太平洋是地球上四大洋中最大、最深和岛屿、珊瑚礁最多的海洋。太平洋上的岛屿众多，约有2万多个，总面积约440多万平方千米，占世界岛屿总面积的45%。其大陆岛主要分布在西部，如靠近亚洲的日本群岛、台湾岛、海南岛等，以及靠近澳大利亚南端的塔斯马尼亚岛、新西兰的南岛和北岛；中部有很多星散的海洋岛(火山岛、珊瑚岛)，著名的火山岛有马克萨斯群岛、夏威夷群岛等，著名的珊瑚岛有马绍尔群岛、瑙鲁



↑大堡礁位于澳大利亚昆士兰州以东，是世界上景色最美、规模最大的珊瑚礁群，每年都会吸引无数的游客。

岛等。

太平洋西南以塔斯马尼亚岛东南角至南极大陆的经线与印度洋分界，东南以通过南美洲最南端的合恩角的经线与大西洋分界，北经白令海峡与北冰洋连接，东经巴拿马运河和麦哲伦海峡、德雷克海峡沟通大西洋，西经马六甲海峡和巽他海峡通印度洋，总轮廓近似圆形。




太平洋通常以南、北回归线为界，分南、中、北太平洋；或以赤道为界，分南、北太平洋；也有以东经 160° 为界，分东、西太平洋的。北太平洋北回归线以北海域，地处北亚热带和北温带，主要属海有东海、黄海、日本海、鄂霍次克海和白令海。中太平洋位于南、北回归线之间，地处热带，主要属海有南海、爪哇海、珊瑚海、苏禄海、苏拉威西海、班达海等。南太平洋南回归线以南海域，地处南亚热带和南温带，主要属海有塔斯曼海、别林斯高晋海、罗斯海和阿蒙森海。

太平洋地区共有30多个国家：西岸有俄罗斯、中国、朝鲜、越南、日本等；东岸有智利、秘鲁、墨西哥、美国、加拿大等；南边还有澳大利亚、新西兰、萨摩亚、瑙鲁、汤加、斐济等。此外，还有十几个分属于美、英、法等国的殖民地。

::地理

海底地形可分中部深水区域、边缘浅水区域和大陆架三大部分。2000米以上的深海盆地约占总面积的87%，200~2000米之间的边缘部分约占7.4%，200米以内的大陆架约占5.6%。北半部有巨大海盆，西部有多条岛弧，岛弧外侧有深海沟。中部



深水域水深多超过5000米,夏威夷群岛和莱茵群岛将中部深水区分隔成东北太平洋海盆。边缘浅水域水深多在5000米以上,海盆地面积较小。

::大陆架

太平洋大陆架的总面积约为975万平方千米,占海底面积的5.4%。西部大陆架宽于东部,如白令海峡北部、渤海、黄海、东海、南海都有极为广阔的大陆架。

::气候

太平洋有很大一部分处在热带和副热带地区,故热带和副热带气候占优势,它的气候分布、地区差异主要是由于水面洋流及附近大陆上空的大气环流影响而产生的。南、北太平洋最低月平均气温从回归线向极地为 $20^{\circ}\text{C}\sim 16^{\circ}\text{C}$,中太平洋常年保持在 25°C 左右。太平洋年平均降水量一般为1000~2000毫米,多雨区可达3000~5000毫米,而降水量最小的地区不足100毫米。水面气温平均为 19.1°C ,赤道附近最高达 29°C 。北纬 40° 以南常有海雾。在靠近极圈的海面有结冰现象。


在寒暖流交接的过渡地带和西风带内,多狂风和波涛,太平洋北部以冬季为多,南部以夏季为多,尤以南、北纬 40° 附近为甚。中部较平静,终年利于航行。

::洋流

太平洋洋流大致以北纬 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 为界,分成南北两大环流。北部环流顺时针方向运行,由北赤道暖流、日本暖流、北太平洋暖流和加利福尼亚寒流组成;南部环


流逆时针方向运行,由阿拉斯加暖流、千岛寒流、南太平洋逆时针向环流、南赤道暖流、东澳大利亚暖流、西风漂流、秘鲁寒流组成。两大环流之间为赤道逆流,由西向东运行,流速每小时2000米。

↓太平洋丰富的资源孕育了各种大自然生命,海底的珊瑚奇观,成为潜水者最喜爱前往寻幽探秘的场所。



::自然资源

太平洋生长的动、植物,无论是浮游植物或海底植物以及鱼类和其他动物都比其他大洋



↑迷人的夏威夷风光吸引着世界各地的游客

夏威夷是太平洋中部的一组火山岛，马克·吐温曾经形象地称之为“世界所有大洋中停泊着的最可爱的岛屿舰队”。

鲸等)捕猎和捕蟹业也占重要地位。

近海大陆架的石油、天然气、煤很丰富，深海盆地有丰富的锰结核矿层，此外，海底砂锡矿、金红石、锆、铂金砂矿储量也很丰富。

大洋中有非常丰富的动力资源，如潮汐、波浪、海流、铀、重水等都可以用来发电。太平洋的潮汐多为不规则的半日潮，潮差大都2~3米，最大者达12.9米，是在鄂霍茨克海的舍列霍夫湾。浅海港湾、海峡潮汐的能量比远海更为可观。

:: 交通运输

太平洋在国际交通上具有重要意义。有许多联系亚洲、大洋洲、北美洲和南美洲的重要海、空航线经过太平洋；东部的巴拿马运河和西南部的马六甲海峡，分别是通往大西洋和印度洋的捷径和世界主要航道。海运航线主要有：东亚—北美西海岸航线，东亚—加勒比海、北美东海岸航线，东亚—南美航线，东亚沿海航线，东亚—澳大利亚、新西兰航线，澳大利亚、新西兰—北美东、西海岸航线等。太平洋沿岸有众多的港口，在亚洲的太平洋沿岸主要港口有上海、大连、天津、基隆、高雄、香港、仁川、釜山、海防、胡志明市、曼谷、新加坡、雅加达、苏门达腊、马尼拉、东京、横滨、大阪、神户、名古屋、北九州、海参崴等；在大洋洲太平洋岛屿中的主要港口有悉尼、惠灵顿、莫尔兹比港、努美阿、火奴鲁鲁(檀香山)等；在北美洲的太平洋沿岸主要港口有温哥华、旧金山、洛杉矶、巴拿马城；在南美洲太平洋沿岸的主要港口有瓜亚基尔、卡亚俄、阿里卡、瓦尔帕来索、塔尔卡等。

丰富。

太平洋浅海渔场面积约占世界各大洋浅海渔场总面积的1/2，海洋渔获量占世界渔获量的一半以上，秘鲁、日本、中国舟山群岛、美国及加拿大西北沿海都是世界著名渔场。盛产鲱、鳕、鲭、鳟、鲑、沙丁、金枪、比目等鱼类。此外，海兽(海豹、海象、海熊、海獭、

大西洋

::概况

大西洋位于欧、非与南、北美洲之间，南接南极洲。面积9336.3万平方千米，约占海洋面积的25.4%，为世界第二大洋。平均深度为3627米，最深处在波多黎各岛北方的波多黎各海沟中，深9219米。

大西洋南接南极洲；北以挪威最北端—冰岛—格陵兰岛南端—戴维斯海峡南边—拉布拉多半岛的伯韦尔港与北冰洋分界；西南以通过南美洲南端合恩角的经线同太平洋分界；东南以通过南非厄国勒斯角的经线同印度洋分界。大西洋东西狭窄，南北延长，略呈S形。


根据大西洋的风向、洋流、气温等情况，通常将北纬5°作为南、北大西洋的分界。大西洋在北半球的陆界比在南半球的陆界长得多，而且海岸曲折，有许多属海和海湾。

重要的属海和海湾有加勒比海、墨西哥湾、地中海、黑海、北海、波罗的海、比斯开湾、几内亚湾、哈得逊湾、巴芬湾、圣劳伦斯湾、威德尔海、马尾藻海等。

重要的岛屿和群岛有大不列颠岛、爱尔兰岛、冰岛、纽芬兰岛、古巴岛、伊斯帕尼奥拉岛及加勒比海—地中海中的许多群岛，格陵兰岛也有一小部分位于大西洋。

::地理

大西洋从水平轮廓上看，东西两岸弯曲的程度完全一样，如把东西两边靠拢合并起来，几乎可以完全吻合；从海底地貌看，大西洋的海底形态则非常复杂，最突出的是呈S形的中



央海岭,此外还有海底盆地、海底峡谷、海底山脉、岛弧、海沟和大陆架等不同的地形。

大西洋海底地形特点之一是大陆架面积较大,主要分布在欧洲和北美洲沿岸。超过2000米的深水域占80.2%,200~2000米之间的水域占11.1%,大陆架占8.7%,比太平洋、印度洋都大。其二是洋底中部有一条南北延伸约15000多千米的中大西洋海岭,整条海岭蜿蜒成S形,即大洋中脊。这条海岭北起冰岛向南



↑波罗的海沿岸重要港口城市——赫尔辛基

沿着大洋中部弯曲延伸一直到布维岛,一般宽度1500~2000千米,约占大西洋宽度的1/3。这条海岭把大西洋分隔成东西两个深水海盆。东海盆比西海盆浅,一般深度不超过6000米;西海盆较深,深海沟大都在西海盆内。在南半球,中大西洋海岭主体向东、向西还伸出许多山脊支脉,如伸向非洲西南海岸的沃尔维斯海岭(鲸海岭),伸向南美洲东海岸的里奥格兰德海丘。在中大西洋海岭的南端布韦岛以南为一片水深5000多米的地区,称大西洋—印度洋海盆。中大西洋海岭的北端,海底逐渐向上隆起,在格陵兰岛、冰岛、法罗群岛和设得兰群岛之间,海深不到600米。大西洋东部地区,特别在北半球的热带和亚热带,有许多水下浅滩。

::大陆架


大西洋中的大陆架总面积为620万平方千米,占大西洋总面积8.7%,小于太平洋而大于北冰洋和印度洋。洋中各部分的大陆架宽窄不一,从几十千米到上千千米不等。如几内亚湾沿岸、巴西高原东岸北段、伊比利亚西侧的大陆架都很狭窄,一般不过50千米,大陆架最宽阔的地方在不列颠群岛周围、北海和挪威海域,其最宽部分达1000千米以上,是世界海洋中大陆架最宽广的地区之一,另外从马尔维纳斯群岛附近到南美海岸的大陆架宽度也在1000千米左右。

::气候

大西洋的气候南北差别较大,东西两侧亦有差异。赤道地区温差不到1℃,亚热带纬区内为5℃,北纬和南纬60°地区为10℃,但大洋西北部 and 北极南部超过25℃。大西洋北部盛行东北信风,南部盛行东南信风。温带纬区地处寒暖流交接的过渡地带和西风带,风力最大。大西洋地区的降水量,高纬区为500~1000毫米,中纬区大部分为1000~1500毫米,亚热带和热带纬区从东往西为100~1000毫米以上,赤道地区超过2000毫米。

:: 洋流

大西洋的洋流南北各成一个环流系统：北部环流为顺时针方向运行，由北赤道暖流、安的列斯暖流、墨西哥湾暖流、加那利寒流组成，其中墨西哥湾暖流延长为北大西洋暖流，远入北冰洋；南部环流为逆时针方向运行，由南赤道暖流、巴西暖流、西风漂流和本格拉寒流组成。在两大环流之间有赤道逆流，赤道逆流由西向东至几内亚湾，称为几内亚暖流。



↑鹿特丹是荷兰的第二大城市，而鹿特丹海港则是闻名遐迩的世界第一大港口。

:: 自然资源

海洋资源丰富，西北部和东北部的纽芬兰和北海地区为主要渔场，盛产鲱、鳕、沙丁鱼、鲭、毛鳞鱼等，其他尚有牡蛎、贻贝、鳌虾、蟹类以及各种藻类等。南极大陆附近产鲸、海豹和磷虾，海兽捕获量也很大。

加勒比海、墨西哥湾、北海、几内亚湾和地中海均蕴藏有丰富的海底石油和天然气。

大西洋的锰结核矿主要分布在北美海盆地和阿根廷海盆地底部。在波罗的海、北海、黑海等浅海底也有锰结核矿分布。

加拿大东部芬地湾最大潮汐为15.39米，居世界首位，英国西南部的布里斯托尔湾最大潮汐为12米以上，都是很好的能源。法国在布列塔尼半岛的圣马洛附近的朗河河口建了潮汐发电站，发电能力为20多万千瓦，是目前世界上最大的潮汐发电站。

:: 交通运输

大西洋航运发达，东、西分别经苏伊士运河及巴拿马运河沟通印度洋和太平洋。海轮全年均可通航，世界海港约有75%分布在这一海区。主要航线有欧洲和北美的北大西洋航线，欧洲、亚洲、大洋洲之间的远东航线，欧洲与墨西哥湾和加勒比海之间的中大西洋航线，从西欧沿非洲大西洋岸到开普敦的航线。

大西洋海底电缆总长20多万千米。从爱尔兰的瓦伦西亚岛和从法国的布列塔尼半岛西北端开始通到加拿大纽芬兰岛的东南端，或一直通到加拿大新斯科舍半岛北端的线路是大西洋海底电缆的主要干线。

大西洋的主要海港有圣彼得堡、汉堡、鹿特丹、伦敦、马赛、开普敦、纽约、新奥尔良、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯等。

印度洋

::最年轻的大洋


印度洋是地球上最年轻的大洋，根据板块学说的原理，印度洋是在距今 22500 万~6500 万年的中生代时产生的。大约在三叠纪以前，巨大的特提斯海楔入了北方古陆和南方古陆之间。晚保罗世时，非洲、南极洲和澳大利亚之间出现洋中脊，特提斯海向西南方侵入，印度洋的雏形才开始形成。距今 1 亿年的晚白垩世晚期，印度、马达加斯加岛与非洲分离。第三纪初澳大利亚才与南极大陆分离。此时，印度洋才有了今日的面貌。

::概况

印度洋位于亚洲、大洋洲、非洲和南极洲之间，大部分在南半球。面积 7492 万平方千米，约占世界海洋总面积的 20.8%，为世界第三大洋。平均深度为 3897 米，最大深度为爪哇海沟，深达 7450 米。

印度洋西南以通过南非厄加勒斯角的经线同大西洋分界，东南以通过塔斯马尼亚岛东南角至南极大陆的经线为界与太平洋相连。印度洋的轮廓是北部为陆地封闭，南部向南极洲敞开。

印度洋主要属海和海湾有红海、阿拉伯海、亚丁湾、波斯湾、阿曼湾、孟加拉湾、安达曼海、阿拉弗拉海、帝汶海、卡奔塔利亚湾、大澳大利亚湾、莫



桑比克海峡等。

印度洋有很多岛屿,其中大部分是大陆岛,如马达加斯加岛、斯里兰卡岛、安达曼群岛、尼科巴群岛、明打威群岛等;留尼汪岛、科摩罗群岛、阿姆斯特丹岛、克罗泽群岛、凯尔盖朗群岛等为火山岛;拉克沙群岛、马尔代夫群岛、查戈斯群岛,以及爪哇西南的圣诞岛、科科斯群岛都是珊瑚岛。

::地理

印度洋是地质构造极为复杂的大洋。洋东、西、南面是稳定的陆块,北面则为活跃的红海、亚丁湾大裂谷、喜马拉雅山和爪哇海沟一线。洋底地貌以洋中脊和洋盆为主。

印度洋洋底有一条“人”字形的海底山脉,这条山脉名叫中央海岭,是世界大洋中脊的组成部分。中央海岭由中印度洋海岭、西印度洋海岭和南极—澳大利亚海岭组成,三条海岭以罗德里格斯岛为连结点。

中印度洋海岭地貌崎岖险峻,结构复杂,宽400~1000千米,相对高度1800~3000米。该海岭北部切割强烈,有许多不同形状的海峰、盆地和洼地。西印度洋海岭切割亦很强烈,相对高度1200~3000米,平均宽400千米,这里是世界大洋中唯一无明显地磁异常的洋中脊。南极—澳大利亚海岭一般在海平面以下4000~6000米之间,裂谷较少。

印度洋中央海岭将印度洋分隔成东、西两大部分。印度洋东部是平坦而宽阔的海盆,深5000~6000米。海盆中间分布着一条与东经90°相吻合的东经90°海岭,它长6000千米,宽仅185千米,离海面深度1800~3000米,是迄今世界洋底部发现的直线性最长的海岭。海盆东部以深海沟特别发育著称,如爪哇海沟、迪阿曼蒂海沟、奥勃海沟等。爪哇海沟最大深度为7729米,是印度洋的最低点。印度洋西部地形较为复杂,其主要特征是水浅,海底部分布着一系列近似南北走向的凸起和凹地。马达加斯加岛、塞舌尔群岛、毛里求斯岛等即为海底隆起的顶峰。留尼汪岛的高度为3069米,是印度洋最高的地方。这里还分布着一些深海平原,其深度在4000~5000米之间。

印度洋与其他大洋不同之处还在于,其北部的海、湾发育着世界著名的大型冲积堆。这种大型冲积堆又叫深海扇,多由陆源堆积物组成。它们是中新世中期以来



↑孟加拉湾是印度洋东北部广阔但较浅的海湾,沿湾重要港口有印度的加尔各答和马德拉斯(今金奈)等。