

雜症

馮氏錦囊

五



馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷六

男 乾元龍田

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王崇志慎初仝較

孫大業功垂

頭痛頭風大小總論合參

經曰風氣循風府而上則爲腦風新沐中風則爲首風又
曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生總之頭爲諸陽之首
以象天六腑清陽之氣五臟精華之血皆會於頭爲至清
至高之處故爲天象謂之元首言其至尊不可犯也凡手
之三陽從手走頭足之三陽從頭走足以爲常度則無頭

痛之患。若外因風寒霧露之觸。內因痰火濕熱之熏。痛由起矣。至於真頭痛者。其腦盡痛。而手足寒。且清至節。旦發夕死。夕發旦死。蓋四肢爲諸陽之本。痛盡腦而寒至節。則元陽虧敗。氣血虛極。陰邪直中髓海。於泥丸宮中。非藥所能愈。蓋其根先絕也。書又曰。腦爲髓海。受邪則死。灸百會穴。猛進大劑參附。亦有生者焉。

頭痛頭風。非二證也。在新久去留之分耳。淺而近者。名頭痛。其痛卒然而至。易於解散。速安也。深而遠者。名頭風。其痛作止不當。愈後遇觸復發也。手足三陽之脈。皆上循於頭。爲諸陽之會。六陰脈至頸而還。惟厥陰上入吭。噪連目。

系出額故當於七經辨之。屬痰者居多。然有風寒濕熱火痰及氣虛血虛食鬱瘡毒之別。皆能傷於脉道而爲病也。傷於太陽則在後。陽明在額。挾鼻與齒。少陽兩角。厥陰屬巔頂而多吐涎。須尋風尋火在氣在血。晰其虛實表裏而便得病情矣。

經之論頭痛風也。寒也。虛也。皆六氣相侵與真氣相薄。經氣逆上干於清道不得運行。壅遏而痛也。天氣六淫之邪。人氣五賊之變。皆能相害。或蔽覆其清明。或瘀塞其經絡。與氣相薄鬱而成熱。脉滿而痛。若邪氣稽留。脉滿而氣血亂。則痛乃甚。此實痛也。寒濕所侵。真氣虛弱。雖不相薄成

熱然邪客於脉外。則血泣脉寒。捲縮緊急。外引小絡。面痛得溫則止。此虛痛也。因風痛者。抽掣惡風。因熱痛者。煩心惡熱。因濕痛者。頭重而天陰轉甚。因痰痛者。昏重而欲吐不休。因寒痛者。絀急而惡寒戰慄。氣虛痛者。惡勞動其脉大。血虛痛者。善驚惕。其脉芤。頭痛自有多因。古方必兼風藥者。以高巔之上。惟風可到。味之薄者。陰中之陽。自地升天者也。在風寒濕者。固爲正用。卽虛與熱者。亦假引經。且散其抑遏也。若疎散太過而痛及服辛散而反甚者。不妨用酸收以降之。若年衰氣弱。清氣不能上升而濁陰犯之。以作痛者。宜升陽補氣而自愈。若血虛之頭痛。必自眉尖

後近髮際而上攻頭目。宜用芎歸養血而自愈。然新而暴者。但名頭痛。深而久者。名爲頭風。頭風必害眼者。經所謂東風生於春。病在肝。目者肝之竅。肝風動則邪害空竅。且由精髓腦之不足。而外邪易干以深入也。

厥頭痛者。手三陽之脉受風寒而伏留不去。上干於頭。其氣不循經隧而逆行。故名曰厥。

久頭痛病。畧感風寒便發。而至寒月重綿厚帕包裹者。此屬鬱熱本熱而標寒。世人不識。率用辛濫解散之藥。暫時得效。誤認爲寒。殊不知因其本有鬱熱。毛竅常疎。故風寒易入。外寒束其內熱。閉逆而爲痛。辛熱之藥。雖能開通閉。

逆散其標之寒邪。然以熱濟熱。病本益深。惡寒愈甚矣。惟當瀉火涼血爲主。佐以辛溫散表之劑。以從治法治之。則病可愈而根可除也。

頭痛多主於痰。痛甚者火多。蓋火性炎上。其痛如劈。有可生者。有可下者。東垣曰。濕熱在頭而痛者。當以苦吐之。如瓜蒂散。濃茶之類是也。痰厥頭痛。非半夏不能除。有屬於風者。有屬於寒者。有屬於半寒爲偏頭痛者。有屬於濕者。有屬於火鬱者。有屬於外感有餘。有屬於內傷不足。傷食傷酒。種種症候。皆能頭痛。總由清陽不升。濁陰上犯也。感冒頭痛。宜防風羌活藁本白芷。卽所謂新沐中風爲首。

風 風熱在上、頭痛宜天麻、蔓荊子、台芎、酒製黃芩 肥
白人頭痛是氣虛、宜黃耆、酒洗生地、南星 形瘦蒼黑之
人頭痛是血虛、宜當歸、川芎、酒黃芩之類 太陽頭痛惡
風寒、脈浮緊、其痛在巔頂、與兩額角、川芎、羌活、獨活、麻黃
之類爲主、爲衝頭痛 少陽頭痛、脈弦細、往來寒熱、其痛
連耳根、柴胡、黃芩爲主 陽明頭痛、自汗發熱、惡寒、脈浮
緩長實、其痛連目眦、鼻乾、齒頰目疼、升麻、葛根、石膏、白芷
爲主 太陰頭痛、必有痰、體重或腹痛、或痰癖、脈沉緩、以
蒼朮、半夏、南星爲主 少陰頭痛、足寒氣逆、爲寒厥、其脈
沉細、麻黃、細辛、附子湯主之 厥陰頭項痛、或度痰沫厥

冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之然太陰少陰有身熱而無
頭痛厥陰有頭痛而無身熱若身熱又頭痛屬陽經也
血虛頭痛連魚尾相連者當歸川芎爲主以潤風燥經所
謂頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也氣虛頭痛人參
黃芪爲主以升清陽經所謂上氣不足腦爲之不滿頭爲
之苦傾是也偏頭痛者少陽相火也有痰者多在左屬
風屬火多血虛宜薄荷荆芥川芎當歸在右屬痰屬熱多
氣虛宜蒼朮半夏酒芩爲主若屬濕痰川芎南星蒼朮主
之氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荊子
二分細辛二分其效如神厥逆頭痛者所犯大寒內至

骨髓髓者以腦爲主。腦逆故令頭痛。腦亦痛。以羌活附子湯主之。腎虛頭痛。卽經所謂下虛上實。由相火上冲氣逆上行。痛不可忍。用補中湯加芎歸。或薑附理中湯。太陰頭痛。必有痰也。少陰頭痛。足寒而氣逆也。太陰少陰三經。雖不上頭。然痰與氣壅於膈中。頭上氣不得暢而爲痛也。痰厥頭痛。所感不一。發時惡心嘔吐痰水。甚則手足厥冷。吐去痰涎。其痛漸減。雖由于乎痰。然痰之始也。必有本。是知方者。體也。法者。用也。徒知體而不知用者。弊若體用不失。可謂上工矣。宜以白朮半夏天麻湯主之。痰厥頭痛。非半夏不能除。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能解。卒

人頭痛屬火與痰者多。若肥人多是濕痰。二陳加蒼朮。人瘦多是血虛。與火酒炒芩連。荆防薄荷芎歸之類。巔頂痛甚。加藁本酒炒升柴。東垣曰。頂巔痛。須用藁本去川芎。頭痛不可專泥風藥。愈虛其虛。使風入於腦。永不可按。亦不可偏於逐火。使風火上。乘空竅而從眼出。如腐之風火相煽而成衣焉。諺云。醫得頭風瞎了眼。此之謂也。

總之頭痛頭風。皆因清陽之氣有虧。精華之血有損。不能交會衛護於首。以致濁陰外邪犯之。若從標疎散清理。不過徒取近功。然益虛其虛。旋踵愈甚。張每重用八味湯加牛膝五味子。食前早晚服之。濁陰降。真陰生。雷火熄。真火

藏上下肅清不惟頭病既痊精神亦可倍長矣

頭搖大小總論合參

頭搖者本屬於風實因於火。經所謂諸風掉眩皆屬肝木。木得風則搖動。乃肝經火盛而生虛風也。故高年病後辛苦人多犯之。因氣血虛而火犯上鼓動也。是以小兒有病搖頭三年不止者。以河車入常服藥中而愈。靈樞曰邪之所在皆爲不足。故上氣不足腦爲之不中耳。爲之苦鳴。頭爲之苦傾。目爲之眩。中氣不足洩便爲之變。腸爲之苦鳴。下氣不足則爲痿厥。

眉眶骨痛大小總論合參

眉眶骨痛有二、但屬肝經風熱與痰、或作風痰、其治類痛風、然腦爲髓海、而腎主骨、多由腎陰不能養骨髓、少以致腦虛火起於中、寒束於外、疼之所始也、凡高骨之處、及眉毛所生之地、皆屬本臟之精氣榮養、若其臟之精氣虧損、則其地之毫毛骨肉不榮矣、故靈樞曰、足太陽之上、血氣盛則美眉、眉有毫毛、由是觀之、眉眶骨痛者、此肝血既失、其養而腎水亦不榮於骨矣、故主三年之內、有大風疾至、明其根本既拔、而外邪乘襲也、治之者、必宜滋補肝腎爲主、少佐風藥、以使上達、如不知此、徒以辛熱發散爲事、則陰道愈虧、益增其害矣、

頭重大小總論合參

東垣曰頭重如山濕氣在頭也紅豆散搐鼻取之蓋病上
頭腦若藥攻腸胃是誅伐無過矣故於鼻內取之猶物在
高巔之上必用射而得之也

頸項痛

邪客三陽則痛寒搏則筋急風搏則筋弛左屬血右多屬
痰丹溪治

之用二陳湯加酒芩羌活紅花服二劑而愈有挫閃及生
枕而項強痛者皆由腎虛不能榮筋也六味地黃湯加秦

芫

菊花散 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花 石膏 防風 旋覆花 枳殼

蔓荊子 甘草 羌活 各一錢 薑水煎服

紅豆散 治頭重

羌活 連翹 紅豆 二味等分爲末搐鼻

一方 治頭痛連眼痛 此風痰上攻須用白芷開之

川芎 白芷 防風 藁本 細辛 當歸

兩前芽茶 各等 水煎服

不臥散 治頭痛不可忍者

方胡卒 五 青黛 錢 猪牙皂角 脾實者胡去皮及子二兩

爲末水丸小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以水化開竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病者坐却以定銅錢一箇於當門齒上當見涎結成盆卽愈

芎歸湯

治着濕頭痛身重眩暈痛極

附子

白朮

川芎

桂心

甘草

薑棗水煎服

順氣和中湯

治氣虛頭痛此藥升陽補氣自愈

黃芪

一錢五分

人參

一錢

甘草

炙七

白朮

陳皮

當歸

芍藥

各五分

升麻

柴胡

各三分

細辛

蔓荊子

各二分

川芎

水煎食後服

白歸湯

治血虛頭痛

川芎 當歸 白芍 水煎服 一方加甘菊去心

四神散 治婦人血風眩暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花 荆芥穗各等分 爲末每服一

錢用葱白茶末煎湯食前溫服

祛風清上丸 治風熱上攻眉稜骨痛

酒芩 白芷一錢五分 防風一錢 柴胡一錢 荆芥八分

川芎二錢 羌活一錢 甘草五分 水煎食後服

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星各一錢五分 半夏 茯苓名一錢二分

陳皮 片芩酒炒一分 枳實一錢 桂草五分 加挾風熱