

浙江省药品标准

1983年版

浙江省卫生厅编

*

浙江科学技术出版社出版

(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷

(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/16 印张24.5 字数615,000

1985年9月第一版

1985年9月第一次印刷

印数: 1—7,525

统一书号: 14221·87

定 价: (精) 6.50 元

目 录

一 画

“一七〇”胃痛药水..... 1

二 画

二神丸.....	2
十全大补酒.....	3
十全大补膏.....	3
十全大补晶.....	4
十枣丸.....	5
十滴水.....	5
丁维葡萄糖.....	6
七味都气丸.....	6
七制香附丸.....	7
七宝美髯丸(补肾养血丸).....	7
七宝美髯冲剂.....	8
人丹.....	8
人参片.....	9
人参再造丸(浙江方).....	10
人参百岁酒.....	11
人参银耳晶.....	12
人参滋补膏.....	12
人参精口服液.....	13
人造补血药(复方枸橼酸铁铵糖浆).....	14
八宝红灵丹.....	15
八宝眼药(浙江方).....	16
八珍冲剂.....	17
九一丹.....	17
九制香附丸.....	18
力勃隆片(肝铁片).....	18
力勃隆胶囊(肝铁胶囊).....	19
力维隆补血糖浆.....	20
力维隆补血糖浆(浓).....	21

三 画

三七片.....	21
三七伤药片.....	22
三七伤药散.....	22
三才封髓丸.....	23

三丰伐木丸.....	24
三尖杉酯碱.....	24
三尖杉酯碱注射液.....	25
三两半药酒.....	26
三余神曲.....	27
三层茴香丸.....	28
三参皇浆口服液.....	28
三黄宝蜡丸.....	29
三磷酸腺甙钠.....	30
三磷酸腺甙钠注射液.....	31
大补药酒.....	32
大补药膏.....	32
大活络丸.....	33
大黄酊.....	34
大黄碳酸氢钠片.....	34
大麻风丸.....	35
大温中丸.....	36
万氏牛黄清心丸.....	36
万应膏.....	37
万灵五香膏.....	38
上感片.....	38
上感冲剂.....	39
小儿止咳糖浆.....	40
小儿化痰丸.....	41
小儿回春丸.....	41
小儿安.....	42
小分子右旋糖酐葡萄糖注射液.....	43
小活络片.....	44
小温中丸.....	44
山苍子油胶丸.....	45
山莨菪碱(654-2).....	46
山莨菪碱片(654-2片).....	47
千金止带丸(浙江方).....	47

四 画

开塞露.....	48
元胡止痛片.....	49
无比山药丸.....	49
木瓜酒.....	50

木香顺气丸	50
五味子冲剂	51
五香伤膏	51
牙周宁	52
牙周宁片	53
牙痛水	54
止咳祛痰片	54
水牛角解毒丸	55
水陆二仙丸	56
内消瘰癧丸(海藻丸)	56
牛黄至宝丸	57
牛黄抱龙丸	57
牛黄金锁丸	58
牛黄镇惊丸	59
牛黄醒消丸	59
午时茶	60
气管炎丸(气管炎咳嗽痰喘丸)	61
气喘膏	62
化滞十香丸	62
风油精	63
风湿伤痛膏	63
风湿骨痛酒	64
风湿骨痛药	64
乌梅安胃丸	65
“六一”宝塔糖	65
六神丸	66
心安宁片	67
孔圣枕中丸	67
双宝素口服液	68
双宝素胶囊	68

五 画

玉叶金丹(妇科调补丸)	69
玉树油(解痛油)	70
玉屏风丸	70
甘油磷酸铁	71
甘露	72
甘露消毒丸	72
可达灵片	73
丙谷胺片	74
左归丸	74
右归丸	75
龙虎化毒丹	75
平补镇心丸	76
卡那霉素软膏	77

归芍六君丸	73
归肾丸	73
甲哌利福霉素(利福平)	79
甲哌利福霉素胶囊(利福平胶囊)	80
史国公药酒(浙江方)	81
四制香附丸	81
四物益母丸	82
生脉冲剂	83
外用舒筋药水	83
立马回疗丹	84
半夏片	84
半夏露	85
半夏露冲剂	86
半硫丸	86
头风膏	87
汉防己甲素	87
汉防己甲素片	89
汉防己甲素注射液	89
宁嗽丸	90
圣济整甲丸	90
对氨基苯甲酸片(止血芳酸片)	91

六 画

地巴唑片	92
亚油酸	92
亚油酸胶丸	93
荸荠丸	93
百益镇惊丸	94
光明水眼药	94
光明燥眼药	95
当归注射液	96
当归养血丸	96
当归养血膏	97
回天再造丸(中风舒络丸)	97
竹沥达痰丸	99
伤风止咳糖浆	99
伤风感冒冲剂	100
伤科七味片	100
伤科八厘散	101
伤科跌打丸	102
血压达静片	102
血症十灰丸	103
全鹿丸	104
全鹿片	105
杀烈癖软膏	106

肌苷	107
肌苷注射液	108
多酶片	108
羊肝丸	110
关节止痛膏	110
关节炎丸	111
安尔喘栓(香叶醇栓)	111
安尔喘胶丸(香叶醇胶丸)	112
安神糖浆	112
安痛定注射液	113
安嗽片	114
安嗽露	114
妇炎灵	115
妇科十味片	116
妇科宁坤丸	117
妇科柏子仁丸	118
红纸膏药	118
红茴香注射液	120
红霉素软膏	120

七 画

麦精鱼肝油	121
寿星补汁	122
进呈还睛丸	123
抗炎松片	123
抗结核片	124
芙蓉抗流感片	125
克念菌素	125
克念菌素片	126
克念菌素阴道片	127
克喘片	127
克霉唑软膏	128
杏仁止咳糖浆	129
杏仁水	130
杞圆酒	131
杨氏风湿药酒	131
更衣丸	132
两仪膏	132
利血生片	133
利胆片	133
谷固醇	134
谷固醇软膏	135
谷固醇栓	135
肝宁片	136
肝乐片	137

肝乐宁糖浆	138
肝炎丸	139
肝泰乐片	139
肝舒乐冲剂	140
肝膏片	140
龟甲胶	141
泛酸钙片	141
沉香降气丸(沉香化滞丸)	142
沉香曲	142
良园枇杷叶膏	143
补肾金刚丸	143
补肾强身片	144
灵宝如意丹(清暑解毒丸)	144
局方牛黄清心丸	145
局方黑锡丹	146
陆氏润字丸	146
附子七味丸	147
附子都气丸	147
鸡血藤浸膏片	148
鸡苏散	148
驴皮胶	149

八 画

青春宝	149
苯甲醇注射液	150
枇杷止咳露	150
枇杷叶冲剂	151
板蓝根片	151
板蓝根冲剂	152
板蓝根注射液	152
砂炭银片	153
肾炎片	155
明目上清丸	155
明目地黄丸(浙江方)	156
明目还睛丸	156
明目蒺藜丸	157
垂体后叶注射液	157
垂体后叶粉	158
使君子丸	158
金银花露	159
金匱肾气丸	159
金粟丸	159
金锁固精丸	160
金樱子膏	160
采芸曲	161

乳白鱼肝油	162	胃康片	189
乳宁片	163	胃蛋白酶片	190
肿节风注射液	163	胃溃疡冲剂	190
周公百岁酒	164	胃膜素	191
鱼腥草注射液	165	胃膜素胶囊	192
单糖浆	165	咳宁片	192
注射用促皮质素	166	咳停片	193
泽泻降脂片	167	咳喘片(百喘朋片)	193
治伤片	168	咳痰喘宁片	194
治伤散	168	咳嗽糖浆	195
治带丸(白带丸)	169	骨刺片	196
治湿平胃丸	170	钙素母片	196
建神曲	170	香叶醇	197
降压灵	171	香砂平胃丸	198
降压灵片	172	香砂枳术丸	198
降脂宁	172	香砂养胃丸	199
降脂宁片	174	香葵油	199
参术健脾丸	174	香葵油栓	200
参麦六味丸	174	香葵油胶丸	200
参芪大补膏	175	复方七叶一枝花片	201
参芪鹿茸精	176	复方土槿皮酊	201
参杞全鹿丸	176	复方五味子片	202
参杞蜂皇浆	177	复方五味子糖浆	203
参苓白术丸(浙江方)	177	复方丹参片	204
参茸大补丸	178	复方丹参注射液	205
参茸酒	178	复方甘草合剂	206
参茸蜂皇浆	179	复方地锦糖浆	207
参桂养荣丸	180	复方抗结核片	207
参桂养荣酒	180	复方谷固醇片	208
参桂酒	181	复方枇杷叶冲剂	209
参桂鹿茸丸	181	复方枇杷叶膏	210
参鹿补丸	182	复方罗布麻片	210
驻车丸	182	复方制金柑	211

九 画

茯苓丸	183	复方降压片	212
茯菟丸	184	复方茶碱片	213
药用炭片	184	复方枸橼酸维静宁糖浆(复方咳必清糖浆)	214
威喜丸	185	复方穿心莲片	215
轻身减肥片	185	复方海贝片	215
胃可舒	186	复方野菊感冒冲剂	216
胃宁片	187	复方蛇胆川贝散	226
胃灵	187	复方羚角降血片	217
胃灵冲剂	188	复方维生素B肝片	217
胃得宁胶囊(复方维生素U胶囊)	188	复方维生素U片(复方胃友片)	218
		复方硫酸新霉素滴耳液	219
		复方碳酸氢钠片(苏打明片)	220

复方磺胺甲基异恶唑片(复方新诺明片)	221	莪术油软膏	249
复方磺胺对甲氧嘧啶片(复嘧啶片)	221	核酪注射液	250
复合维生素B溶液	222	核酸-氨基酸	251
复合维生素B溶液(三倍液)	223	核酸-氨基酸片	252
复合磷酸酯酶片	224	柴胡注射液	253
追风药酒	225	鸬鹚涎丸	253
保健眼药水(沃古林眼药水)	225	党参固本丸	254
信宁咳糖浆	226	眠安宁糖浆	254
食母生片	227	氨肽碘注射液	255
胚宝胶囊	228	γ -氨酪酸	256
胆酸钠	228	γ -氨酪酸片	257
胆酸钠片	229	健儿膏	257
脉安冲剂	229	健儿钙片	258
脉通	230	健身滋补膏	259
度米芬喉片	231	健补隆糖浆	259
康乐大宝素	231	健脾肥儿丸	260
养心片	232	健脾资生丸	260
养血安神片	233	L-胱氨酸	261
养血安神糖浆	234	胱氨酸片	262
养血愈风酒	235	脐带组织液	266
养血愈风酒冲剂	235	脑力新	263
首乌片	236	脑益嗉片	264
首乌冲剂	236	高三尖杉酯碱	265
首乌强身片	237	高三尖杉酯碱注射液	266
活血止痛膏	238	益气六君丸	267
活血通经丸	238	益母草冲剂	267
活血镇痛膏	239	益欢散	268
济生散(痧气散)	240	益寿宁	268
穿心莲注射液	240	益春延寿酒	269
扁鹊玉壶丸	241	益肝灵片	270
祛风骨痛露	241	益胃膏	271
祛风活血丸	241	消炎止痛膏	271
神经性皮炎药水	242	消炎软膏(消治龙软膏)	272
神犀丹	243	消炎眼药水(疾得宁眼药水)	273
十 画		消炎痛片	274
		消食妥	274
珠黄散(浙江方)	244	消热解毒丸	275
盐酸三氟拉嗪片	244	消痞肥儿丸	276
盐酸山莨菪碱注射液(盐酸654-2注射液)		消痞狗皮膏(消痞阿魏膏)	276
.....	245	消瘰夏枯草膏	277
盐酸吗啉胍	245	海墨止血片	278
盐酸吗啉胍片	246	润肠丸	278
盐酸苯海拉明糖浆	247	调经养血丸	279
损伤膏药	248	桑菊饮	279
热藏胎盘组织液	249	桑椹膏	280

十一画

理疝葫芦巴丸	281
黄连上清丸	281
黄明胶	282
黄病降砒丸	282
梅花点舌丹(浙江方)	283
硃砂膏	284
雪梨膏	284
眼宁注射液(眼浸出注射液)	285
羚羊感冒片	286
清凉丹	286
清凉油	287
清凉药肉	288
清凉润喉片	288
液体清凉油	289
液状甘油磷酸钠	290
液状甘油磷酸钾	290
强壮滋补片	291
强筋松片	292
维乙磷糖浆	292
维丙胺注射液(维丙肝注射液)	293
维生素E胶丸	294
维生素K ₃ (亚硫酸氢钠甲萘醌)	294
维生素K ₃ 注射液(亚硫酸氢钠甲萘醌注射液)	295
维生素K ₄ 片(乙酰甲萘醌片)	296
维生素U(碘甲基蛋氨酸)	297
维钙糖片	298
维磷补汁	298
维磷补汁(浓)	300

十二画

琥珀多寐丸	300
琥珀抱龙丸	301
琼玉膏	302
散毒万灵丸	302
硫酸软骨素(康得灵)	303
硫酸软骨素(康得灵)(注射剂原料)	304
硫酸软骨素片(康得灵片)	304
硫酸软骨素注射液(康得灵注射液)	305
硫糖铝	305
硫糖铝片	307
紫金錠(浙江方)	307
跌打丸(浙江方)	308

跌打损伤膏	308
喉症散	309
喉症锡类散	310
喉痛铁笛丸	311
黑归脾丸	312
氯灭酸片(抗风湿灵片)	312
氯霉素注射液	313
鹅根	314
筋骨风痛药	314
舒肝乌龙丸	315
舒筋活血片	316
脾肾双补丸	316
痢症镇心丸	317
痧气卧龙丹	317
普鲁卡因肾上腺素注射液	318
疏风活络丸	319

十三画

感冒咳嗽冲剂	320
蜂乳口服液	320
蜂乳片	321
蜂乳胶囊	321
蜂皇胎片	322
愈咳糖浆	323
解毒消炎丸	324
解热止痛散	324
痰咳宁片	326
溴甲烷阿托品(胃疡平)	327
溴甲烷阿托品片(胃疡平片)	327
福祿补酒	328
辟瘟丹	328

十四画

噻啉乳(磺胺噻啉混悬剂)	330
精制猴枣散	331
滴耳油	331
赛空青眼药	332
缩泉丸	333

十五画

蕲蛇药酒	333
橙皮酊	334
醋酸可的松眼药水	334
醋酸可的松眼膏	335
醋酸地塞米松软膏(醋酸氟美松软膏)	336

醋酸氢化可的松	337
醋酸氢化可的松软膏	338
醋酸氢化泼尼松注射液	339
镇坎散	339
鲨肝醇片	340
潘生丁片	341

十六画

薄荷锭	341
橘半枳术丸	342

十七画

霞天胶	342
霞天曲	343

十九画

藿香正气片	343
蘑菇血宁片	344
鳖甲胶	345
蟾酥痧气丸	345
癣治净	346

二十一画

癫狂龙虎丸	346
癫痫白金丸	347

附 录

制剂通则	附录 1
茶剂	附录 2
曲剂	附录 2
锭剂	附录 3
栓剂	附录 3
橡胶膏药	附录 4
液剂	附录 5
糖浆剂	附录 5
蜜浆剂	附录 6
丸剂	附录 6
片剂	附录 7
散剂	附录 8
冲剂	附录 8
胶剂	附录 9
胶囊剂	附录 9
膏药	附录 9
煎膏剂(膏滋)	附录 10
药品卫生标准	附录 10
中国药典与部颁药品标准的药品增加	
规格表	附录 11
药品保留品种	附录 11

索 引

药品分类索引	索引 1
汉语拼音索引	索引 8

“一七〇”胃痛药水

“Yiqiling” Weitong Yaoshui

MISTURA STOMACHI “170”

本品含枸橼酸铋($C_6H_5BiO_7$)应为标示量的95.0~105.0%。

【处方】	枸橼酸铋	90g〔注1〕	氯仿	5ml
	颠茄酊	75ml	浓氨溶液	约 37ml
	复方豆蔻酊〔注2〕	50ml	苋菜红	0.15 g
	马钱子酊〔注3〕	37.5ml	水	适量
	乙醇	16ml		
	全 量			1000ml

【制法】 取枸橼酸，加水适量，加热溶解后，缓缓加入次硝酸铋，随加随搅拌，在60~70°加热20分钟，弃去上清液，残留物用水洗涤后，加浓氨溶液使溶解，依次加颠茄酊、复方豆蔻酊、马钱子酊、氯仿与乙醇的混合液及苋菜红溶液，再加水使成 1000ml，搅匀，滤过，即得。

【性状】 本品为红色的澄清液体；有豆蔻芳香、略具氨臭，味略涩苦。

【鉴别】 (1)取本品 5ml，通硫化氢气体，即发生棕黑色沉淀，此沉淀在热硝酸中溶解，在氢氧化钾试液、稀盐酸或硫化铵试液中均不溶。

(2)取本品 30ml，加氯仿 15ml，振摇，静置，分取氯仿层，置水浴上蒸干，残渣照下述方法试验：

①取残渣，加硫酸 2~3 滴使溶解，加重铬酸钾结晶 1 小粒，即显紫堇色，渐转红色，最后成黄色。

②取残渣，加发烟硝酸 5 滴使溶解，置水浴上蒸干，得黄色残渣，放冷，加乙醇制氢氧化钾试液 2~3 滴，即显深紫色。

【检查】 应符合液剂项下有关的各项规定(附录 5 页)。

【含量测定】 精密量取本品 5ml，置已炽灼至恒重的瓷坩埚中，蒸干，炽灼至恒重，残渣与 1.708 相乘，即得本品供试量中的 $C_6H_5BiO_7$ 的重量。

【作用与用途】 镇痛、制酸药。用于因胃酸过多引起的胃痛。

【用法与用量】 口服 一次 4ml 一日 3 次
服时摇匀，饭后温开水冲服，痛剧时至多可服 8ml。

【注意】 孕妇忌服。

【贮藏】 密闭，在阴凉处保存。

注 1：由次硝酸铋 69 g 与枸橼酸 51 g 制成。

注 2：应符合复方豆蔻酊的质量标准。

复 方 豆 蔻 酊

本品每 1ml 相当于总生药量 0.224 g。

【处方】 豆 蔻(中粉) 56 g

小茴香(中粉)	56 g
桂 皮(中粉)	112 g
乙 醇(60%)	适量
全 量	1000ml

【制法】 取豆蔻、小茴香与桂皮照酊剂项下的渗漉法(中国药典一部附录10页)用60%乙醇作溶剂,依法制备,用乙醇稀释使成1000ml,即得。

【性状】 本品为黄棕色或红棕色液体;气香。

【检查】 乙醇量 应为50~58%(中国药典二部附录48页)。

【作用与用途】 健胃药、驱风药及芳香调味药。

【贮藏】 遮光,密封,在阴凉处保存。

注3:应符合马钱子酊的质量标准。

马 钱 子 酊(番木鳖酊)

本品含土的宁($C_{21}H_{22}N_2O_2$)应为0.119~0.131%(g/ml)。

【制法】 取马钱子粉1000g,照酊剂项下的渗漉法(中国药典二部附录5页),用70%乙醇作溶剂,浸渍48小时后,以每分钟1ml的速度,缓缓渗漉,俟土的宁完全漉出,收集漉液蒸发至成250ml,趁热加石蜡15g融化后,强力振摇,放置,俟冷,穿通凝结的石蜡层,将溶液取出,加乙醇(70%)250ml,滤过,取滤液适量测定含量后,将余液加乙醇(45%)稀释,使土的宁的含量符合标准,静置,俟澄明,滤过,即得。

【性状】 本品为棕色液体;味极苦。

【鉴别】 取含量测定项下滴定后的溶液,加氨试液2ml,用氯仿振摇提取2次,每次10ml,合并氯仿液,蒸干,残渣加硫酸2~3滴溶解后,加重铬酸钾的结晶1小粒,缓缓搅拌,溶液即显深紫堇色。

【检查】 乙醇量 应为40~45%(中国药典二部附录48页第一法)。

【含量测定】 精密量取本品100ml,置蒸发皿中,在水浴上蒸干,残渣中加硫酸溶液(3→100)15ml,硝酸2ml与亚硝酸钠溶液(1→20)2ml,在15~20°放置30分钟,移置贮有氢氧化钠液(1→5)20ml的分液漏斗中,蒸发皿用少量水洗净,洗液并入分液漏斗中,用氯仿分次振摇提取,每次20ml,至土的宁提尽为止,每次得到的氯仿液均先用同一的氢氧化钠溶液(1→5)5ml洗涤,再用同一的水洗涤2次,每次各20ml,合并洗净的氯仿液,置水浴上蒸发至近干,加乙醇5ml,蒸干,并在100°干燥30分钟,残渣中加N/10硫酸液10ml,必要时,微热使溶解,放冷至室温,加甲基红指示液2滴,用N/10氢氧化钠液滴定,即得(每1ml的N/10硫酸液相当于33.44mg的 $C_{21}H_{22}N_2O_2$)。

【作用与用途】 苦味健胃药和中枢兴奋药。

【用法与用量】 常用量 口服 一次0.5~1ml 一日1~4ml

极 量 口服 一次2ml 一日6ml

【贮藏】 置遮光容器内,密封,在30°以下保存。

浙 Q/WS-2-83

二 神 丸

Ershen Wan

【处方】 补骨脂(盐水炒) 400 g
肉豆蔻霜 200 g

大 枣 400 g

【制法】 以上三味，大枣煮熟，去皮、核，制成枣泥，与补骨脂、肉豆蔻霜搅匀，干燥，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜400 g 分次加水煎煮，滤过，用煎液泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水丸；气香，味辛、微甘。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 温补脾肾。用于脾肾虚弱，腰酸食减，大便不实，五更泄泻。

【用法与用量】 口服 一次6 g 一日2次

【规格】 每50粒重约3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

浙Q/WS-3-83

十 全 大 补 酒

Shiquan Dabu Jiu

【处方】 当 归	12 g	黄 芪(炙)	8 g
地 黄(熟)	12 g	白 术(炒)	8 g
白 芍(炒)	8 g	川 芎	4 g
党 参	8 g	甘 草(炙)	4 g
茯 苓	8 g	肉 桂	2 g

【制法】 以上十味，照酏剂项下的渗漉法（中国药典一部附录10页），用白酒1720ml作溶剂，先用适量浸渍48小时以上，再以每10000ml按每分钟1~3ml的速度渗漉，合并渗漉液与压榨漉渣得到的压出液，加入蔗糖172 g 搅拌溶解后，密闭静置，滤过，即得。

【性状】 本品为红棕色的澄清液体；气香，味微甘。

【检查】 pH值 应为4.5~6.0（中国药典一部附录42页）。

比重 应为0.96以上（中国药典一部附录26页）。

乙醇量 应为42%以上（中国药典一部附录48页）。

其他 应符合酒剂项下有关的各项规定（中国药典一部附录4页）。

【功能与主治】 补气血，强筋骨。用于气血两亏，腰膝无力。

【用法与用量】 口服 一次15~30ml 一日2次

【规格】 (1)每瓶250ml (2)每瓶500ml

【贮藏】 密封，在阴凉处保存。

浙Q/WS-4-83

十 全 大 补 膏

Shiquan Dabu Gao

【处方】 党 参	120 g	地 黄(熟)	180 g
茯 苓	120 g	当 归	180 g

白 术(炒)	120 g	川 芎	60 g
白 芍(炒)	120 g	甘 草(炙)	60 g
黄 芪(炙)	120 g	肉 桂	30 g

【制法】 以上十味，加水煎煮 2 次，第一次 6 小时，第二次 4 小时，煎液静置，滤过，合并滤液，浓缩至适量，加蔗糖 280 g 的转化糖液（附录一页），搅匀，继续浓缩至稠膏状即得。

【性状】 本品为棕黑色稠厚的半流体，气香，味微甘、微苦。

【检查】 pH 值 本品稀释液（1→2）的 pH 值应为 4.0~5.0（中国药典一部附录 42 页）。

其他 应符合煎膏剂项下有关的各项规定（附录 10 页）。

【功能与主治】 补益气血。用于气血两亏，四肢无力，头晕目眩，腰酸耳鸣。

【用法与用量】 口服 一次 15 g 一日 2 次

【规格】 （1）每瓶 250 g （2）每瓶 500 g

【贮藏】 密封，在阴凉处保存。

浙Q/WS-5-83

十 全 大 补 晶

Shiquan Dabu Jing

【处方】 当 归	120 g	川 芎	40 g
地 黄(熟)	120 g	白 术(炒)	80 g
党 参	80 g	白 芍(炒)	80 g
茯 苓	80 g	黄 芪(炙)	80 g
肉 桂	20 g	甘 草(炙)	40 g

【制法】 以上十味，当归、川芎、白术、白芍、肉桂，照流浸膏剂项下的渗漉法（中国药典一部附录 11 页），用 50% 乙醇作溶剂，依法制备，收集滤液备用；取地黄、党参、茯苓、黄芪、甘草加水煎煮 2 次，每次 2 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩，放冷，加入乙醇适量，静置 24 小时以上，取上清液与备用的上述滤液合并，回收乙醇，并浓缩成比重 1.30（90~95° 热测）的清膏。每 100 g 清膏加蔗糖粉 500 g，拌匀，制粒，干燥，即得。

【性状】 本品为棕色的颗粒；气微香，味甜、微苦。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定（附录 8 页）。

【功能与主治】 温补气血。用于气血两虚，面色苍白，气短心悸，体倦乏力，四肢不温。

【用法与用量】 开水冲服 一次 15 g 一日 2 次

或用本品 30 g 加白酒 250 ml 化服 一次 10~20 ml 一日 2 次

【规格】 （1）每袋 15 g （2）每袋 30 g

【贮藏】 密封，防潮，避热。

浙 Q/WS-6-83

十 枣 丸

Shizao Wan

【处方】 甘 遂(制)	238 g
芫 花(制)	238 g
京大戟	238 g
大 枣(黑枣)	286 g

【制法】 以上四味,甘遂、芫花、京大戟粉碎成粗粉;大枣煮熟,去皮、核,制成枣泥,与上述粗粉搅匀,烘干,粉碎成细粉,过筛,混匀。用水泛丸,干燥,即得。

【性状】 本品为褐色的水丸;气微,味辛、微甘。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 攻逐水饮。用于水饮积滞,腹水肿胀,胁下疼痛,喘逆气急。

【用法与用量】 口服 一次 3 g 一日 1~2 次 或遵医嘱

【注意】 体虚者及孕妇忌服;忌食盐。

【规格】 每50粒重约 3 g

【贮藏】 密闭,防潮。

浙 Q/WS-7-83

十 滴 水

Shidishui

【处方】 樟 脑	25 g	桂 皮	10 g
桉 油	12.5ml	干 姜	25 g
大 黄	20 g	小茴香	10 g
辣 椒	5 g		

【制法】 以上七味,大黄、辣椒、桂皮、干姜、小茴香,照酊剂项下的渗漉法(中国药典一部附录10页),用70%乙醇作溶剂,浸渍24~48小时后,以每10000ml按每分钟1~3ml的速度渗漉,收集漉液 750ml,压榨漉渣,压出液与漉液合并备用;取樟脑、桉油,加乙醇适量溶解后,滤过,滤液与上述备用液合并,加70%乙醇使成 1000ml,混匀,即得。

【性状】 本品为红棕色的澄明液体;有乙醇的特臭及樟脑清凉窜透的特殊香气,味辛辣。

【检查】 乙醇量 应为60~70%(中国药典一部附录49页第二法)。

醇溶性浸出物 取本品 2ml,置已干燥至恒重的蒸发皿中,置水浴上蒸干后,在105°干燥 3 小时,移置干燥器中,冷却30分钟,精密称定重量,计算供试品中含浸出物量,应不少于1.4%。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定(中国药典一部附录10页)。

【功能与主治】 驱暑散寒。用于中暑引起的头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻和胃肠不适。

【用法与用量】 口服 一次10~40滴

【注意】 孕妇慎服。

【贮藏】 遮光，密封，在阴凉处保存。

浙 Q/WS-8-83

丁 维 葡 萄 糖

Dingwei Putaotang

PULVIS VITAMINI D₂ ET GLUCOSI

【处方】 口服葡萄糖	1000 g
维生素 D ₂	0.75mg
香草香精	0.70ml
制 成	1000 g

【制法】 取葡萄糖粉，置搅拌机中；另取维生素 D₂，加大量乙醇溶解后，与香草香精混和，喷入或逐滴加入上述糖粉中，搅匀，即得。

【性状】 本品为白色的颗粒状粉末；气香，味甜。

【鉴别】 取本品约 0.2 g，加水 5ml 溶解后，缓缓滴入温热的碱性酒石酸铜试液中，即发生氧化亚铜的红色沉淀。

【检查】 干燥失重 取本品，在105°干燥至恒重，减失重量不得过 10.0%(中国药典二部附录40页)。

【作用与用途】 营养辅助药。

【用法与用量】 口服 一次 2 汤匙 一日 3 次

【贮藏】 密闭，在干燥处保存。

浙 Q/WS-9-83

七 味 都 气 丸

Qiwei Duqi Wan

【处方】 五味子(蒸)	150 g	地 黄(熟)	400 g
山茱萸(蒸)	200 g	山 药	200 g
茯 苓	150 g	泽 泻	150 g
牡丹皮	150 g		

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每 100 g 粉末加炼蜜 30 g 与适量的水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甘、微酸。

【鉴别】 取本品，置显微镜下观察：草酸钙簇晶甚多，存在于无色薄壁细胞中，有时数

个排列成行，无色不规则与枝状块易见，遇水合氯醛液溶化，菌丝无色或淡棕色，直径3~8 μm。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 补肾纳气。用于肾气不足，喘促气短，肾虚咳嗽。

【用法与用量】 口服 一次9g 一日2次

【注意】 外感咳嗽、气喘者忌服。

【规格】 每40粒重约3g

【贮藏】 密闭，防潮。

浙Q/WS-10-83

七制香附丸

Qizhi Xiangfu Wan

【处方】	香 附	700 g	山 棱	50 g
	当 归	100 g	红 花	50 g
	莪 术	100 g	牡丹皮	50 g
	乌 药	100 g	元 胡	50 g
	艾 叶	50 g	柴 胡	50 g
	川 芎	50 g	乌 梅	50 g

【制法】 以上十二味，除香附外，其余当归等十一味，加米泔水与水煎煮2次，每次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至稠膏状；将香附分别依次用黄酒50ml、醋50ml、盐汤（内含食盐25g）煎煮，俟吸收至干后，与上述稠膏搅匀，干燥，粉碎成细粉，过筛，加麦粉（蒸）75g，混匀。用水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的浸膏丸，气微香，味苦、微辛。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（附录6页）。

【功能与主治】 理气，活血，调经。用于七情郁结，月经不调，血寒经迟，腹中胀痛。

【用法与用量】 口服 一次9g 一日2次

【注意】 忌食酸冷辛辣食物。

【规格】 每40粒重约3g

【贮藏】 密闭，防潮。

浙Q/WS-11-83

七宝美髯丸(补肾养血丸)

Qibao Meiran Wan

【处方】	首 乌 ^[注1]	640 g	补骨脂 ^[注2]	160 g
	菟丝子(炒)	160 g	枸杞子	160 g

当 归	160 g	茯 苓	160 g
怀牛膝	160 g		

【制法】 以上七味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100 g 粉末加炼蜜40 g 与适量的水泛丸，干燥，即得。

【性状】 本品为黑褐色的水蜜丸；气微香，味甘、微苦、涩。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 6 页)。

【功能与主治】 滋补肝肾，补益气血。用于气血两亏，须发早白，肾虚遗精，腰酸背痛。

【用法与用量】 口服 一次 9 g 一日 2 次

【规格】 每40粒重约 3 g

【贮藏】 密闭，防潮。

注 1：首乌的炮制 取首乌640 g，加黑豆480 g，拌匀蒸透后，除去黑豆，干燥，即得。

注 2：补骨脂的炮制 取补骨脂160 g，加黑芝麻80 g，拌炒后，除去黑芝麻，即得。

浙 Q/WS-12-83

七宝美髯冲剂

Qibao Meiran Chongji

【处方】 首 乌(制)	640 g	菟丝子(炒)	160 g
当 归	160 g	牛 膝	160 g
补骨脂(炒)	160 g	枸杞子	160 g
茯 苓	160 g		

【制法】 以上七味，菟丝子照流浸膏项下的渗漉法(中国药典一部附录11页)，用60%乙醇作溶剂，浸渍48小时以上，以每分钟 2~5ml 的速度渗漉，收集漉液，回收乙醇，并浓缩成比重约1.10的流浸膏；其余首乌等六味加水煎煮 2 次，第一次 3 小时，第二次 2 小时，合并煎液，静置，取上清液浓缩至适量，加入上述菟丝子流浸膏，搅匀，继续浓缩成比重为1.13~1.14的清膏，加入蔗糖粉1700 g、糊精190 g，搅匀，制粒，干燥，即得。

【性状】 本品为黄棕色的颗粒；味甜、微苦、涩。

【检查】 应符合冲剂项下有关的各项规定(附录 8 页)。

【功能与主治】 滋补肝肾，补益气血。用于气血两亏，头发早白，肾虚遗精，腰酸背痛。

【用法与用量】 开水冲服 一次 1 袋 一日 2 次

【规格】 每袋 8 g

【贮藏】 密封，防潮。

浙 Q/WS-13-83

人 丹

Rendan

【处方】 薄荷脑	40 g	木 香	15 g
----------	------	-----	------

冰 片	30 g	草豆蔻	25 g
干 姜	25 g	小茴香	15 g
高良姜	15 g	儿 茶	100 g
肉 桂	40 g	糯米粉 ^[注]	150 g
丁 香	25 g	银 朱	10 g
甘 草	500 g	苯甲酸钠	3 g

【制法】 以上十四味，薄荷脑、冰片，加乙醇适量溶解后，密闭备用；取部分儿茶加水煮沸使溶解，滤过，加苯甲酸钠，搅拌溶解后备用；剩余的儿茶与高良姜、干姜、小茴香、草豆蔻、木香、丁香、甘草、肉桂粉碎成细粉，过筛，加蒸熟的糯米粉，混匀。依次用上述2种备用溶液泛丸，滑石粉适量盖面，低温干燥，用适量活性炭与银朱包衣，打光，即得。

【性状】 本品为棕红色光亮的糊丸；气香，味微甜，有清凉感。

【检查】 挥发油 取本品约20 g，研碎，精密称定，照挥发油测定法(中国药典一部附录16页甲法)测定，含挥发油不得少于5.5%(ml/g)。

水分 取本品约20 g，研细，精密称定，照水分测定法(中国药典一部附录15页甲苯法)测定，含水分不得过10%(ml/g)。

灰分 取本品3～5 g，研碎，照灰分测定法(中国药典一部附录15页)测定，含灰分不得过6.5%。

酸不溶性灰分 取灰分项下的遗留物照酸不溶性灰分测定法(中国药典一部附录16页)测定，含酸不溶性灰分不得过1.5%。

【功能与主治】 祛风舒气，生津健胃。用于晕船、晕车及高温闷热所引起的不适和消化不良。

【用法与用量】 口服或含服 一次4～8粒

【规格】 每75粒重约3 g

【贮藏】 密闭，在阴凉干燥处保存。

注：系禾本科植物糯稻 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum 的种子磨成的粉。

浙 Q/WS-14-83

人 参 片

Renshen Pian

本品每片相当于人参0.26 g。

【制法】 取糖参粉碎成细粉，过筛。上述粉末260 g加淀粉65 g混匀，制粒，干燥，压制1000片，即得。

【性状】 本品为淡黄白色生药片；气微，味甜、微苦。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定(附录7页)。

【功能与主治】 益气安神，固脱生津。用于元气虚弱，食少倦怠，自汗暴脱，肺虚气喘，惊悸健忘，消渴崩漏。

【用法与用量】 口服 一次3～5片 一日2次 或遵医嘱

【贮藏】 密闭，在阴凉干燥处保存。