

# 妇产科护理学（中级）资格考试



人民军医出版社

# 妇产科护理学（中级）资格考试 模拟试卷一



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

## 专业知识

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 适于念珠菌阴道炎冲洗阴道的是  
A. 0.5%醋酸  
B. 1%乳酸  
C. 氯己定（洗必泰）  
D. 呋喃西林  
E. 2%~4%碳酸氢钠溶液
2. 宫口开全超过 2 小时，胎儿还未娩出为  
A. 第三产程延长  
B. 潜伏期停滞  
C. 胎盘滞留  
D. 滞产  
E. 活跃期延长
3. 属于宫颈癌早期典型症状的是  
A. 不规则阴道出血  
B. 接触性出血  
C. 血性白带  
D. 阴道排液  
E. 恶病质
4. 双胎妊娠的并发症不包括  
A. 容易并发妊娠高血压综合征  
B. 容易发生前置胎盘  
C. 容易发生产后出血  
D. 容易合并羊水过多  
E. 容易发生过期妊娠
5. 臀位阴道分娩的说法不正确的是  
A. 临产后卧床休息  
B. 严密胎心监护  
C. 不适宜灌肠  
D. 少做肛门检查  
E. 阴道口见胎足，为宫颈口开全
6. 正式临产的主要表现是  
A. 见红  
B. 胎头衔接  
C. 排便感  
D. 有规律的子宫收缩  
E. 宫颈口扩张
7. 新生儿 Apgar 评分指标不包括  
A. 呼吸  
B. 体温  
C. 喉反射  
D. 皮肤颜色  
E. 肌张力
8. 临产后不正确的处理是  
A. 产妇入分娩室后，再次清洁、消毒外阴  
B. 一人一巾  
C. 指导产妇用腹压  
D. 当胎头着冠时，指导病人开始向下屏气  
E. 严密监测胎心
9. 早孕反应不包括  
A. 停经  
B. 尿频  
C. 恶心、呕吐  
D. 腹泻  
E. 乳头刺痛
10. 对妊娠合并肝炎孕妇临产后的处理不正确  
A. 分娩时应在隔离产房  
B. 分娩时留脐血查新生儿肝功能  
C. 新生儿注射乙肝疫苗  
D. 提倡母乳喂养，产后都需哺乳

- E. 预防产后出血
11. 异常胎位中临床最常见的是
- A. 臀先露
  - B. 骶先露
  - C. 颈先露
  - D. 持续性枕横位
  - E. 持续性枕后位
12. 产程中保护会阴的方法不正确的是
- A. 接生者站在产妇右侧
  - B. 胎头着冠时，开始保护会阴
  - C. 宫缩间歇时保护会阴手不放开
  - D. 胎头娩出后，继续保护会阴
  - E. 双肩娩出后，保护会阴结束
13. 对分娩过程描述不正确的是
- A. 规律性宫缩标志产程正式开始
  - B. 第二产程为胎儿娩出期
  - C. 潜伏期约需 16 小时
  - D. 活跃期平均约需 4 小时
  - E. 破膜多在第一产程末
14. 人工破膜的适应证正确的是
- A. 初产妇宫口开大 5cm 以后不宜行人工破膜
  - B. 经产妇宫口开在 2cm 时，行人工破膜
  - C. 初产妇宫口近开全时行人工破膜
  - D. 有急产史者，一般在宫口开大 3cm 内行人工破膜
  - E. 有协调性宫缩乏力倾向者，可行人工破膜
15. 臀先露孕妇，护士指导行外倒转术的最适宜时间是
- A. 妊娠 24~28 周
  - B. 妊娠 28~32 周
  - C. 妊娠 32~36 周
  - D. 妊娠 36~40 周
  - E. 临产时
16. 不属于子宫收缩异常的是
- A. 协调性宫缩乏力
  - B. 不协调性宫缩乏力
  - C. 病理性缩复环
  - D. 生理性缩复环
  - E. 宫缩过强
17. 胎儿发育的特征不正确的是
- A. 妊娠 8 周末，内脏器官的原基已形成
  - B. 妊娠 12 周末，胎儿外生殖器已发育
  - C. 妊娠 16 周末，可确定胎儿性别
  - D. 妊娠 20 周末，内脏器官已发育齐全
  - E. 妊娠 28 周末，可以存活
18. 对胎心音的描述不正确的是
- A. 正常胎心音 120~160 次 / 分
  - B. 右骶前位在脐上两侧听取
  - C. 横位在脐周围听取
  - D. 头先露在母腹上两侧听取
  - E. 妊娠 6 个月前，在正中线上听到
19. 下面乳房的变化与妊娠无关的是
- A. 蒙氏结节
  - B. 乳头增大并变黑
  - C. 乳头凹陷
  - D. 妊娠晚期可挤出稀薄黄色液体
  - E. 乳晕颜色加深
20. 推算预产期的方法除外
- A. 末次月经第 1 日
  - B. 早孕反应出现的日期
  - C. 自觉胎动时间
  - D. 测量宫底高度
  - E. 测量腹围值
21. 枕前位分娩机制在第二产程时的表现不正确的是
- A. 排便感
  - B. 肛门括约肌紧缩
  - C. 胎头拨露
  - D. 胎头着冠
  - E. 会阴极度扩张

22. 淋病的临床表现正确的是
- A. 潜伏期长达 3~5 周
  - B. 病理分急性和慢性两种
  - C. 血性白带
  - D. 慢性淋病时, 淋菌存在于生殖器分泌物中
  - E. 感染初期病变局限于上生殖道
23. 判断宫颈糜烂程度的依据是
- A. 糜烂深浅
  - B. 肥大程度
  - C. 糜烂面积
  - D. 病理报告
  - E. 临床经验
24. 妊娠晚期, 孕妇心率每分钟可加快
- A. 4~5 次
  - B. 10~15 次
  - C. 15~20 次
  - D. 20~25 次
  - E. 25~30 次
25. 胎儿在子宫内的姿势除外
- A. 胎头俯屈
  - B. 下额贴近胸壁
  - C. 脊柱伸直
  - D. 双脚蜷起
  - E. 两臂抱拢胸前
26. 初产妇, 27 岁, 妊娠 36+3 周, 外伤导致重症胎盘早剥, 现宫口开大 4cm, 最佳的处理方法是
- A. 抗休克治疗
  - B. 阴道助产
  - C. 抗休克同时给予抗凝药
  - D. 剖宫产
  - E. 静脉滴注缩宫素
27. 临产后导致子宫颈口扩张的原因是
- A. 先露部的压迫
  - B. 子宫下段阻力
  - C. 子宫收缩力
  - D. 羊水的传导
  - E. 以上均对
28. 妊娠 24 周末, 宫底的位置在
- A. 脐上 1 横指
  - B. 脐下 1 横指
  - C. 平脐
  - D. 脐上 2 横指
  - E. 剑突下 2 横指
29. 胎先露与指示点的对应关系不正确的是
- A. 额先露——额骨
  - B. 枕先露——枕骨
  - C. 臀先露——臀部
  - D. 肩先露——肩胛骨
  - E. 面先露——颞骨
30. 构成骨盆的是
- A. 1 块髌骨、2 块骶骨、1 块尾骨
  - B. 2 块髌骨、1 块骶骨、1 块尾骨
  - C. 1 块髌骨、2 块骶骨、2 块尾骨
  - D. 2 块髌骨、2 块骶骨、1 块尾骨
  - E. 2 块髌骨、2 块骶骨、2 块尾骨
31. 整个分娩过程中一直存在的动作是
- A. 俯屈
  - B. 内旋转
  - C. 外旋转
  - D. 下降
  - E. 衔接
32. 临床定义妊娠达 42 周或以上分娩者为
- A. 滞产
  - B. 过期产
  - C. 难产
  - D. 早产
  - E. 足月产
33. 妊娠足月正常的羊水量为
- A. 500~600ml
  - B. 600~800ml

- C. 800~1 000ml  
D. 1 000~1 200ml  
E. 1 001~1 500ml
34. 粗线结扎法断脐的位置是  
A. 距脐根 1cm 处结扎 1 道粗丝线  
B. 距脐根 2cm 处结扎 1 道粗丝线  
C. 距脐根 0.5cm 处及 1.0cm 处分别结扎 2 道粗丝线  
D. 距脐根 1cm 处及 2cm 处结扎 2 道粗丝线  
E. 距脐根 1cm、2cm 及 3cm 处结扎 3 道粗丝线
35. 会阴侧切伤口坐浴的适宜时间是  
A. 产后 3 天  
B. 产后 5 天  
C. 产后 7 天  
D. 产后 10 天  
E. 产后 14 天
36. 早早孕药物流产适用于妊娠  
A. 42 天内  
B. 49 天内  
C. 56 天内  
D. 60 天内  
E. 35 天内
37. 以下产科复诊项目一般不重复的是  
A. 测腹围  
B. 测体重  
C. 电子胎心监测  
D. 胎方位  
E. 骨盆外测量
38. 妊娠 8 周不可能出现的是  
A. 黑格征  
B. 晨起恶心、呕吐  
C. 乳晕着色  
D. 子宫体增大，于耻骨联合上方可扪及  
E. 停经
39. 继发不孕的诊断正确的是  
A. 结婚 3 年，未避孕未孕  
B. 结婚 1 年，未避孕，未孕  
C. 结婚 5 年，3 年前人工流产，现 2 年未避孕未孕  
D. 结婚 5 年，自然流产 2 次，至今 1 年未孕  
E. 结婚 3 年，避孕套避孕，未孕
40. 侵蚀性葡萄胎临床最常见的转移部位是  
A. 脑  
B. 肾  
C. 阴道  
D. 肺  
E. 骨
41. 早期卵巢肿瘤的最佳治疗方案是  
A. 激素治疗  
B. 放疗  
C. 化疗  
D. 手术治疗  
E. 免疫治疗
42. 临床最常见的阴道炎是  
A. 滴虫阴道炎  
B. 急性念珠菌性阴道炎  
C. 淋菌性阴道炎  
D. 老年急性阴道炎  
E. 急性外阴炎
43. 分娩时损伤会阴及部分肛门括约肌，其临床分度为裂伤  
A. I a 度  
B. II a 度  
C. I b 度  
D. II b 度  
E. III 度
44. 分娩过程中，胎头矢状缝停留在骨盆横径上而不能向前转动，称为  
A. 持续性枕横位  
B. 持续性枕后位

- C. 枕左后位  
D. 颞后位  
E. 持续性枕右后位
45. 以下炎症性疾病需要夫妇配合同时治疗的是  
A. 老年性阴道炎  
B. 慢性宫颈炎  
C. 念珠菌阴道炎  
D. 滴虫阴道炎  
E. 慢性盆腔炎
46. 正常妊娠晚期羊水中不包括  
A. 性激素  
B. 胎脂  
C. 毳毛  
D. 胎粪  
E. 脱落的上皮细胞
47. 前置胎盘附着的位置是  
A. 子宫底部  
B. 子宫体后壁  
C. 子宫颈内口  
D. 子宫体前壁  
E. 子宫体侧壁
48. 以下对于流产的描述正确的是  
A. 妊娠 8 周前的流产, 多为先兆流产  
B. 妊娠 8~12 周的流产, 多为完全流产  
C. 难免流产时胚胎完全排出体外  
D. 难免流产是由不全流产发展而来  
E. 不全流产容易发生失血性休克
49. 臀位阴道分娩, 脐部娩出后不能超过  
A. 4 分钟  
B. 8 分钟  
C. 12 分钟  
D. 15 分钟  
E. 20 分钟
50. 早期子宫颈癌的确诊方法是  
A. 宫颈涂片  
B. 宫颈碘试验  
C. 阴道镜检  
D. 宫颈活检  
E. CEA 检测
51. 先露部在坐骨棘以上 2cm, 正确的记录是  
A. +2cm  
B. -2cm  
C. 0cm  
D. -3cm  
E. +3cm
52. 对横位的描述不正确的是  
A. 属于异常胎位  
B. 宫缩加强出现低于脐部的病理收缩环  
C. 破膜后, 宫缩加强, 出现嵌顿性横位  
D. 横位不及时处理, 导致子宫破裂  
E. 导致难产
53. 以下临床最常见的臀位是  
A. 单足先露  
B. 单臀先露  
C. 双足先露  
D. 完全臀先露  
E. 混合臀先露
54. 属于先兆子宫破裂的特征性表现的是  
A. 痉挛性狭窄环  
B. 病理缩复环  
C. 生理性缩复环  
D. 协调性宫缩乏力  
E. 胎位触诊清晰
55. 骨盆入口狭窄者, 不可以试产的胎位是  
A. 枕后位  
B. 枕横位  
C. 枕左前位  
D. 骶前位  
E. 枕右前位
56. 孕妇, 29 岁, 双胎妊娠, 孕 34+2 周,

该孕妇常见并发症不包括

- A. 易发生贫血
- B. 易并发产前出血
- C. 易早产
- D. 易并发羊水过多
- E. 易孕过期

57. 以下绝经后妇女疾病可见血性白带的是

- A. 宫颈糜烂
- B. 宫颈息肉
- C. 外阴炎
- D. 老年性阴道炎
- E. 慢性盆腔炎

58. 经产妇，30岁，宫口开全1小时，胎头下降无进展是

- A. 第二产程停滞
- B. 滞产
- C. 第二产程延长
- D. 活跃期延长
- E. 潜伏期延长

59. 外阴炎适宜的处理方案是

- A. 生理盐水阴道冲洗
- B. 肥皂水会阴擦洗
- C. 保持外阴清洁干燥，用1:5000高锰酸钾坐浴
- D. 选用抗生素全身治疗
- E. 用1%乳酸液做阴道灌洗

60. 胎儿宫内窘迫的临床表现不包括

- A. 每小时胎动小于3次
- B. 胎动频繁
- C. 羊水III度污染
- D. 孕妇尿E3值为24.29mol/24小时
- E. NST胎动时胎心率加速16bpm

61. 下列情况发生母婴血型概率高的是

- A. 母A型，父O型
- B. 母AB型，父O型
- C. 母O型，父B型

D. 母AB型，父A型

E. 母B型，父O型

62. 诊断性刮宫刮取的组织是

- A. 子宫内膜
- B. 子宫浆膜
- C. 子宫肌层
- D. 输卵管内膜
- E. 阴道内膜

63. 适于较大的前庭大腺囊肿的治疗方法是

- A. 药液坐浴
- B. 局部抗生素
- C. 局部热敷
- D. 囊肿造口术
- E. 手术切开

64. 泡沫样白带见于

- A. 宫颈糜烂
- B. 滴虫阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 念珠菌性阴道炎
- E. 外阴炎

65. 下列配对正确的是

- A. 念珠菌阴道炎——血性白带
- B. 细菌性阴道炎——泡沫白带
- C. 滴虫阴道炎——脓性白带
- D. 老年性阴道炎——豆渣样白带
- E. 宫颈癌晚期——米汤样白带

66. 滞产是总产程超过

- A. 36小时
- B. 32小时
- C. 28小时
- D. 26小时
- E. 24小时

67. 早孕恶心呕吐多发生于

- A. 晨起
- B. 进餐后
- C. 进餐前

- D. 空腹时  
E. 活动后
68. 胎动正常是指 12 小时胎动超过  
A. 10 次  
B. 15 次  
C. 25 次  
D. 30 次  
E. 40 次
69. 产后子宫底降至盆腔的正常时间为  
A. 5 天  
B. 10 天  
C. 12 天  
D. 14 天  
E. 18 天
70. 慢性盆腔炎患者出现下列情况应立即手术的是  
A. 月经紊乱  
B. 输卵管增粗  
C. 不孕  
D. 炎性包块久治无效  
E. 高热
71. 孕妇, 25 岁。妊娠 10 周, 出现厌食、恶心、呕吐及右上腹疼痛, 皮肤黄疸, 肝功能检查均高于正常, 乙型表面抗原阳性, 该孕妇最可能的情况是  
A. 妊娠剧吐  
B. 早孕反应  
C. 妊娠合并急性脂肪肝  
D. 妊娠合并乙型肝炎  
E. 急性甲型肝炎
72. 初孕妇, 27 岁。停经 56 天, 阵发性腹痛伴阴道出血 2 天, 妇科检查: 子宫饱满, 双附件(-), 宫口开大 1cm, 该孕妇最可能发生了  
A. 先兆流产  
B. 难免流产  
C. 稽留流产  
D. 不全流产  
E. 习惯性流产
73. 女, 32 岁, 停经 7 周开始有厌食, 恶心, 1 周后呕吐频繁, 不能进食, 近 2 天饮水也吐, 尿量少, 无发热, 精神萎靡, 皮肤干燥, 妇科检查: 宫体如孕 7 周大小, 宫体软, 附件(-), 实验室检查: 妊娠试验(+) 尿酮体(+++), 该患者最可能的情况为  
A. 妊娠合并肝炎  
B. 妊娠剧吐  
C. 葡萄胎  
D. 正常孕吐  
E. 妊娠合并肾衰竭
74. 女, 31 岁。G1P0, 因阴道大量出血, 呈休克状态急诊入院。妇科检查: 阴道内有胚胎样组织, 宫体 6 周妊娠大小, 两侧附件(-)。对该患者优先的处理措施是  
A. 阴道后穹窿穿刺  
B. 腹腔穿刺  
C. 急诊剖腹探查  
D. 抗休克同时行刮宫术  
E. 宫腔镜下止血
75. 产妇, 29 岁。顺产后 6 个月, 哺乳, 月经未复潮, 要求避孕, 妇科检查为子宫正常大小, 无压痛, 活动, 双附件(-), 护士告知不适于该产妇的避孕方式是  
A. 口服避孕药  
B. 女用安全套  
C. 安全套  
D. 宫内节育器  
E. 体外排精
76. 初产妇, 24 岁。胎盘娩出后阴道出血不断, 时多时少, 1 小时出血量超过 600ml, 血压 68/45mmHg, 脉搏 120 次/分。首选的急救措施是  
A. 检查软产道, 立即缝合

- B. 为阴道血肿，立即处理
- C. 检查凝血功能，并输纤维蛋白原
- D. 静脉滴注麦角新碱加强宫缩
- E. 立即输血

77. 孕妇，32岁。妊娠34+4周，阴道少量出血2天，胎心152次/分。肛门检查：宫口扩张可容指尖，胎头先露，高浮。该孕妇最可能发生了

- A. 先兆流产
- B. 先兆早产
- C. 早产
- D. 产前子痫
- E. 前置胎盘

78. 女，30岁。已婚，停经35天后不规则阴道出血8天，伴右下腹剧痛。检查：体温37.2℃，脉搏108次/分，血压120/80mmHg，阴道见少量暗红色积血，宫颈轻度糜烂，举痛，子宫正常大小，右侧附件扪及约4cm的肿块，边界不清。首要的急救措施是

- A. 抗生素
- B. 扩容
- C. 静脉输液、输血
- D. 吸氧
- E. 口服止血药

79. 女，29岁。已婚，现停经56天，少量阴道出血3天，无早孕反应。妇科检查：宫口闭，子宫如孕周大小，软，双附件（-）。该患者最可能的情况是

- A. 难免流产
- B. 感染流产
- C. 先兆流产
- D. 完全流产
- E. 习惯流产

80. 女，47岁。性交后阴道出血2个月，宫颈重度糜烂，该患者最可能发生了

- A. 宫颈癌
- B. 围绝经期

- C. 外阴溃疡
- D. 阴道癌
- E. 功能性子宫出血

81. 女，24岁。已婚，月经规律，停经42天。近感食欲缺乏、恶心，该患者最可能的情况是

- A. 异位妊娠
- B. 妊娠
- C. 子宫肌瘤
- D. 葡萄胎
- E. 继发性闭经

82. 女，30岁。周期28~32天，因停经54天，少量阴道出血伴下腹痛2天入院。妇科检查：阴道有少量暗褐色血液，宫颈着色、举痛，子宫增大，右侧附件增厚，压痛。今晨突感下腹疼痛加剧，经检查诊断输卵管妊娠破裂，此时应采取的急救措施是

- A. 肌肉注射维生素K
- B. 手术治疗
- C. 静脉滴注抗生素
- D. 抗休克治疗
- E. 输血

83. 孕妇，28岁。妊娠38+3周，因血压150/100mmHg收入院。检查：一般情况好，下肢水肿（+），尿蛋白（+），胎儿正常。治疗过程中首选药为

- A. 硫酸镁
- B. 呋塞米
- C. 水合氯醛
- D. 利血平
- E. 甘露醇

84. 妇科检查：宫颈炎外口表面光滑，但四周呈鲜红色。护士判断为

- A. 宫颈正常
- B. 宫颈肥大
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈糜烂

E. 宫颈腺体囊肿

85. 初产妇, 26岁, 足月临产, 破膜后不久突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀、数分钟后死亡。该产妇最可能发生了

- A. 子痫
- B. DIC
- C. 羊水栓塞
- D. 重型胎盘早剥
- E. 子宫破裂

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(86~87 题共用题干)

女, 48岁, 3天前到公共浴室盆浴后, 发现外阴瘙痒, 白带多, 检查: 白带稀薄, 泡沫样, 阴道壁充血, 宫颈光滑。

86. 该患者最可能的情况是

- A. 滴虫阴道炎
- B. 真菌性阴道炎
- C. 外阴炎
- D. 淋菌性阴道炎
- E. 非特异性阴道炎

87. 确诊首选

- A. 双合诊
- B. 细菌培养
- C. 血常规
- D. 白带悬滴检查
- E. 宫颈黏液检查

(88~90 题共用题干)

女, 53岁。未生育, 已绝经4年, 近2个月来, 白带增多, 水样, 有时为血性, 妇科检查: 子宫略大, 质软。

88. 该患者可能发生了

- A. 宫颈癌
- B. 老年阴道炎
- C. 子宫内膜癌
- D. 慢性盆腔炎
- E. 子宫肌瘤

89. 该患者的最佳治疗方案是

- A. 免疫疗法
- B. 化疗为主
- C. 放疗为主
- D. 手术治疗为主
- E. 激素治疗

90. 确诊的方法是

- A. 白带悬滴检查
- B. 分泌物细菌培养
- C. 宫颈组织检查
- D. 分段刮宫病理检查
- E. 宫颈细胞学检查

(91~94 题共用题干)

女, 42岁。糖尿病4年, 近日发现外阴瘙痒, 白带多, 检查: 白带黏稠, 典型豆腐渣样, 阴道壁充血, 宫颈光滑。

91. 该患者最可能发生了

- A. 非特异性阴道炎
- B. 外阴阴道假丝酵母菌
- C. 老年性阴道炎
- D. 宫颈糜烂
- E. 淋菌性阴道炎

92. 确诊首选的辅助检查是

- A. 双合诊
- B. 尿培养
- C. 阴道窥器检查
- D. 白带悬滴检查
- E. 宫颈脱落细胞检查

93. 局部溶液冲洗应选

- A. 0.5%醋酸
- B. 2%~4%碳酸氢钠

- C. 1:5 000 苯扎溴铵
- D. 1:5 000 高锰酸钾
- E. 呋喃西林

94. 镜检发现假菌丝，首选药物

- A. 链霉素
- B. 制霉菌素
- C. 甲硝唑
- D. 曲古霉素
- E. 红霉素

三、以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(95~98 题共用备选答案)

- A. 子宫肌瘤较小，无症状或已近绝经期

- B. 宫颈原位癌
- C. 晚期子宫内膜癌
- D. 单个较大肌瘤
- E. 绝经期前后的卵巢癌
- 95. 全子宫及双附件切除术适于
- 96. 放疗适于
- 97. 药物治疗随访观察适于
- 98. 全子宫切除术适于

(99~100 题共用备选答案)

- A. 卵巢黄素囊肿
- B. 葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 卵巢黄体囊肿
- E. 巧克力囊肿
- 99. 滋养细胞水泡状增生见于
- 100. 卵巢颗粒细胞及卵泡膜细胞在大量绒毛膜促性腺激素刺激下形成

## 专业实践能力

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 卵巢肿瘤最常见的并发症是

- A. 扭转
- B. 出血
- C. 破裂
- D. 感染
- E. 恶变

2. 带铜宫内节育器 Tcu200 在临床无症状时可放置的时间是

- A. 5 年
- B. 8 年
- C. 12 年

- D. 16 年
- E. 20 年

3. 滋养细胞肿瘤患者应选择的最佳避孕方式是

- A. 运用体外排精
- B. 使用阴茎套
- C. 安全期避孕
- D. 口服药物避孕
- E. 放置宫内节育器

4. 恶性滋养细胞肿瘤阴道转移病人进行第一次阴道填塞后，取纱条的时间不宜超过

- A. 18 小时
- B. 24 小时
- C. 30 小时
- D. 36 小时

- E. 42 小时
5. 宫颈黏液排卵前特征性变化是
- 黏液分泌量减少
  - 黏液中氯化钠含量低
  - 黏液稠厚
  - 黏液呈稀薄、透明似蛋清状
  - 黏液涂片检查可见卵圆体
6. 先兆临产中预示分娩最可靠的是
- 见红
  - 破水
  - 胎儿下降感
  - 不规律宫缩
  - 排便感
7. 护士判断产程最重要的依据是
- 宫缩的变化
  - 宫颈口扩张
  - 胎头下降程度
  - 胎动变化
  - 临产发动时间
8. 胎盘剥离的征象除外
- 外露的脐带不再回缩
  - 阴道出血
  - 子宫底下降
  - 子宫体变硬呈球形
  - 脐带自动下降
9. 产后子宫颈恢复至孕前状态需
- 6 天
  - 2 周
  - 3 周
  - 4 周
  - 8 周
10. 产后子宫新生内膜, 除胎盘附着处外, 完全修复的时间是
- 6 天
  - 2 周
  - 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周
11. 产妇过早参加体力劳动易发生
- 会阴伤口撕裂
  - 晚期产后出血
  - 产褥期感染
  - 阴道壁膨出
  - 子宫复旧不良
12. 一般孕妇自觉有胎动的时间是在妊娠
- 10~14 周
  - 14~16 周
  - 16~18 周
  - 18~20 周
  - 20~24 周
13. 正式临产的重要标志是
- 见红
  - 规律宫缩
  - 胎膜破裂
  - 排便感
  - 阵发性疼痛
14. 正常枕先露分娩机制的顺序是
- 下降、衔接、内旋转、仰伸复位、俯屈、外旋转
  - 衔接、俯屈、下降、内旋转、仰伸复位、外旋转
  - 下降、衔接、内旋转、俯屈、仰伸复位、外旋转
  - 衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸复位、外旋转
  - 衔接、下降、外旋转、俯屈、仰伸复位、内旋转
15. III 度羊水污染特点是
- 羊水呈绿色透明
  - 羊水呈黄色稠厚
  - 羊水呈黄绿色
  - 羊水呈浑浊棕黄色

- E. 羊水呈浑浊黄绿色
16. 最常发生异位妊娠破裂的是
- A. 宫颈妊娠
  - B. 输卵管峡部妊娠
  - C. 输卵管壶腹部妊娠
  - D. 卵巢妊娠
  - E. 宫角妊娠
17. 临床导致产后出血的主要原因是
- A. 子宫收缩乏力
  - B. 宫颈撕裂伤
  - C. 胎盘残留
  - D. 血友病孕妇
  - E. 会阴Ⅲ度裂伤
18. 胎儿窘迫的临床表现除外
- A. 胎心率 120 次/分
  - B. 胎动 1~2 次/小时
  - C. 羊水稠厚
  - D. 胎心监护异常
  - E. 头皮血气 pH7.0
19. 胎心监护出现变异减速大多因为
- A. 胎儿畸形
  - B. 羊水污染
  - C. 胎盘功能不全
  - D. 脐带方面的异常
  - E. 胎儿慢性宫内缺氧
20. 硫酸镁中毒，护士最先观察到的是
- A. 呼吸降低
  - B. 尿量减少
  - C. 心率减缓
  - D. 膝腱反射消失
  - E. 全身肌张力减退
21. 前庭大腺脓肿的治疗方案是
- A. 冷敷，局限炎症
  - B. 局部抗生素治疗
  - C. 坐浴
  - D. 局部理疗
  - E. 切开引流
22. 滴虫阴道炎治愈的标准是
- A. 治疗后月经期前复查为阴性
  - B. 治疗后，每次月经期后复查，连续 2 次均为阴性
  - C. 治疗后，每次月经期前复查，连续 3 次均为阴性
  - D. 治疗后，每次月经期后复查，连续 3 次均为阴性
  - E. 治疗 1 周后，连续 2 次复查均为阴性
23. 滴虫阴道炎典型症状是
- A. 血性白带
  - B. 尿路感染症状
  - C. 阴道分泌物增加伴瘙痒
  - D. 脓性白带
  - E. 阴道黏膜充血
24. II 度子宫脱垂表现为
- A. 排尿困难
  - B. 下坠感
  - C. 阴道有肿物脱出
  - D. 白带稠厚
  - E. 血性白带
25. 女，48 岁，性交后出血 2 个月。检查宫颈重度糜烂，该患者最可能的情况是
- A. 宫颈癌
  - B. 围绝经期功血
  - C. 子宫内膜癌
  - D. 阴道癌
  - E. 绒毛膜癌
26. 产后 2 小时内产后出血的发生率占
- A. 45%
  - B. 55%
  - C. 65%
  - D. 70%
  - E. 80%
27. 原发性痛经的主要原因是

- A. 子宫后倾  
 B. 子宫偏寒  
 C. 雌激素分泌增加  
 D. 前列腺素分泌增加  
 E. 促黄体生成素分泌增加
28. 以下各类闭经中，临床最常见的是  
 A. 垂体性闭经  
 B. 卵巢性闭经  
 C. 子宫性闭经  
 D. 下丘脑性闭经  
 E. 原发性闭经
29. 淋病的首选抗生素是  
 A. 青霉素  
 B. 红霉素  
 C. 庆大霉素  
 D. 阿奇霉素  
 E. 万古霉素
30. 淋病治愈标准是  
 A. 临床症状消失  
 B. 治疗后 3 天复查分泌物，以后每月复查，连续 2 次阴性  
 C. 治疗后 7 天复查分泌物，以后每周复查，连续 2 次阴性  
 D. 治疗后 7 天复查分泌物，以后每 2 周复查，连续 3 次阴性  
 E. 治疗后 7 天复查分泌物，以后每月复查，连续 3 次阴性
31. 急性盆腔炎的主要临床表现是  
 A. 低热  
 B. 月经紊乱  
 C. 白带增多  
 D. 血性白带  
 E. 后穹隆穿刺抽出脓液
32. B 超可辨别胎儿性别是在妊娠  
 A. 6 周  
 B. 8 周  
 C. 10 周  
 D. 11 周  
 E. 12 周
33. 正常胎心率是每分钟  
 A. 80~90 次  
 B. 100~110 次  
 C. 120~160 次  
 D. 150~180 次  
 E. 200 次
34. 绒毛晚期最常转移的部位是  
 A. 阴道  
 B. 脑  
 C. 骨  
 D. 肝  
 E. 肺
35. 子宫内膜癌临床特征性表现是  
 A. 腰骶部疼痛  
 B. 下腹部胀痛  
 C. 阴道分泌物稠厚  
 D. 经期紊乱  
 E. 绝经后阴道出血
36. 临床将胎盘边缘到达子宫颈内口称为  
 A. 前壁胎盘  
 B. 完全性前置胎盘  
 C. 部分性前置胎盘  
 D. 边缘性前置胎盘  
 E. 中央型前置胎盘
37. 过期妊娠定义为妊娠时间超过  
 A. 37 周  
 B. 38 周  
 C. 39 周  
 D. 41 周  
 E. 42 周
38. 妊娠期总血容量最高比未孕时增加  
 A. 10%~20%  
 B. 20%~30%

- C. 35%~45%  
D. 45%~55%  
E. 55%~65%
39. 妊娠合并轻度贫血的诊断标准是  
A. 血红蛋白<125g/L  
B. 血红蛋白<110g/L  
C. 血红蛋白<90g/L  
D. 血红蛋白<75g/L  
E. 血红蛋白<60g/L
40. 滞产是指总产程超过  
A. 12 小时  
B. 18 小时  
C. 24 小时  
D. 32 小时  
E. 36 小时
41. 以下为胎膜早破常见的原因是  
A. 妊娠合并肝炎  
B. 胎位异常  
C. 前置胎盘  
D. 胎盘早剥  
E. 胎先露衔接不良
42. 妇女更年期最早发生的变化是  
A. 潮热、出汗  
B. 卵巢功能衰退  
C. 下丘脑功能衰退  
D. 骨质疏松  
E. 易激惹
43. 27 岁，停经近 2 个月，妊娠试验(+)，最佳终止妊娠的方法是  
A. 依沙吖啶引产  
B. 吸宫术  
C. 钳刮术  
D. 水囊引产  
E. 药流
44. 以下不适于安全期避孕的是  
A. 子宫肌瘤  
B. 宫颈炎  
C. 月经规律  
D. 夫妇分居  
E. 子宫内膜异位症
45. 以下项目一般不重复测量的是  
A. 测血压  
B. 测腹围  
C. 胎心率  
D. 胎方位  
E. 骨盆外测量
46. 老年期妇女的生理特点不包括  
A. 月经不规律逐渐绝经  
B. 子宫萎缩  
C. 骨质疏松  
D. 阴道上皮变薄  
E. 卵巢功能消退
47. 对于行腰穿治疗的患者，护理措施中不正确的是  
A. 腰穿 4 小时后可下地活动  
B. 腰穿体位为侧卧位，背齐床边，手抱双膝  
C. 术中观察患者一般情况  
D. 颅内压高的患者不宜立即进行腰穿  
E. 治疗后要注意观察病人有无头痛等症状
48. 会阴侧切伤口愈合不良，遵医嘱行坐浴可在产后  
A. 产后 3 天  
B. 产后 5 天  
C. 产后 7 天  
D. 产后 4 天  
E. 产后 2 天
49. 口服短效避孕药的服用时间为  
A. 清晨  
B. 饭前  
C. 睡觉前

- D. 饭后  
E. 性交后
50. 孕妇, 30 岁, 月经规律, 末次月经是 1992 年 3 月 25 日, 护士推算其预产期是
- A. 1992 年 12 月 25 日  
B. 1993 年 1 月 11 日  
C. 1992 年 12 月 30 日  
D. 1993 年 1 月 2 日  
E. 1993 年 2 月 21 日
51. 女性生殖系统的邻近器官除外
- A. 直肠  
B. 尿道  
C. 升结肠  
D. 膀胱  
E. 阑尾
52. 脐带中的脐静脉有
- A. 没有  
B. 4 根  
C. 3 根  
D. 2 根  
E. 1 根
53. 人工流产吸宫术前准备不包括
- A. 手术器械准备  
B. 嘱病人术前排空膀胱  
C. 术前检查血、尿常规  
D. 配血  
E. 术前禁食
54. 妊娠 8 周表现不包括
- A. 子宫颈软, 呈紫蓝色  
B. 停经  
C. 增大的子宫, 可于耻骨联合上方扪及  
D. 妊娠试验阳性  
E. 尿频
55. 月经期的正常表现除外
- A. 恶心、呕吐  
B. 腹痛  
C. 腰骶部坠痛  
D. 情绪不稳定  
E. 乳房胀痛
56. 抢救新生儿窒息的首要步骤是
- A. 清理呼吸道  
B. 面罩吸氧  
C. 胸外心脏按压  
D. 口对口人工呼吸  
E. 脐静脉推注碳酸氢钠
57. 药物流产适应证为妊娠
- A. 45 天内  
B. 42 天内  
C. 35 天内  
D. 50 天内  
E. 56 天内
58. 硫酸镁治疗妊娠高血压综合征时, 其毒性作用不包括
- A. 血压降低  
B. 膝反射消失  
C. 尿量减少  
D. 心率减慢  
E. 呼吸次数减少
59. 有关产程中灌肠的说法不正确的是
- A. 灌肠可以促进宫缩  
B. 灌肠可以清洁肠道  
C. 初产妇在宫口开 3~5cm 时灌肠  
D. 有阴道出血的不适宜灌肠  
E. 胎儿窘迫时, 为加强宫缩, 应灌肠
60. 预防乙肝病毒在围产期传播的措施不包括
- A. 指导肝炎患者愈后半年方可妊娠  
B. 指导健康孕妇预防肝炎  
C. 肝炎孕妇分娩时应严格执行消毒隔离措施  
D. 新生儿出生后要注射乙肝疫苗  
E. 妊娠中晚期并发病毒性肝炎应终止妊娠
61. 孕妇缺钙最常见的表现是