

吳門葉氏咽喉經驗秘方

一枝軒印送



癸卯春喉痧時行患者十不能治一二余竊憂之每
遇此證倍加審慎求所以療此疾而百無疎虞者竟
未有得適周君子怡攜一編出示曰此吾友鐵畊張
君所藏葉氏喉痧經驗本也將有續刊之舉特請序
焉余受而讀之如寐呼覺足以補前書之畧而嘉惠
後學者胥于是乎有賴因思天下事有作之者創于
前尤貴有守之者寶于後苟使先生著是編而無好
學如鐵畊者收而寶之則其傳不久卽寶之而不能
公之雖久不彰而後卒歸于湮沒比比然也余自揣
謏陋抱愧前賢而深幸天士先生救世之苦心歷久

不泯張君又能不匿所藏廣爲推布其均之益于世
爲何如哉

道光癸卯春日吳門後學莘田陳文濤識

此葉氏丹痧經驗方也而於喉證尤詳吾友張君鐵
畊嗜岐黃之道家藏之余不明醫理見之方悟長兒

傳德

之病爛喉痧而殤者誤投犀羚寒涼害之也惜

乎得見此書之晚癸卯春吾鄉喉痧徧行患者輒不
救而是編版久剝蝕手錄不能廣播爰與吾友翻刻
之以體葉公立言濟世之仁心并爲醫門一助云
道光癸卯孟春新邑周桂堂子怡識于蓮溪書屋

散光矣與近春時節因於室于前滿于後滿書氣

之白翳者必有言衛世之口心者意謂門一也云

其動靜歸歟人陳職于職不強強則父與吾文職故

其禍其禍者一也其禍其禍者一也其禍其禍者一也

其禍其禍者一也其禍其禍者一也其禍其禍者一也

其禍其禍者一也其禍其禍者一也其禍其禍者一也

其禍其禍者一也其禍其禍者一也其禍其禍者一也

葉天士先生醫案

程瘦樵原本

雍正癸丑以來有爛喉痧一證發於冬春之際不分老幼遍相傳染發則壯熱煩渴斑密肌紅宛如錦紋咽喉疼痛腫爛一團火熱內熾醫家見其火熱甚也投以犀羚芩連梔膏之類輒至隱伏昏閉或喉爛廢食延挨不治或便瀉內陷轉眼凶危醫者束手病家委之於命孰知初起之時頻進解肌散表溫毒外達多有生者內經所謂微者逆之甚者從之火熱之甚寒涼強遏多致不救良可慨也

張鐵畊家藏

趙逸亭重校

寒氣雖盛冬時不燥夏時不熱

之有土者內藏潤脂燭香並之其香與之火熱之其

香之氣命燭味既燭之熱能致眼脂燭香並之其

香或對不常定對內即轉期內宜留香束于熱寒

對以氣能平氣眼膏之熱轉至熱外習開如如眼

即如寒氣眼脂一團火熱內無潤寒其火熱其事

當於眼脂對藥燭眼脂熱眼脂熱眼脂熱眼脂熱

眼五癢耳以來許眼脂一團熱氣冬春之氣不

寒天士求土習

眼脂熱眼脂

咽喉總論

咽喉者。人身呼吸飲食之門戶也。咽以嚥物。喉以候氣。咽通水穀。接三脘。喉有九節。通五臟。以系肺。方寸之地。受病最險。然其證雖繁。大要總歸於火。蓋少陰君火。少陽相火。其脈並絡於咽喉。故往往爲火證所結聚。君火勢緩。熱結於內。而爲疼。爲腫。相火勢速。則腫甚。不仁而爲痺。痺甚。則不通。痰塞而死。火者。痰之本。痰者。火之標。故言火。則痰在其中。言咽喉。則牙舌亦包於內。夫火有虛實之分。虛者。或因飲酒太過。或因憤怒。或因色慾。火痰上攻。咽舌乾燥。二便如常。少

陰脈微。治宜清潤降火。實者或因過食煎炒炙燂。蘊熱積毒。其證煩渴。二便堅閉。風痰上壅。脈弦而數。治宜先去風痰。後消熱毒。然又宜解不宜遏。否則表證而峻用寒涼。則寒包於外。而熱鬱於中。內證而峻用寒涼。則上熱未除。而中寒復起。縱或腫勢稍退。言語稍通。目前以爲獲效。其禍有不旋踵而至者。

通喉痺論

凡喉證屬痰。屬風。屬熱。多因鬱火而兼熱毒。大要去風痰。解熱開鬱。爲極緊要。至如腫甚不仁。則爲喉痺。喉痺者。喉中呼吸不通。言語不出。此天氣閉塞也。喉

疼噎痛者。咽喉不能納吐爲食。此地氣閉塞也。喉痺
咽噎痛者。咽喉俱病。此天地之氣俱閉塞也。病喉痺
者。必兼咽噎痛。咽噎痛者。未必兼喉痺也。更有暴發
暴死者。名走馬喉痺。俱屬少陰少陽君相二火並熾。
經云。一陰一陽結。謂之喉痺。一陰者。少陰君火。一陽
者。少陽相火。其脈出於肺氣右關。多浮沉而實。此咽
喉之重證也。治宜辛散。佐以苦寒酸利。然亦當觀其
神而審其脈。若元氣衰而虛火旺者。豈可更與辛散
耶。

喉痺論方

喉痺卽纏喉風其腫達於外面。且麻且癢且痛。治宜
辛散。佐以苦寒。鹹寒。牛蒡子。山豆根。射干。黃連。黃柏。
知母。元參。童便。蘇子。麥冬。貝母。甘草。犀角。山茨菇。桔
梗。續隨子。急治有鍼法。吐法。列後。

咽喉之脈。兩寸浮洪而上溢者。喉痺也。此痰火上湧。
脈亦如之。初用翎毛蘸醋攪喉中。摘去痰。蓋味酸能
收痰。隨翎而出。又能消積血。若乳鵝不散。以小刀就
鵝上刺出血。用吹法以散火邪。而內服射干。青黛。甘
草。桔梗。梔子。黃芩。礬石。惡實。大黃之類。以散上焦之
熱。若腫達於外者。必敷以藥。加生地。韭根。汁。伏龍肝。

之類。若生瘡。或白。或赤。其白者多痰。赤者多血。大率與口瘡同例。用薔薇根皮黃栢青黛煎。含細嚙。亦解熱毒。

喉痺惡寒。及寸脈細弱於關尺者。皆爲表證。宜解寒熱。發散之。如水漿不得入口者。解毒雄黃丸五六粒。以醋磨化。灌入口內。吐出濃痰。然後與藥。間以姜汁一匙許。蓋喉痺惡寒者。皆是寒閉於外。熱鬱於中。姜汁散其外寒。則熱得伸而愈。切忌膽礬酸利之味。點喉。反使其陽鬱結不伸。又忌硝黃等寒劑下之。反使其陽下陷入裏。則禍不旋踵矣。東垣云。寸脈不足。乃

陽氣不足。宜用表藥。升提其氣。以助陽也。然此亦言寸脈沉伏而實。小於諸部。而有喉證者。乃可用此法。如果寸脈微小。或元氣耗於上。卽是陽虛。應如肺絕喉痺。斷不可辛散。

喉痺不惡寒。及寸脈實大滑數。有力於關尺者。皆屬下證。宜芫硝青黛等寒藥降之。或白礬等寒劑收之。東垣云。兩寸脈實。爲陽盛陰虛。下之則愈。故用此治急喉痺。如鼓應桴。或三部俱實。亦用此法。

急喉痺。脈數而細微。鼻聲如鼾。喉鳴如鋸者。乃肺絕之候。速宜人參石膏姜汁竹瀝。化開救之。可冀萬

一。

喉痺血壅者。宜茜草一兩煎服。能降血中之火。或用馬鞭草搗自然汁醋和服。或用射干片噉嚙汁下皆破血之劑也。

治法凡例

凡喉證一二日腫痛。三四日內象有形。每到三日必發寒熱。或頭痛。刻刻吹藥。總不可緩。

凡喉證至五日而重。如三日前證雖重。尙未成膿。藥能消散。若過五六日。患處多成膿。縱使穿破。必爛成窠。而難愈。爛處須多用口疳藥。多加龍骨珍珠。

凡喉證勢若輕緩。一二日未卽發寒熱。至第三日憎寒壯熱。其勢必重。須問其大小便通利否。二便若通。此不過浮游之火。宜內服消風清熱降火解毒之劑。卽愈。若二便不通。乃內有實火。非用降火解毒重劑。與通利二便之藥。斷難取效。

凡喉證初起。一二日用碧丹。漸漸加多金丹。勢凶者金丹爲君。或單用金丹。方能鉤出頑痰。

凡喉證先碎。須先用生肌散。然後用碧丹。

凡喉證必俟大便去後。方可望痊。如大便閉結。不可輕許。

凡吹藥必連吹四五管方可出痰。出痰三四次乃可全愈。初管必多用金丹爲要。

凡吹藥非但腫破患處要吹。四圍好肉上亦要吹。方不延開。

凡唇上乾而難吹者。或用蜜潤。或用溫湯濕之。方可吹。

凡碧丹重證。冰片多於甘草。將愈甘草多於冰片。

凡喉中無形而止喉痛者。燈草灰多用。乳鵝亦宜多用。

凡腮口內腫爛。用筋縛絲綿蘸水輕攪。患處痛者用。

藥必愈。若不知痛者難愈。

凡喉證連胸紅腫。此係肺癰。必用蜜調藥加百藥煎爲妙。

凡舌腫脹滿口。吐舌在外。難以納藥者。用殭蠶牙皂製爲極細末。等分。和勻。用少許吹鼻中。牙關自開。痰涎自出。然後筋捲。綿蘸甘草湯潤其唇舌。後用四味口疳藥。多加上好冰片。頻吹自愈。

凡舌腫大。用生黃栢加冰片敷之。若出血。用炒黃栢加冰片敷之。

凡牙關緊閉。用一字散吹入鼻中。卽吐出頑痰。愈。