

人教版新教材

黄冈

同步学案

高三数学

黄冈市教学创新课题组 编写



陕西师范大学出版社

同步学案

黄冈兵法

编者 石国强

高三数学

陕西师范大学出版社

图书代号:JF4N0387

图书在版编目(CIP)数据

黄冈兵法·高三数学/石国强编. —西安:陕西师范大学出版社,2003.7

ISBN 7-5613-2594-0

I. 黄... II. 石... III. 数学课—高中—教学参考资料

IV. G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 036831 号

责任编辑 张 夏

责任校对 郭健娇

装帧设计 徐 明

出版发行:陕西师范大学出版社

(西安市南郊 陕西师大 120 信箱 邮编 710062)

http://www.snuph.com E-mail:if-centre@snuph.com

印 制:陕西省汉中印刷厂

开本 850×1168 1/32 印张 7.875 插页 2 字数 242 千

版次印次:2004 年 6 月第 2 版 2004 年 6 月第 2 次印刷

定 价:9.50 元

开户行:光大银行西安南郊支行 账号:0303070-00330004695

读者购书、书店添货或发现印装问题,请与本社营销中心联系、调换。

电 话:(029)85307864 85233753 85251046(传真)

防 伪 提 示

我社 2004 年版文教图书封面覆有社徽和社名的全息激光防伪膜, 请注意甄别。如发现盗版, 欢迎拨打举报电话。经查实将给予举报者重奖。举报电话:(029)85308142



五年辉煌,见证你的每一步成长

——代出版说明

时光一进入初夏,在全国各大、中书店的教辅图书卖场里,你都能看到《黄冈兵法》这一醒目的书名,以及封面上三支射向靶标的箭;也会看到众多读者在《黄冈兵法》书架前流连、翻阅的身影。《黄冈兵法》几年来走遍大江南北,走进千万个重点中学,走进千百万个渴望成功与进步的学子的心田……雪片似的读者来信从全国各地飘至编辑部,学子们倾诉成长的烦恼、阐述学习的心得、奉献对图书进行修订和改正的建议和智慧……

我们感到自豪,我们共同拥有《黄冈兵法》,她是我们与千百万个学子进行交流的窗口与平台;

我们感到欣慰,《黄冈兵法》寄托了千百万个学子的期望,见证了生活的每一天,成长的每一步……

《黄冈兵法》作为陕西师大出版社的品牌图书,自2000年面世,便以权威、系统、实用等特点倍受广大读者青睐,迅速成长为全国著名品牌。五年来,我们倾注了无数的心血和热情,始终致力于为孜孜以求的学子提供最系统、最科学的学习、应试方案。如今,我们仍在探索、创新,力求使丛书的使用功能更加完善,图书质量更上一层楼,以贴近教改形势、贴近学生发展实际而设计不同的内容和形式,满足读者千差万别的个性化需求。

“我是广州的学生,抱着试试看的心态买了本《黄冈兵法》初二数学。哇,书里的内容设计非常丰富,多为常考题目,我特别钟爱,于是向老师推荐。老师以A级评价这本书(被老师以A级评价的辅导书寥寥无几),并在我们年级里热情推荐,所以全年级的同学人手一本。在期末的考试里,全年级数学科平均分奇迹般地突破学校6年的纪录(平均分为96分,最高分满分,最低分87分),这个纪录在第二学期中得到了保持……”一位广州市海珠区的中学生朋友在信中如是说。五年来,《黄冈兵法》陪伴着无数学子们的日常学习、备考复习,像一位饱学的良师益友,为大家答疑解惑,清除学习道路上的障碍。正是由于这些实实在在的效果,



《黄冈兵法》赢得了读者朋友们的认同和信赖,连年畅销,深受市场欢迎。

那么,《黄冈兵法》到底有什么独特之处呢?太原市山西大学附中的一位初三学生在信中这样评价:“作为《黄冈兵法》的忠实读者,我很庆幸可以在每学期都拥有这样一本内容全面、质量很高的辅导书,它从启迪思维方法出发,精选例题,全方位、多角度地讲解知识点,为我打下了坚实的基础,特别是分级训练、思维延伸等板块,既巩固了课本知识,又深入解剖教材,全面提高了我的解题能力,使我从中等水平一跃成为班上前五名……”一位山东省临沂一中高二的学生在来信中写到:“我对《黄冈兵法》的评价非常高,它最大的特点是针对性强,简洁实用,练习题有层次,答案详尽,重视思路提示,很适合像我这样理解能力较弱的中等生使用,我非常高兴,终于买到了物有所值的参考书……”

的确,《黄冈兵法》在编写中,一贯突出“知识、能力、素质”三元合一的教学模式,旨在建构全新的“实践、探究、创新”三位一体的教学理念,侧重学法指导,启迪思维方法。“实用”是《黄冈兵法》最大的优势,不仅因为丛书代表中国基础教育的发达地区——黄冈地区最高的教学水平,还体现在《黄冈兵法》的前瞻性上,中、高考试题的预测命中率相当高。以高考为例来说,《黄冈兵法》每年都有相当数量的原创题与当年高考题相同或相似,体现在分值上,2000年有18分,2001年有51分,2002年有131分,2003年有107分,几年下来,分值累计高达307分。而中考试题命中率更高,几年粗略估计,各地市试卷总计也有500多分。《黄冈兵法》凭借着特有的魅力和雄厚的实力,赢得了广大读者的青睐。

《黄冈兵法》出版几年来,先后荣获全国优秀教育图书奖和全国优秀畅销书奖。在一片赞誉声中,丛书策划人和作者们并没有丝毫的懈怠,而是积极搜集教改前沿信息,不断地推出最新教研成果,并迅速地转化为最新的栏目设计和内容设计,以求不断地提高丛书的质量和使用效果。我们的追求,是以《黄冈兵法》为火种,点燃全国中学生创新思维的火把,指引大家走进名牌大学的大门。

《黄冈兵法》策划组





目 录

第一章	概率与统计	1
1.1	离散型随机变量的分布列	1
1.2	离散型随机变量的期望与方差	8
1.3	抽样方法	16
1.4	总体分布的估计	22
1.5	正态分布	31
1.6	线性回归	39
	第一章小结	47
第二章	极限	54
2.1	数学归纳法及其应用举例	54
2.2	数列的极限	63
2.3	函数的极限	68
2.4	极限的四则运算	74
2.5	函数的连续性	84
	第二章小结	90
第三章	导数与微分	96
3.1	导数的概念、几种常见函数的导数	96
3.2	函数的和、差、积、商的导数与复合函数的导数	104
3.3	指数、对数函数的导数,微分的概念与运算	109
3.4	函数的单调性	114
3.5	函数的极值	119





名校经验 创新设计

3.6 函数的最大值和最小值	124
第三章小结	131
第四章 积分	137
4.1 不定积分	137
4.2 不定积分的运算法则	142
4.3 定积分的概念与计算	149
4.4 定积分在几何上的应用	154
4.5 定积分在力学上的简单应用	162
第四章小结	166
第五章 复数	173
5.1 复数的概念	173
5.2 复数的向量表示	178
5.3 复数的加法与减法	183
5.4 复数的乘法与除法	188
5.5 复数的三角形式	194
5.6 复数的三角形式的运算	200
第五章小结	207
答案与提示	213



第一章

概率与统计

1.1 离散型随机变量的分布列

知能转化导引

1. 随机变量

(1) 如果随机试验的结果可以用一个变量来表示,那么这样的变量叫做随机变量.随机变量常用希腊字母 ξ 、 η 等表示.

(2) 对于随机变量可能取的值,我们可以按一定次序一一列出,这样的随机变量叫做离散型随机变量.

(3) 随机变量可以取某一区间内的一切值,这样的随机变量叫做连续型随机变量.

(4) 若 ξ 是随机变量, $\eta = a\xi + b$, 其中 a, b 是常数,则 η 也是随机变量.

2. 离散型随机变量的分布列

(1) 设离散型随机变量 ξ 可能取的值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, ξ 取每一个值 $x_i (i=1, 2, \dots)$ 的概率 $P(\xi=x_i)=p_i$, 则称表

ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$

为随机变量 ξ 的概率分布, 简称为 ξ 的分布列.

(2) 离散型随机变量的分布列具有两个性质:

① $p_i \geq 0, i=1, 2, \dots$; ② $p_1 + p_2 + \dots = 1$.

(3) 当随机变量 ξ 是 n 次独立重复试验中某事件恰好发生的次数时, 其概率分布称作二项分布. 这里之所以把这种分布称作为二项分布, 因为 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 恰是二项展开式 $(q+p)^n = C_n^0 p^0 q^n + \dots + C_n^k p^k q^{n-k} + \dots + C_n^n p^n q^0$ 中的第 $k+1$ 项的值. 这种二项分布记作 $\xi \sim B(n, p)$, 其中 n, p 为参数, 并



记 $C_n^k p^k q^{n-k} = b(k; n, p), q = 1 - p$.

3. 随机变量的学习要求

了解随机变量的概念与意义及随机变量的可能取值与随机试验的结果之间的关系,会根据实际问题用随机变量正确表示某些随机试验的结果与随机事件.

4. 离散型随机变量的分布列的学习要求

(1) 理解离散型随机变量及其分布列的概念,掌握分布列的两个基本性质,会求一些简单的离散型随机变量的分布列;

(2) 掌握二项分布,了解它的实际背景,会用二项分布计算有关随机事件的概率;

(3) 会根据离散型随机变量 ξ 的分布列求出 $\eta = a\xi + b$ (a, b 为常数) 的分布列.

5. 本节主要体现了分类讨论的数学思想方法

方法技巧规律

1. 注意随机试验应满足的条件:

- (1) 试验可以在相同的情况下重复进行;
- (2) 试验的所有可能结果是明确可知的,并且不止一个;
- (3) 每次试验总是恰好出现这些结果中的一个,但在一次试验之前却不能肯定这次试验会出现哪一个结果.

2. 随机变量是由随机试验而得出的.

3. 注意“离散”与“连续”的区别:离散型随机变量,它所可能取的值可以一一列举出,而连续型随机变量可取某一区间内的一切值,我们无法对其中的每个值一一列举.

4. 若 ξ 是随机变量, $f(x)$ 是连续函数或单调函数,则 $f(\xi)$ 也是随机变量.由此可见,随机变量与函数是有一定联系的,随机变量函数中的自变量是试验结果.

5. 了解“分布列”的作用.离散型随机变量的分布列指出了随机变量 ξ 的取值范围以及取这些值的概率,通常情况下,若求离散型随机变量在某一范围内取值的概率,则可运用分布列,将这个范围内各个值的概率值相加.

6. 弄清“二项分布”的实质.“二项分布”是一种特殊的分布列,因为 $P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ 是二项展开式中的第 $k+1$ 项的值.

能力升级捷径

【例1】投掷均匀硬币一次,随机变量为()

- A. 出现正面的次数 B. 出现正面或反面的次数



C. 掷硬币的次数 D. 出现正、反面次数之和

学点 随机变量从本质上讲就是以随机试验的每一个可能结果为自变量的一个函数,即随机变量的取值实质上是试验结果对应的数,但这些数是预先知道所有可能的值,而不知道究竟是哪一个值,这便是“随机”的本源.

解 掷一枚硬币,可能出现的结果是正面向上或反面向上,以一个标准如正面向上次数来描述这一随机试验,那么正面向上的次数就是随机变量 ξ , ξ 的取值是 0, 1, 故选 A.

易错点 本题容易误选 B, 认为出现正面记为 $\xi=1$, 出现反面记为 $\xi=0$, 因此随机变量 ξ 是表示出现正面或反面的次数, 产生错误的原因是没有理解随机变量的本质. 本题的 C 选项中掷硬币次数是 1, 不是随机变量, 选项 D 中对应的事件是必然事件, 也非随机事件.

同类变式 袋中有 2 个黑球 6 个红球, 从中任取两个, 可以作为随机变量的是()

A. 取到的球的个数 B. 取到红球的个数

C. 至少取到一个红球 D. 至少取到一个红球的概率

提示 A 的取值不具有随机性, C 是一个事件而非随机变量, D 是概率值而非随机变量, 而 B 满足要求.

思维延伸 随机变量 ξ_1 是某城市 1 天之中发生的火警次数; 随机变量 ξ_2 是某城市 1 天之内的温度; 随机变量 ξ_3 是某火车站 1 小时内的旅客流动人数, 这三个随机变量中为连续型随机变量的是()

A. 只有 ξ_1 和 ξ_3 B. 只有 ξ_2

C. 只有 ξ_2 和 ξ_3 D. 只有 ξ_3

提示 火警次数与旅客流动人数均为离散型的, 而一天之内的温度是连续型的, 故选 B.

【例 2】 袋中有 1 个白球, 2 个红球, 4 个黑球. 现从中任取一球观察其颜色, 确定这个随机试验中的随机变量, 并指出在这个随机试验中随机变量可能取的值及分布列.

学点 求离散型随机变量的分布列在某种程度上就是正确地求出相应事件个数, 即正确求出相应的排列组合数.

解 设集合 $M = \{x_1, x_2, x_3\}$, 其是 x_1 为“取到的球为白色的球”, x_2 为“取到的球为红色的球”, x_3 为“取到的球为黑色的球”. 在本题中可规定: $\xi(x_i) = i (i=1, 2, 3)$, 即当试验结果 $x = x_i$ 时, 随机变量 $\xi(x) = i$, 这样, 我们确定 $\xi(x)$ 是一个随机变量, 它的自变量 x 的取值是集合 M 中的一个元



素, 即 $x \in M$, 而随机变量 ξ 本身的取值则为 1, 2, 3 三个实数, ξ 分别取 1, 2, 3 三个值的概率为 $P(\xi=1)=\frac{1}{7}, P(\xi=2)=\frac{2}{7}, P(\xi=3)=\frac{4}{7}$.

ξ 的分布列为

ξ	1	2	3
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$

技巧点 分布列的表示形式可有如下几种: ①如教材所述的表格形式; ②一组等式(ξ 的所有取值的概率); ③有时可将②压缩为一个带“ i ”的等式.

同类变式 设随机变量 ξ 的概率分布如表所示:

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

求: (1) $P(\xi < 1), P(\xi \leq 1), P(\xi < 2), P(\xi \leq 2)$; (2) $F(x) = P(\xi \leq x), x \in \mathbf{R}$.

解 (1) $P(\xi < 1) = P(\xi = 0) = \frac{1}{2}, P(\xi \leq 1) = P(\xi = 0) + P(\xi = 1) = \frac{5}{6},$

$P(\xi < 2) = P(\xi \leq 1) = \frac{5}{6}, P(\xi \leq 2) = 1.$

$$(2) F(x) = P(\xi \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1; \\ \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

思维延伸 已知随机变量 ξ 的分布列如下表所示:

ξ	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

分别求出随机变量 $\eta_1 = 2\xi - 1, \eta_2 = \xi^2$ 的分布列.

解 由于 $\eta_1 = 2\xi - 1$ 对于不同的 ξ 有不同的取值 $y = 2x - 1$,

即 $y_1 = 2x_1 - 1 = -5, y_2 = 2x_2 - 1 = -3, y_3 = 2x_3 - 1 = -1, y_4 = 2x_4 - 1 = 1, y_5 = 2x_5 - 1 = 5.$

故 η_1 的分布列如表:



η_1	-5	-3	-1	1	5
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

$\eta_2 = \xi^2$ 对于 ξ 的不同的取值 -1 与 1, 取相同的值 1, 故 $P(\eta_2 = 1) = P(\xi = -1) + P(\xi = 1) = \frac{5}{10}$.

所以 η_2 的分布列如下表:

η_2	0	1	4	9
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

说明 在得到的随机变量的分布列中, 取值行中应无重复数; 概率行中各项必须非负, 且各项之和为 1.

【例 3】 某小组有 10 台各为 7.5kW 的机床, 如果每台机床的使用情况是相互独立的, 且每台机床平均每小时开动 12 分钟, 问全部机床用电超过 48kW 的可能性有多大?

学点 明确某一时刻正在工作的机床台数 ξ 服从二项分布是解题的关键.

解 由于每台机床正在工作的概率为 $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$, 而且每台机床有“工作”与“不工作”两种情况, 故每一时刻正在工作的机床台数 ξ 服从二项分布, 即 $\xi \sim B\left(10, \frac{1}{5}\right)$.

$$P(\xi = k) = C_{10}^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 10)$$

据题意, 48kW 可供 6 台机床同时工作, 用电超过 48kW, 即意味着有 7 台或 7 台以上的机床在工作, 这一事件的概率为

$$\begin{aligned} P(\xi \geq 7) &= P(\xi = 7) + P(\xi = 8) + P(\xi = 9) + P(\xi = 10) \\ &= C_{10}^7 \left(\frac{1}{5}\right)^7 \left(\frac{4}{5}\right)^3 + C_{10}^8 \left(\frac{1}{5}\right)^8 \left(\frac{4}{5}\right)^2 + C_{10}^9 \left(\frac{1}{5}\right)^9 \left(\frac{4}{5}\right) + \\ &\quad C_{10}^{10} \left(\frac{1}{5}\right)^{10} \left(\frac{4}{5}\right)^0 \approx \frac{1}{1157}. \end{aligned}$$

由上可以说明, 用电量超过 48 千瓦的可能性是很小的, 根据这一点, 可以选择适当的供电设备, 做到既保证供电而又合理节约用电.

发散点 如果所考虑的试验可以看做是一个只有两种结果 A 和 $\bar{A}$ 的试验的 n 次独立重复, 则 n 次试验中 A 发生的次数 ξ 服从二项分布.



同类变式 借助二项分布,证明 $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n (n \in \mathbb{N}_+)$

证明 若记事件 A : “掷一均匀硬币, 出现正面向上”, 则掷 n 次硬币即进行 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数 ξ 服从二项分布 $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$.

故 $P(\xi=k) = C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}, k=0, 1, 2, \dots, n,$

由 $P(\xi=0) + P(\xi=1) + P(\xi=2) + \cdots + P(\xi=n) = 1$, 得

$$C_n^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n + C_n^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + C_n^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} + \cdots + C_n^n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1,$$

即 $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n$.

思维延伸 某射手每次能命中目标的概率为 0.15, 现该射手连续向某目标进行射击, 如果命中目标, 则射击停止, 否则继续射击, 直到命中目标, 但射击次数最多不超过 10 次, 求该射手射击次数 ξ 的分布列.

提示 显然, $\xi=1, 2, 3, \dots, 10$, 依题意可知, 各项射击是独立的, 由独立事件的概率关系 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, 不难求出 $P(\xi)$.

解 $P(\xi=n) = (1-0.15)^{n-1} \times 0.15 = 0.85^{n-1} \times 0.15, n=1, 2, 3, \dots, 9,$

$P(\xi=10) = (1-0.15)^9 \times 0.15 + (1-0.15)^{10} = 0.85^9$

故由上可得 ξ 的分布列为:

ξ	1	2	3	4	5
P	0.15	0.85×0.15	$0.85^2 \times 0.15$	$0.85^3 \times 0.15$	$0.85^4 \times 0.15$
ξ	6	7	8	9	10
P	$0.85^5 \times 0.15$	$0.85^6 \times 0.15$	$0.85^7 \times 0.15$	$0.85^8 \times 0.15$	0.85^9

基础能力训练

1. 抛掷两颗骰子, 所得点数之和记为 ξ , 那么 $\xi=4$ 表示的随机试验结果是()

- A. 一颗是 3 点, 一颗是 1 点;
- B. 两颗都是 2 点;
- C. 两颗都是 4 点;





D. 一颗是 3 点, 一颗是 1 点或两颗都是 2 点.

2. 下列表中能成为随机变量 ξ 的分布列的是()

A.

ξ	-1	0	1
P	0.3	0.4	0.4

B.

ξ	1	2	3
P	0.4	0.7	-0.1

C.

ξ	-1	0	1
P	0.3	0.4	0.3

D.

ξ	1	2	3
P	0.3	0.4	0.4

3. 从五个数 1, 2, 3, 4, 5 中任取 3 个数 x_1, x_2, x_3 , 随机变量 ξ 表示 x_1, x_2, x_3 中最大数的值, 则 ξ 的分布列为(B)

A.

ξ	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

B.

ξ	3	4	5
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

C.

ξ	1	2	3	4	5
P	0	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

D.

ξ	3	4	5
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$

4. 设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=k) = m\left(\frac{2}{3}\right)^k, k=1, 2, 3$, 则 m 的值为 (1/3).

A. $\frac{17}{38}$

B. $\frac{27}{38}$

C. $\frac{17}{19}$

D. $\frac{27}{19}$

5. 如果 ξ 是一个离散型随机变量, 那么下列命题中为假命题的是 (D)

A. ξ 取每个可能值的概率是非负实数; ✓

B. ξ 取所有可能值的概率之和为 1; ✓

C. ξ 取某 2 个可能值的概率等于分别取其中每个值的概率之和;

D. ξ 在某一范围内取值的概率大于它取这个范围内各个值的概率之和.



6. 若 $\xi \sim B(5, 0.1)$, 那么 $P(\xi \leq 2)$ 等于()

A. 0.0729

B. 0.00856

C. 0.91854

D. 0.99144

7. 在三次独立重复试验中, 若已知 A 至少出现一次的概率等于 $\frac{19}{27}$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为 $\frac{1}{3}$.

8. 袋中有红、黄、蓝球各一个, 从中有放回地每次任取一个, 直到取到红球为止, 则第 4 次首次取到红球的概率为 $\frac{8}{27}$.

9. 设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi = k) = \frac{8! c}{k(k+1)}$, $k=1, 2, 3, c$ 为常数, 则 $P(0.5 < \xi < 2.5) = \frac{1}{4}$.

10. 设随机变量 $\xi \sim B(2, p)$, $\eta \sim B(4, p)$, 若 $P(\xi \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(\eta \geq 1) = \frac{17}{27}$.

发展思维训练

11. 将 3 个小球任意地放入 4 个盒子中去, 盒子中的球的最多个数记为 ξ , 求 ξ 的分布列.

12. 已知随机变量 ξ 的分布列为:

ξ	-2	-1	0	1	2	3
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

分别求出随机变量 $\eta_1 = \frac{1}{2}\xi$, $\eta_2 = \xi^2$ 的分布列.

13. 有一批数量很大的螺钉, 其次品率为 1%, 任取 200 只螺钉, 求其中至少有 5 只次品的概率.

1.2 离散型随机变量的期望与方差

能力转化导引

1. 期望与方差

若离散型随机变量 ξ 的分布列为:



ξ	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则称 $E\xi = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n + \cdots$ 为 ξ 的数学期望, 简称期望. 称 $D\xi = (x_1 - E\xi)^2 \cdot p_1 + (x_2 - E\xi)^2 \cdot p_2 + \cdots + (x_n - E\xi)^2 \cdot p_n + \cdots$ 为随机变量 ξ 的均方差, 简称方差. 称 $D\xi$ 的算术平方根 $\sqrt{D\xi}$ 为随机变量 ξ 的标准差, 记作 $\sigma\xi$.

2. 期望与方差的学习要求

(1) 了解离散型随机变量的期望和方差的概念与意义, 了解随机变量的标准差的定义.

(2) 掌握离散型随机变量的期望和方差的计算公式与运算性质, 能根据离散型随机变量的分布列求出期望与方差.

$$E(a\xi + b) = aE\xi + b, \quad D(a\xi + b) = a^2D\xi.$$

(3) 掌握二项分布的期望与方差: 若 $\xi \sim B(n, p)$, 则 $E\xi = np$, $D\xi = np(1-p)$.

(4) 能用离散型随机变量的期望和方差解决一些实际问题.

方法技巧规律

1. 弄清期望与分布列的关系. 期望的概念是建立在分布列的基础之上的, 分布列中随机变量 ξ 的一切可能值 x_i 与对应的概率 $P(\xi = x_i)$ 的乘积之和就是 ξ 的数学期望.

2. 正确理解期望的意义. 假设进行了 n 次随机试验, 根据 ξ 的分布列, 在 n 次试验中, $p_i n$ 次出现了 $x_i (i=1, 2, \cdots, n)$, 这样, 在 n 次试验中, ξ 出现的总次数为 $p_1 nx_1 + p_2 nx_2 + \cdots + p_n nx_n$. 从而, n 次试验中 ξ 出现的平均次数等于 $\frac{(p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n) \cdot n}{n} = E\xi$.

3. 善于用随机变量函数的期望与方差, 二项分布的期望与方差解决相关问题.

4. 理解方差, 标准差的意义. 随机变量 ξ 方差的意义在于描述随机变量稳定与波动或集中与分散的状况. 标准差 $\sigma\xi = \sqrt{D\xi}$ 则体现随机变量取值与其期望值的偏差.

能力进阶链接

【例1】设 ξ 是一个离散型随机变量, 其分布列如下表:



ξ	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$1-2q$	q^2

试求 $E\xi, D\xi$.

学点 求离散型随机变量的期望与方差, 首先应明确随机变量的分布列, 若分布列中的概率是待定常数时, 应先按分布列的性质求出这些待定常数, 再求其期望与方差.

解 由离散型随机变量的分布列的性质得

$$\begin{cases} 0 \leq 1-2q \leq 1 \\ q^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow q = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\frac{1}{2} + (1-2q) + q^2 = 1$$

所以 ξ 的分布列应为:

ξ	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{2}-1$	$\frac{3}{2}-\sqrt{2}$

$$\text{所以 } E\xi = (-1) \times \frac{1}{2} + 0 \times (\sqrt{2}-1) + 1 \times \left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right) = 1-\sqrt{2},$$

$$\begin{aligned} D\xi &= [-1-(1-\sqrt{2})]^2 \times \frac{1}{2} + (1-\sqrt{2})^2 \times (\sqrt{2}-1) + [1-(1-\sqrt{2})]^2 \\ &\quad \times \left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right) \\ &= \sqrt{2}-1. \end{aligned}$$

易错点 应防止机械地套用期望与方差的计算公式,

$$\text{即 } E\xi = (-1) \times \frac{1}{2} + 0 \times (1-2q) + 1 \times q^2 = q^2 - \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} D\xi &= \left[-1 - \left(q^2 - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \times \frac{1}{2} + \left(q^2 - \frac{1}{2}\right)^2 \times (1-2q) + \left[1 - \left(q^2 - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \\ &\quad \times q^2. \end{aligned}$$

这显然是由于忽略了随机变量分布列的性质所出现的误解.

同类变式 一袋中有 6 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 在袋中同时取 3 只, 求三只球中的最大号码 ξ 的数学期望.

解 ξ 的值为 3, 4, 5, 6, $P(\xi=k) = \frac{C_{k-1}^2}{C_6^3}, k=3, 4, 5, 6$.

因此, ξ 的分布列为: