



之六經可盡周身上下之脈絡而手經已在其內不必復言矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噤十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣所謂其愈時十日以上者如此又有言陽寒以不服藥為中醫者其說本於此不知經文為氣實者言也若正虛邪勝則死譬如大瀉瀉瀉不為援手而聽其自度全活者幾希矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已各通者明經脈隨證施治也未滿三日其邪在表汗之而愈滿三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳正理論云脈大浮數在表可汗脈實沈數在裏可下故曰數雖少有裏證者必下第當以表裏為辨數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞爾形毋搖爾神形神並守偕行於閉蟄封藏之本者也一有不謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月即發名正傷寒伏而不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞治之或差反掌生殺自仲景以來名賢代起立言不遺不詳患其多而惑也陶節庵曰得其要領易於拾芥脈證與理而已求之多岐則支離繁碎如涉海問津矣脈證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其常通其變也多岐者蔓行之方書也余有感於斯言約六法以盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散寒勝之時陰勝之藏陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛涼一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍緩但見痞實者攻之更緩或行血畜或逐水停輕重緩急隨證靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣為陽氣虛則寒故溫即是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳今人畏而不用使傷寒犯虛者生而待斃大可憾已如塵散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不退陰不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除蓋中則寒自散此必見衰微之陰脈者也蓋論曰金匱易脈者生易於食食者生易於食食者生易於食

不論熱與不熱惟憑脈用藥至為穩當不論浮沈大小但指下無力重按全無便是伏陰然則沈小者人知為陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實而病者攻之即愈雖不服藥經盡即安何足慮也所可慮者惟挾虛耳奈何庸淺之輩不容虛實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇東垣丹溪節菴亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也謂傷寒無補法可乎夫實者不藥可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者握傷寒之要矣何必求之多歧哉

傷寒十六證傷寒者寒傷營血脈浮而緊頭痛發熱無汗惡寒傷風者風傷衛氣脈浮而緩頭痛發熱有汗惡風

傷寒見風者既傷於寒復感風邪惡寒不躁其脈浮緩傷風見寒者既傷於風復感寒邪惡風煩躁其脈浮緊

以上四證皆溫病者冬受寒邪來春乃發發熱頭痛不惡寒而渴脈浮數溫瘧者冬受寒邪復感春寒風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱自汗身重嘿嘿欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮溫疫者冬受寒邪復感春溫

冬受寒邪復感春風頭痛身熱自汗身重嘿嘿欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮溫疫者冬受寒邪復感春溫

時行之氣溫毒者冬受寒邪春令早熱復感其邪以上五證皆冬傷於寒而熱病者冬傷於寒至夏乃發頭痛身

熱惡寒其脈洪盛傷暑者暑熱為邪自汗煩渴身熱脈虛傷溼者感受溼邪身重而痛自汗身不其熱兩脰逆

冷四肢沈重胸腹滿悶風濕者既受溼氣復感風邪肢體重痛額汗脈浮瘕者身熱足寒頭項強急面赤目赤

口噤頭搖角弓反張若先受風邪復感於寒無汗惡寒為剛痙先受風邪復感於溼惡風有汗為柔痙

類傷寒五症一曰痰中脘停痰增寒發熱自汗胸滿但頭不痛項不強與傷寒異耳一曰食積胃中停食發熱頭痛

但身不痛氣口緊盛與傷寒異耳一曰虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳一

曰脚氣足受寒溼頭痛身熱肢節痛使閉嘔逆但脚痛或腫滿或枯細與傷寒異耳一曰內癰脈浮數當發熱而惡

寒若有痛處飲食如常當積有膿也胸中痛而咳脈數咽乾不渴濁唾腥臭肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出

惡寒身皮甲錯腹皮腫急脈滑而數腸癰也胃脘痛手不可近胃脈細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而誤認傷寒禁其飲食必死

表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胸脇且驚寒熱嘔脈浮而大或緊或緩有汗脈浮緩無力表虛也無汗脈浮緊表實也

裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞭滿大便不通腹痛腸鳴自利小便如常謔語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿

裏證而厥唇青舌卷脈沈細或沈實腹鳴自利不渴唇青舌卷惡寒下利清穀身痛脈沈微裏熱也腹中鞭大

表裏俱見屬半表半裏表裏俱無不可汗下小柴胡湯隨證加減

陰證身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入二便不禁面如刀割色青黑或喜向壁臥閉目不欲

見人鼻氣自冷唇口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷

透手也陰毒者腎本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚

熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六脈沈細或尺裏寸盛五日可治六七日不

可治陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脈浮微手足冷大便洩小便清昏沈多眠又有身熱反欲得衣口不

渴指甲黑此陰盛於內真陽失守也

陽證身動氣高而喘目睛了了呼吸能往能來口鼻氣熱面赤唇紅口乾舌燥謔語能飲涼水身輕如常小便赤矢

便閉手足溫指甲紅陽毒者邪熱深重失汗失下或誤服熱藥熱毒散漫舌卷焦黑鼻中如煙煤咽喉痛甚身面

錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌棄衣而走脈洪大滑促五日可治六七日不可治或昏瞤咬舌見鬼神陽證似

陰者手足冷大便閉小便赤煩悶昏迷不眠身寒卻不欲食口渴指甲紅脈沈滑或四肢厥冷陰陽脈沈滑指

甲紅此陽極於內真陰失守也

六經證治足太陽膀胱此經從頭項貫腰脊故頭痛惡寒發熱脊強然風與寒常相因寒則傷營惡寒頭痛脈浮緊

而無汗用麻黃湯解表發汗以散寒得汗而愈風則傷衛惡風頭痛脈浮緩而無汗用桂枝湯發汗以散風得汗而愈

汗而愈若大風寒受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠理非辛溫不能發汗宜用也若春溫熱之證皆用羌活中和湯辛涼解之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯并麻湯治之此證有在經在府之別如目病在經也潮熱自汗譫語發渴大便閉渴去衣被傳至少陽則寒熱而嘔胸脇痛口苦耳聾此為半表半裏之經手揚足微發斑斑狂狂亂惡熱脈沈數痛在府也表證多者小柴胡湯裏證急者大柴胡湯過此不已則傳陽明之府表證悉罷名為入裏惡熱譫語口燥咽乾不大便脈沈實如瘕滿燥實四證皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見痞滿實三證邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳櫟恐傷上焦之氣也但見痞實二證邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂喜忘畜血證也宜桃仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腸痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄面如刀割引衣踈臥脈見遲數急宜溫之輕者理中湯重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名為真中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證即與汗之一見裏證即與下之一見虛寒即與溫補但當以脈證為據不可以日數為拘也

之

可汗頭痛項強皮脊腰背俱強身皮拘急惡寒發熱無汗脈浮數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脈浮須再汗

不可汗無表證者不可汗脈沈不可汗尺脈遲不可汗脈微弱者雖惡寒不可汗咽中閉塞者不可汗諸

動氣者不可汗淋家不可汗亡血虛家不可汗厥者不可汗汗家不可重汗太陽與少陽併病頭項強

痛或眩胃心下痞不可汗脈弦細頭痛面熱屬少陽不可汗黃芩湯主之連愈乎文伯曰甚易但元氣不足恐二年後不復起

耳雲曰朝開道夕死可矣死二年乎遂以蒸法取汗而愈後二年果卒虛者其可輕汗哉

可吐病在膈上者可吐汗下後虛煩懊憹者可吐

不可吐脈虛不可吐厥逆者不可吐膈上寒乾嘔宜溫不宜吐

可下汗後不解邪傳胃府可下潮熱腹痛脈實可下陽明多汗譫語有燥實可下潮熱手足腋下汗出譫語

者可下吐後腹滿可下凡臍腹硬或痛不可按者可下下後不解臍腹硬痛可再下結胸脈不浮可下

少陰病下利清水其色青者心下必痛口乾者可下太陽證熱結膀胱小便不利小腹急結其人如狂者血畜也

可下 陽明證其人喜忘大便黑必有關血可下 陽明無汗小便不利心中懊憹必發黃可下

不可下 表未解者不可下 腹脹可按而減者不可下 諸虛者不可下 陽微者不可下 咽中閉塞者不可下

諸動氣者不可下 脈弱者不可下 脈浮大者不可下 小便清白者不可下 陽明病面赤心下雖鞭滿不

可下

用火法以火燒地布桃葉柏葉亦可設席置病人於上即汗出 或醋炒香附熱熨胸背即汗或置火於床下 或艾炙

用水法傷寒思飲水為欲愈若不與則不愈若忍飲則水停宜以新汲水少與之待再思再與 熱甚者以青布浸

汲新水中置病人胸前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口若表未解及陰證似陽者忌之

發熱翕翕而熱者表也羌活湯蒸蒸而熱者裏也輕者大柴胡湯重者承氣湯半表半裏者表裏俱熱而輕於純在裏也小柴胡

於三陰發熱則有腹痛肢冷脈沈下利為異湯四逆湯潮熱屬陽明一日一發日晡而作陽明內實也大便鞭者湯承氣湯

未罷者小柴胡湯煩熱兼渴竹葉石膏湯心煩不眠酸棗湯煩而心悸小建中湯煩而悶者梔子湯熱者白虎湯寒者附子湯

惡寒不見風亦惡寒身不發去衣被發熱惡寒者陽也羌活湯無熱惡寒者陰也理中湯下證悉具微惡寒者表未解也先解表而

後攻裏 下後不解發熱而渴惡寒白虎湯惡寒而嘔心下痞者五苓散汗後惡寒虛也芍藥湯背惡寒表未解也葛根湯

背惡寒而潮熱桂枝湯加芍藥口渴心煩背微惡寒白虎加參湯背惡寒潮熱腹滿小承氣湯少陰病口中和背惡寒附子湯汗後不

解反背惡寒者虛也芍藥甘草湯

惡風惡風不惡風者無風不惡太陽惡風無汗而喘麻黃湯有汗桂枝湯吐下後不解表裏俱熱時時惡風燥渴而煩白虎加參湯汗多亡陽惡

風者桂枝湯

自汗惡風寒者桂枝湯惡寒自汗表虛也小建中湯或自汗不惡風寒表證罷裏證實也承氣湯汗多小便利必津液竭

大便難鞭不可攻宜密導用蜜於銅器中微火煎稍凝攪之勿令焦自汗而渴小便難五苓散汗多不止

日亡陽桂枝附子湯外用水白朮葛根湯白朮盜汗在半表半裏膽有熱也胡湯頭汗者熱不得越陽氣上騰語脈氣心下滿頭汗如水結胸也小半夏夏黃黃子出齊頭而置黃連黃連五黃汗止

語脈氣心下滿頭汗如水結胸也

傷寒

足厥冷真武不結胸小腹痛滿按之痛冷結也受寒元穴

腹痛陽邪痛者其痛不常按而痛甚為實右關脈實腹痛便閉承氣下之早因而腹痛中湯陽脈濇陰脈弦腹痛

利建中湯或桂枝湯少陰厥逆或利而效四逆加五味厥陰小腹痛逆湯

咽痛證也不可汗不可下甘桔湯為陰陽俱緊主無汗有汗曰亡陽屬少陰當咽痛諸膚陽毒咽痛口瘡赤爛

并麻六物湯或黃連汁非時暴寒附於少陰之經脈弱咽痛必下利先用半夏桂甘湯下利咽痛手足徹冷無熱證者理中

脇痛往來寒熱脇痛胸痛小柴胡湯身涼表證罷乾嘔脇痛有水也十棗湯

呃逆仲景切發逆即此脈微細呃逆胃寒也橘皮乾薑半夏生薑湯脈洪大而呃心火上奔肺不得納甘草湯服藥無效

用難法為末酒煎服之失下呃逆大便實者氣湯

嘔吐嘔者聲物俱出吐者無聲出物嘔者有聲無物太陽陽明合病當自利若不利但嘔葛根加少陽有嘔證

小柴胡而渴者茯苓湯先渴後嘔水停心下赤苓湯先嘔後渴此為欲解當與水飲瘥後餘熱在胃而嘔者薑汁湯太陽少

陽合病自利而嘔黃芩半夏湯寒熱嘔而不渴薑附湯嘔而發熱心下急微煩大柴胡湯胸中有熱胃中有邪陰陽不交腹痛

欲吐黃連湯三陽發熱而吐俱用小柴胡湯發熱六七日不解煩渴欲飲水入即吐五苓散虛熱少氣逆欲吐竹葉

湯寒多而吐理中湯不飲而吐木加生薑汗下後胃虛冷吐乾薑黃連黃芩湯少陰吐者真武去附虛熱少氣逆欲吐石青

大承氣心下水氣乾嘔身熱微喘或自利龍湯不發熱不惡寒肋痛乾嘔十棗湯自汗頭痛乾嘔桂枝乾嘔自利黃芩

氣湯裏寒外熱脈微欲絕乾嘔通脈四逆湯

咳嗽有聲無痰曰咳太陽證罷表未解心下水氣乾嘔發熱而咳小青龙湯太陽發熱咳嗽上方同太陽發熱嘔噦而咳

小柴胡湯有痰有聲曰咳太陽證罷表未解心下水氣乾嘔發熱而咳小青龙湯太陽發熱咳嗽上方同太陽發熱嘔噦而咳

胡湯真武湯加五味少陰寒熱往來咳嗽胸脇滿或泄利加五味子乾薑少陰咳嗽真武少陰腹痛小便不利四肢沈重咳嗽者水

喘太陽無汗而喘太陽陽明合病胸滿而喘俱麻黃湯邪氣壅盛而喘雖汗而喘不已宜再發之麻黃杏子誤下太陽

利不止喘而有汗脈浮葛根黃連湯太陽汗後飲多水停而喘小青龙湯去麻黃加石膏湯太陽下之微喘表未解也桂枝湯

白... 煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁太... 下利咳嘔煩躁下利咽痛胸滿而煩

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁太... 下利咳嘔煩躁下利咽痛胸滿而煩
煩躁自汗煩躁小便多芍藥甘草少陰心煩不眠黃連雞子湯少陰吐利手足厥冷煩躁欲死吳茱萸湯下後復發汗晝則煩躁

夜則安靜不渴無熱甘草湯六七日無大熱陰盛陽隔身冷脈細煩躁不飲水霍亂陰躁欲坐中薑附
煩躁此之煩躁殆有其馬汗吐下後虛煩不眠其則煩躁梔子陽明脈浮咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱懊憹梔子

陽明病下後懊憹有燥屎承氣短氣煩躁懊憹大陷陽明無汗小便不利懊憹發黃茵陳
戰慄戰者身動也戰慄而不戰陰盛陽虛薑附

悸心中驚悸不安脈結代心悸炙甘草湯傷寒三四日心悸而煩心健汗發過多心悸喜按桂枝心神不寧怔忡不眠安神
少陰病厥逆心下悸四逆散飲水多而悸雖有他邪亦先治水發汗寒熱心悸小便不利心煩喜嘔小柴胡少陽

發汗譫語悸動小柴胡
渴或因熱耗津液太陽脈弦而渴小柴胡太陽表不解有水氣而渴小青龙脇下痛手足溫而渴小柴胡

而渴桂枝脈浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓少陰下利咳而嘔渴煩不得眠猪苓汗吐下後六七日不解表

裏俱熱惡風大渴白虎汗後脈大而渴白虎夏至左右虛煩而渴發熱不惡寒竹葉小便不利而渴必發黃

首陳五少陰自利而渴小便清利下焦虛寒甘草心煩但欲寐或自利而渴少陰也陽明脈長而實有汗而

渴承氣脈沈滑數實煩躁而渴大陷
口燥咽乾引飲口燥咽乾少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脈弦小柴胡口乾脈浮緊微數白虎陽明無大熱背惡寒

口燥咽乾引飲口燥咽乾少陰病二三日口燥咽乾急下之大承
漱水不欲嚥此證屬陽熱頭痛脈微漱水不欲嚥必發犀角外證無寒熱漱水不欲嚥必發

狂此畜血也桃仁傷寒

發狂熱毒在胃，併于心，神志不定，而狂少臥，不六七日，未得汗，脈洪數，面赤，目脹，大熱煩躁，狂言欲走。
發狂，班爛，譫語，升麻，火劫汗多亡陽煩躁，驚狂，金匱風引湯，柴胡三陽熱極，脈大身熱渴而狂，黃連解毒湯，甚者承

湯加辰砂，陽毒發狂，眼赤，脈洪口渴，三黃石血上逆，則喜忘，血下蓄，則如狂。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。
勝陰絕，發狂譫妄，面赤咽痛，發斑，脈洪實，或滑促，宜酸苦之藥，收陰抑陽，大汗而解。

筋脈拘急汗多。桂心白朮閉目合眼。附子散胸滿口喎臥不着席咬牙變急。大承氣湯頭項強小腹滿小便不利。五苓散風血

燥。防風散

手足厥逆。四逆散謂之四逆厥逆脈沈細踰臥惡寒引衣自覆不飲水下利清穀。四逆湯脈不至者。通脈四逆湯脈遲弱。理中

手足指微冷謂之清。理中寒熱而厥面色不澤用綿衣色手足溫大下而解急服。五苓散少陰病吐利厥逆煩躁欲死

吳茱萸厥而自熱。黃耆人參湯厥而渴者。白虎湯厥而悸先治其水。茯苓甘草湯厥而惡熱不眠譫語。白虎湯諸陽受氣於胸邪客

則陽氣不施手足厥逆脈乍緊心滿而煩病在胸中當吐之。散先發熱而後厥者手揚足擲煩躁飲水畏熱大便秘

秘小便赤佛鬱天抵熱深厥亦深脈沈滑頭面有汗指甲溫皆伏熱也。大承氣湯

頭眩。上虛半表半裏中陽虛頭眩。葛根湯風家多頭眩。方同上口苦咽乾頭眩。桂枝湯陽明頭眩不惡寒能食而效。白朮

甘草乾薑湯太陽病發汗汗不止眩冒身瞤動振振欲僻地。真武湯

衄血。鼻血太陽病衄血及服桂枝後衄者為欲解。犀角地黃湯脈浮大發熱下利鼻衄乾嘔。黃芩芍藥湯衄煩渴欲飲水水入

即吐。先服五苓散自利而衄。麻黃湯少陰病但厥無汗而強發之必衄名下厥上竭為難治。湯黑錫丹汗後熱退

鼻血不止新汲井水草紙數層貼頂上及項脊溫則易必止。

吐血當汗不汗熱毒深入故吐血內有瘀積。桃仁承氣湯服桂枝後吐血。犀角地黃湯血紫黑成塊脈遲細口不渴小

便清。理中湯

畜血太陽病不解熱結膀胱發狂血自下。桂枝湯熱在下焦小腹結滿小便自利其人如狂。桃仁承氣湯

下血太陽病不解其人如狂熱結膀胱血自下者愈若不愈。桂枝湯小腹急滿。抵當湯少陰下血。桃花湯腹滿身熱下膿血

黃連阿膠湯地榆散

小便不利已汗復下小便不利心煩。小柴胡湯太陽汗後脈浮小便不利微熱而渴。五苓散身黃小便不利腹微滿者。茵陳

小便不利大便難全易微熱有燥屎也。承氣湯潮熱大便泄小便不利。五苓散風溼自汗身重小便不利。甘草附子湯熱鬱

傷寒

傷寒

傷寒

不通四肢如泥貼臍上寒鬱不通四肢上下

小便自利太陽病小便自利以飲水多心下悸桂枝湯身黃小便當不利今反自利其人如狂下焦蓄血抵當湯

而小腹滿應小便不利今反自利蓄血也抵當湯二便俱利脈沈遲四逆湯

小便數頻來而短少也太陽汗吐後小便數譫語調胃承氣湯太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒小便數甘草乾薑湯

發黃發熱身盡痛面目俱黃太陽中溼連翹赤芍湯太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒小便數麻黃連翹赤芍湯

胡加稅發熱頭汗渴欲飲水小便利大便快發黃五苓散小便不利四肢沈重似瘧不欲飲茵陳五苓湯

便如常變為陰黃理中加茵陳湯下之太過脾虛津竭飲水自傷此陰溼變黃茵陳四逆湯

發斑熱甚傷血裏實表虛發為斑也斑見紫黑者十死一生或陽證誤發溫或當汗陽毒結熱舌卷焦黑鼻如煙煤狂

言見鬼面赤錦斑陽毒升麻湯赤斑咽痛玄參升麻湯表證多者防風通聖散去硝斑出咽痛猪膽龍子湯赤斑逆湯

用升麻湯犀角地黃湯冬暖受邪至春發斑溫毒也黑膏紅毒丹溫毒煩渴便實腹痛赤斑承氣湯汗下虛極發斑白虎湯

狐惑失汗所致食少胃空或喘五藏故唇口生瘡或食其藏則上唇生瘡為或虫食其取則上清熱黃連犀聲啞

殺虫青納穀道中猶灼熱喘息多眠風溫也葛根湯

多眠太陽病脈細多眠外已解也小柴胡湯尺寸沈細但欲寐者少陰證也四逆湯陽脈浮滑陰脈濡弱多汗或發汗後身

不得眠眠安也吐下後不眠仁湯吐下後懊憹不眠梔子湯大熱嘔錯語不眠黃連解毒湯少陰病二三日已上心煩不眠黃連湯

雞子太陽大汗胃乾不眠欲飲水者少少與之下後渴而不眠猪苓湯脈浮小便不利不眠五苓散下後復發汗不眠

無表證脈沈乾薑附子湯

短氣呼吸短促不能接續似喘汗出不徹故短氣葛根加腹滿短氣邪在表為虛甘草附風溼相搏汗出短氣小便

不利惡風不欲去衣甘藷附子湯水傳心下短氣五苓散乾嘔短氣汗出不惡寒比表解裏未和計兼太陽下之早心下更

不利惡風不欲去衣甘藷附子湯水傳心下短氣五苓散乾嘔短氣汗出不惡寒比表解裏未和計兼太陽下之早心下更

脈浮弦。腸下鞭。往來寒熱。小柴胡湯自下利者。黃芩湯嘔者。黃芩加半夏湯少陽陽明合病。脈弦長。因發汗。因利。小便。胃中燥實。

調胃承氣湯。脈長自利者。為順。滑而數者。為負。有宿食。大承氣湯負者。逆也。

併病。一經先病。未盡。又過經之傳者。為併病。或始則二陽合。一病後則一陽病。裏一陽邪。或歸併於一經。二者皆併病也。太陽陽明併病。太陽病發汗不徹。轉屬陽明。續自微汗出不惡寒。若面色洪鬱。痛無常處。是陽明復併歸太陽。當再汗。麻黃湯太陽證未罷。桂枝湯太陽證罷。但見陽明證者。下之。大承氣湯太陽少陽併病。頭痛太陽眩冒。心下痞。當刺肺俞。肝俞。大椎。慎勿下。太陽不勝。陽明不負。不相尅為順。少

陽脈勝。陽明脈負。鬼賊相尅。為逆。

兩感。日傳二經。陰陽俱病也。表裏不可東垣以氣實而感之淺者。猶或可治。大羌活湯

舌胎。邪在表者。舌上無胎。半表半裏。合胎而滑。傳裏則乾燥。熱深則黃。熱極則黑也。陽明病。腸下鞭滿而喘發熱。汗出不大便而嘔。舌上白胎者。小柴胡湯脈陰

陽俱緊。舌上滑胎。小柴胡湯去半夏加人參。熱聚於胃。則舌黃。承氣湯舌純也。有二種。皆死證也。有大極似水者。為熱極。大承

氣湯。有水來尅火者。為寒極。脈證必寒。附子理中湯七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。舌燥。欲飲水數升。白虎湯

瘧後昏沈。因發汗不透。餘毒在心胞絡也。發汗出時。蓋覆不周。則汗出不均。腰背手足搖擻。或冷或熱。牛黃散瘧後腰已下有水。氣者

狂瀉澤。

摘陶氏十法。

發狂難制。以醋炭氣入鼻。即定。方可察其陰陽。初病起。頭痛發熱。傳裏時。熱極發狂。當下之。初病起。頭不痛。身微熱。面赤煩燥。欲坐臥涼水中。陰極似陽。當溫之。須察脈來有力無力。此為良法。

腹中痛甚。將涼水一碗。與病人飲之。其痛稍減者。涼之不愈。渴而大便實者。下之。若小腹痛。大便黑。小便利。身目黃者。蓄血也。行血藥。若飲水痛增者。屬寒。當溫之。須察脈來有力無力。此為良法。

寒證。脈伏。或吐瀉脫而無脈。以薑汁好酒各半。蓋與病人服。脈出者。生。不止者。死。更覆手取之。而無脈。則絕矣。

鼻衄不止。山梔炒黑為末。吹鼻中。外用溼草紙搭於鼻冲。血止。

陰毒昏不知人。四肢如冰。脣青甲黑。藥不得入。將葱一握束縛。切去根葉。留白三寸。如餅。先將麝香半分填於臍內。

後加葱餅於上以火熨之爛即易納三餅後稍醒先灌薑汁後服薑附湯如不醒再灸關元穴三十壯不醒者必死

熱邪亢極黃連一兩煎水浸新青布搭胸上稍熱即易熱勢稍減即止用此法

服藥即吐者將生薑汁半熱飲止即大抵服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之劑溫飲

傷寒死候陽證見陰脈者死陰陽毒過六七日者死脈浮而滑。身汗如油。水漿不入。喘息不休。身體不仁者死。咳逆上氣。

陽反獨留體如煙熏直視搖頭心絕
汗出髮潤而喘肺絕
脣物反青四肢汗出肝絕
環口靨黑虛寒發黃

脈盛汗出不解者死。尺寸俱虛者死。身熱喘急者死。大發溼家汗則瘕者死。發少陽汗則謔者死。

絕
肌
骨
盛
汗
曰
角
者
死
發
少
陰
汗
則
動
血
謂
之
下
厥
上
竭
者
死
發
風
溫
汗
者
死
發
動
氣
汗
者
死
發
溼
溫
汗
曰
重
暍
死
汗
後
不
在

汗衰謂之陰陽不得汗者死
發熱脈躁疾狂言不能食謂之三死
咳逆不止者死
藏結者死結胸證古有白胎也

汗衰者死
不往江者死
發者服足升有言之能个言二之
少陰吐利煩躁四逆者死
結胸證悉具煩躁者死
發厥至七八日膚冷而躁無時

暫安。日藏少陽與陽明合病。脈長大而弦。日負陰陽易病。頭重眼花。四肢拘急。小腹絞痛。手足攣痛。難經厥云。

暫安。厥反。少陽與陽明合病，脈長大而弦者死。陰陽與少陽並重，目在口下，唇亡者死。下利，當不能食。反。能食者，少陰病，厥逆無脈，與白通猪膽湯。脈陰陽俱虛，熱不止者死。七八日以上，大發熱。

下利當不能食除中死
少陰病厥通無脈暴出者死
用附子仁黃連二錢

者死
脈浮而緊。為傷。浮而緊者。表實可汗。
浮而緩弱。表虛宜救。
沈數或疾滑。或沈實。裏實可下。
沈細微遲。此

脈浮濇而緊寒 浮而緊者表實言汗汗而緩者表虛宜針 汗濇身重汗多汗少者皆亡陽也

裏虛可溫 中候而數為胃 中候而遲為胃 寸口沈細無力為陽中 尺部沈數有力為陰中 寸部數大至

裏虛可溫
中候而數實
寸脈微細為脫
尺脈無力為重
寸脈微細為脫
尺脈無力為陰
寸脈弱者忌
尺脈弱者忌
純弦之脈名

力為重
尺部遲細無力陰
寸脈微細陽
尺脈無力陰
一脈弱才吐
尺脈弱之下
急強之月

曰負死脈也。陰病見陽脈者生。浮數動陽病見陰脈者死。沈瀉弱弦微結促濡

醫案

社友韓茂遠傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷衆皆曰陰證比余診之六脈皆無以手按腹兩手鎖之眉皺作楚按其趺陽大而有乃知腹有燥屎也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟施空澤耳延至診之與余言若合符節遂下之得燥屎六七枚口能言體能動矣故接手不及足者何以救此垂絕之證耶

休室吳文傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷水其弟和乞余決死期手揚足擲難以候脈五六人制之方得就診洪

大無倫按之如絲余曰浮大沈小陰證似陽也與附子理中湯當有生理日休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則

曰竹葉石膏今反用熱劑烏乎敢余曰溫劑猶生涼劑立斃矣日休卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子二錢煎

成入井水冷與飲甫及一時狂躁定矣再劑而神爽服參至五斤而安文義遺以書曰弟為格于所誤既登鬼錄矣

時醫以三黃湯入牛黃服之特加悶絕聲室哀號惟是治終具候目瞑而已不意兄翁毅然以為可治參附一投陰

霸見頭刺妻稚子含淚歡呼一日即愈經年乃復嗚呼父母生之兄翁再生之昊天罔極莫可云喻敢誌顛末乞附

案較俾天下萬世如藥不可浪投命不可輕棄何莫非大仁人回春之澤哉

同社王月懷傷寒至五日下利不止溲瀼目脹諸藥不效有以山藥茯苓與之慮其脫瀉余診之六脈沈數按其臍則痛

此協熱自利中有結實小承氣倍大黃服之得結實數枚諸症悉安

要水張前和傷寒第二日頭痛發熱正在太陽余曰方今正月天令猶寒必服麻黃兩日愈矣若服沖和湯不惟不得

汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置床下薰之得汗如雨密覆半日易被神已爽矣至

晚索粥家人不與余曰邪已解矣必不傳裏食粥何妨至明日果愈不以麻黃汗之傳變深重非半月不愈也

光祿卿吳玄太楊歸頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言謔妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下之余曰此三

陽合病誤下之決不可救乃以白虎湯連進兩服諸證漸減更加天花粉麥門冬二劑而安