

四

卷四

華亭 高父晉霖

上海 葉鳳鳴橘泉 全校
奉賢 孫德 福來

癰瘡治驗

一庠生年十八肄業郭外漸漸髮脫落遍身拘急從風治不效余候其脈沈澁且緩此金乘木位乃微瘡毒氣所感也用發藥三劑吞牛黃蟾酥丸大汗之次服化毒乙字丸兼用龍膽瀉肝湯旬日外果發細瘡如砂仁隨生隨褪二十日外瘡毒盡化眉髮生一詞客染楊梅瘡傳於內室多方調治僅愈惟生兒多天就余商之余曰此乃先天遺毒使然或初生無皮或月內生瘡或作遊風丹腫或發塊或生癰皆微瘡之遺毒也遂倩余診脈細按之六脈無恙氣血和平何生嗣多天乃知其內室蘊毒必重有害胎元即用逍遙湯加忍冬花川石斛貝母威靈仙二十餘劑兼服化毒壬字丸一料嗣服加味養榮丸不一載即舉一嗣後二年又生一女疽瘡俱朗諸疾不侵

一內室患頭痛沿及手臂不能舉動易數醫服藥二百餘劑不獲效後頸項發瘰癧三五枚又以瘰癧攻治亦不效余診其脈與症不合乃出前醫藥按皆以治風治火治痰治血虛治瘰癧余曰是微瘡毒氣所感太陽厥陰受症何治之謬也主人始悟曰向余出京患便毒豈餘毒相染耶先生之言不誣矣即以保安湯十劑間服化毒癸字丸至半月手臂舒暢頭痛全無更甲字丸至二十日外頸塊消散又服加味黃丸方獲全效

一兒纔半歲患赤遊風其父用毒藥發之起瘡如癰或乾或濕身無完膚其友遺余視之余曰此雖胎毒必為微瘡惡氣所遺粟口曰伊父性佞青樓毒或有之遂用化毒庚字丸倍加牛黃兼用辰砂六一散每日間服六次人參湯送下至七日始褪二十日餘一貴介年三十餘染瘡日久妄用剋伐大肉已削止存皮骨且咽喉腐爛外瘡水伏形勢危甚余懶治患者二兄曾犯此症且無嗣請治其弟余用大補藥熬膏日飲每早用化毒戊字丸晚服辛字丸至十五日喉肉始長飲食漸增至三十日身瘡褪剝又服大造丸至五十日肌肉方生七十日能步履而愈

一賈年四十餘患瘡胎毒有年塊發頭頂如拳右膝腫大如銀右腮破潰喉嚨損傷粥食不能下胃每日吐痰升許肢體羸瘦坐以待斃余視其症甚危第脈息尚有胃氣遂以六君子湯加貝母脆星石斛天麻兼服化毒壬字丸至二十日腮潰已腐頭塊始消飲食便利又用戊字丸兼虎潛丸早晚間服至三十餘日而腿膝如故飲食倍增更服辛字丸至五十日而諸症皆愈形體更肥

一婦年四十外九月間染下疳至次年正月遍體癰瘡急欲取斃施寒涼之劑用薰洗之藥瘡痂盡脫色紫黑骨節流痛肩膝起塊余診之右腋微沈左脈滯澁知其寒涼太過毒伏發塊遂用人參二錢子羊肉十兩每日煮食早晚服化毒已字丸旬日外瘡膿盡至二十日塊消痛止又服辛字丸瘡疤光瑩嗣服八味地黃丸而愈

一室女年十四忽小腹作痛不自日痛引腿膝其父延醫甚衆皆云屈腳腸癰痛三月無效後醫作痞塊治亦不效時在正月選余診視候脈不滑不數傍見一婢頸項瘡疤紫黑余知其婢所傳也其父詢為何病子不明言適他往至八月纔回其疾如故飲食少進時作驚悸其父復懇投治遂示以病因即詢諸婢婢曰有之曰驗之矣用歸脾湯兼服化毒兩字丸至半月痛始定又服乙字丸至二十五日諸症皆愈

一太學年三十染微瘡飲食禁忌甚善並不服藥至兩載而瘡不及數月兩腿起小塊月餘而破但不深潰自用膏丹敷貼一伏一起蔓延胸腹頸項頭面耳目一病二十餘年訪治於予予曰乃陽微蛙也毒留肌肉之間失於汗下耳遂用防風通聖散加入參連進五服以祛其蓄毒兼用化毒戊字丸早晚服之乃盈月而愈耳目無恙纔止前丸更用八味丸服至三斤精神如舊後取妻復生嗣焉

一節婦年六十餘患陰囊破爛五年日流臭水無度諸醫勿克開戶靜養適伊孫患慢驚延余治問及此症余曰結毒也壯年少犯疳瘡使毒服藥雖愈餘毒蓄而不散至血衰所作非他藥可療當用加味益氣湯早晚吞化毒壬字丸不用敷藥至三十餘日肉長結痂而愈

一士好採補誤染微毒前陰發瘡臨溺慘痛諸藥無效且腐至根始延余治余曰此名卷心蛙疳瘡當用牛膝枸杞忍冬花黃芪熟地當歸首烏澤瀉石斛等大料熬膏加入參鹿膠日餌早晚服化毒癸字丸半月後瘡肉始長又服戊字丸後用獨參湯吞八味丸精神復長而愈

一膏瘦疳瘡半載沿爛疼痛不止敷藥不效多用草藥單方甚至嘔逆不食危篤欲斃余診其脈兩尺沉澁寸關俱微蓋因草藥損胃遂令脾胃不食故毒氣不能升散以加減六君子湯十餘劑兼進化毒癸字丸至七日始納穀其痛稍減更用乙字丸至半月身發細瘡隨生隨褪至三十餘日全愈

一司樑年近三十患便毒月餘多方不能消散其痛甚烈立則下墜陰囊則上攻兩腎轉側不能自持日夜難以安息始延余治診其脈左手結澁知腎肝毒氣熾甚遂用化毒甲字丸同參字丸早晚服之木通連翹湯送下至七日痛止十四日腫消十八日愈

一重忽作身熱即發丹毒數塊紫黯為赤遊風治以砒治以敷治以藥悉不効余思之曰遊風為患必是其父母發瘡毒氣所遺當用化毒辛字丸倍加牛黃鍾乳粉珍珠犀角羚羊早晚服之霍然而愈

一費年三十忽生一毒於環跳穴下狀如鋒桃紅且紫或痛或痒未幾又發小塊於兩膝下服藥數月不効且潰爛至腿膝延累三載余視其瘡口候其脉氣是結毒也患者曰不第歸詢其母始知為父遺毒所傳余用化毒戊字丸早晚服之至半月進十全大補湯加牛膝米仁至三十日兩腿全愈後服虎潛丸精神始旺

一縣尉年五十餘客京都染楊梅瘡欲速治愈每遇春夏復發緣受選延捱六載精神消耗兩腿破爛艱於步履余始治以大補湯加枸杞薏苡牛膝首烏兼服化毒己字丸半月後更甲字丸服之至三十五日而腿毒全愈後服補駁丸而復元

一孝廉年近三十眼角內潰痛引鼻梁膿水無度脆骨將脫究其因原染微瘡春咬黃魚之後眼角隱隱作痛醫以降火祛風之劑治之不効余知毒伏在內遇毒一擊而發遂服化毒戊字丸和乙字丸早晚間服兼以神功內托散至二十日膿盡肉生後用十全大補湯加川連忍冬花貝母服二十劑眼鼻無恙而愈

一富室奉春染微瘡如痘至仲冬而愈嗣發鵝掌風兩手又年餘腰背生癬痛癢加作薰洗敷藥近愈未幾復作筋骨疼痛流注左右慘楚無時漸至着牀不起方延余治診其兩手脈沉而結知為毒遏於內不得發越故作筋骨疼痛遵用人參八錢升麻半兩川山甲四錢忍冬花四兩土茯苓十兩分作五劑兼服化毒己字丸至七日痛減半月後發細瘡百餘點其痛頓除調理四十日

一梨園染棉花瘡恐親友知覺求醫速痊誤服隱藥而愈期月之後遍身流注作痛身體振掉不能自持甚至着牀不起余曰誤中輕粉毒也早服化毒己字丸晚服癸字丸三六九日單服神水間日服活絡丹四十日全愈

一商年四十外五月間耳內生一瘡不知覺至七月中陰囊生瘡三四枚亦不識至十月陰囊頭頂生瘡共三五十個其形恰似楊梅口渴非常痛不可忍雖天寒穢氣逼人十一月始求余治余曰真少陰症也日用歸脾湯加枸杞山萸早服化毒壬字丸晚服丙字丸至三十餘日全愈患者內室亦感此毒作寒熱骨痛即服化毒己字丸隨生細瘡八十餘點半月後全愈

一乳母年三十患乳癰腫痛百日而潰諸藥勿効穢氣異常延余治之診其脈原非乳癰乃微瘡毒氣所遺究其因乳子之父曾患此症是遺毒外吹遂用化毒乙字丸兼以四物湯加貝母丹皮瓜蒌子木通豈菴香附青皮柴胡服二十餘日而愈

一參軍年四十外突患癰瘡沿及手足其形如錢堆起紅紫黑腐腿過即成白癰經年不瘳就余治遂用人參蛤蚧散兼服化毒辛字丸半月後又服己字丸四十日乃愈

一友人子年十七肄業道院忽患腫痛狀如橫痃叩余索方即以汗下化毒之法消之嗣後肛門生瘡認為痔以爛藥敷之不去後用紅粉霜乃瘡又作筋骨疼痛痛後生瘡加砂仁還余商之余曰此症染發不一小症應當大治伊父好方士不從余言每得一方輒便試之瘡年餘肌肉消瘦外瘡冰伏不起不視又加骨痛頸額腿膝發塊精神衰憊至技窮復求余治乃用八珍湯加忍冬花五加皮何首烏兼用化毒戊字丸早晚間服至三十日痛止瘡褪又加牛膝枸杞至五十日塊消精神漸復後服補髓丸愈

一青樓年二十大作骨痛生瘡如楊梅求治之余用玉樞丹五服作二次服大瀉之每日用子羊肉十兩黃芪兩許土茯苓四兩共煮啖之兼以化毒丙字丸服至十三日大瘡乾褪即生細瘡如瘰癧隨生隨褪絕無異色月餘全愈

一司椽年近五月初夏染瘡瘡服大瀉汗天下等藥約數斗至仲冬肢體剝落飲食不進筋骨疼痛黑瘰遍身耳無聞目無見命懸旦夕余治之精神德甚毒氣深固意不許治病家駕懇用補脾藥旬日纔知食味方用化毒壬字丸與甲字丸早晚間服兼飲大補養榮膏至二十日每黑瘰中生一細瘡隨生隨褪肌瘡始澤疼痛全除內以補髓丸服之外以藥捲紙筒灸耳耳漸知聲目漸有光至五十日方辨人語因倦於藥十年來未能復全聽

一童子年十二因父母患瘰癧而染喉癰延年餘飲食艱難喉開聲啞余謂毒氣壅於肺道以至聲音不出每日早服化毒庚字丸晚服犀角鮮毒丸至半月喉癰始痊又用瓊玉膏不時嚥嚥至二十日聲出如昔

一友年近三十初習醫偶中楊梅瘡毒喉間忽生一瘡如蠶認爲喉蛾大用清涼解毒之藥不効延二百餘日飲食竟不進要斃適余至其友以症告余曰此蠱瘡症也次日往視手上有數瘡隱肉遂用化毒丙字丸強吞以獨參湯接飲間以煎劑調理至七日瘡發口鼻舌本至十日外能進粥又服庚字丸至二十日後善飯不服余藥自爲調理

一黃冠年二旬外染砂仁瘡欲連愈聞方輒試未滿百日而形體食減始就余治脰其脈六部俱微沉而緩余謂寒涼太過脾胃受傷以致飲食不進外瘡永伏兼之筋骨疼痛當以補中益胃使毒氣升發而易化用補中益氣湯倍加參朮服至七日飲食漸增兼以化毒戊字丸早晚服之至半月瘡勢起發筋骨痛定又更乙字丸服之二十五日瘡盡盡褪而愈後服大補丸一料更神復旺一農年四十餘丙子春初前陰生瘡狀如鼓椎他處無一點屢醫不效交冬更服蘇州瓶藥以土茯苓煎湯作引約用百五十劑至丁丑夏其疾反重日夜痛苦無一刻安臥其臭甚惡雖妻兒不敢近炙之不去點之不滅方就余治脰兩手脈微沉而緩惟左尺欲絕是少陰經受病名曰腳腳陽微瘡向被不經之藥妄投毒將內攻是以胸膈迷悶飲食少進遂用牙皂升麻首烏牛膝木通忍冬花煎飲吞護心丹早晚服壬字丸化毒丸至半月方効更用人參黃芪枸杞牛膝鹿角當歸升麻川山甲煎服至二十日外

痛漸減始得安枕兼以靈藥外敷至五十日瘡腫毒氣將脫而患者各費罷藥精神思未能如舊
癰瘡方法

夫癰瘡為患正氣不虛則邪毒不入如肝氣虛邪毒乘之則發橫痃或成魚口甚則筋癰瘡形如砂仁腎氣虛邪毒乘之則生下疳或為蛀梗甚則骨痛瘡形如爛柿肺氣虛邪毒乘之則毒聚於上不為肋疼必生瘡如花脾氣虛邪氣乘之則毒流四肢不作骨痛必生瘡如痘心氣虛邪毒乘之則發大瘡形如楊梅左右相對而作楚有一經獨虛而邪氣獨盛者有兩經三經同虛而瘡病者有現於外而滿身生瘡者有伏於內而遍體骨痛者所以出入無常而隱現不一也當詳究脈理按其毒氣有無輕重應發表則當發表應攻裏則當攻裏應疎利則當疎利應溫補則當溫補應涼解則當涼解勿令虛實顛倒斷削元神蓋病重而藥輕者但無近効病輕而藥重者必生他變所以治此症者須標本兼治不可偏施以攻邪補元為主
主方 凡染有毒之妓或與患者接談稍有所感不拘便毒疳瘡或髮際生瘡梳下薄屬如楚或手足肌膚紅點如斑隱肉當服此方使正氣足而邪自除也若間服牛黃化毒丸其効甚捷

人參 黃芪 川芎 甘草 各一錢 當歸 二錢 忍冬花 漢防己 各一錢 升麻 防風 山甲 各八分

用水二大鍾加生姜三片煎至半飢時服渣再煎

牛黃化毒丹 治已上初見形症○牛黃 四分 須用西黃色鮮黃者用之烏金黃亦可肝 琥珀 五分 血竭 製大黃 雄黃 朱砂 須擇鏡而大塊不涉沙石者用之近有煉 白鮮皮 川山甲 乳香 木香 各取頭末 錢二生 生乳 錢一沒藥 錢一

川貝母 錢三○右各製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研朱硃為衣每早空心服十五丸早晚空腹服十丸

砂糖湯送下中病則已如餘毒未盡藥不可微服此丸切勿忌煩勞惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

養藥湯 治肝經形症益其正氣兼服甲字化毒丸標本同治○當歸 三錢 白芍 川芎 丹皮 遠志 龍胆草

夏枯草 錢一 青皮 柴胡 各八分 用水二鍾煎八分服渣再煎七分服

甲字化毒丸 治肝經內外前後形症○升麻 二錢 牛黃 四分 生生乳 配礬石用佐藥煉百日而成或則生生不息乃此症始

驗余識此方三年始得礬石根煉得法十年間屢用屢効誠千古不易明雄黃 須擇真坑所產通明砂 乳香 各一錢 王道之聖藥也未有此藥不可依方傳合議余方之不靈方法已著明雄黃 不具者用之各一錢硃砂

月月紅 白姜蚕 川山甲 白鮮皮 各取頭末 廣木香 熟大黃 牡丹皮 各二錢○右各製為末用神麴末五錢打稠糊

入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下炒米湯亦可病重者逢三六九日加

服三九元弱者不必加病去藥減如餘邪未盡藥不可微服此丸忌一切惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

補真湯

治腎經形症益其正氣兼服壬字化毒丸標本同治○何首烏

石斛各二錢

杜仲

黃柏各一錢

用水二大鍾煎八分食前服渣再煎服

川牛膝

枸杞子各三錢

五加皮

當歸身

壬字化毒丸

治腎經內外前後形症○虎脰骨各一錢

龜板各一錢

川山甲各一錢

硃砂各一錢

月月各一錢

牛黃各一錢

土貝母各二錢

沉香各一錢

色黑味甜香

蟬退末二錢

沒藥

乳香

白鮮皮

雄黃各一錢

生生乳各一錢

牛黃各一錢

土貝母各二錢

沉香各一錢

色黑味甜香

之者用

琥珀○右各製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子太另研硃砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服十

保脾飲

治脾經形症益其正氣兼服戊字化毒丸標本同治○金釵石斛

薏苡仁

忍冬花各二錢

山藥

茯苓

牡丹皮

陳皮各一錢

人參

甘草

木香各六分

用水二大鍾加棗二枚煎八分服渣再煎服

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症○牛黃各四分

升麻

生生乳各一錢

木香

硃砂

雄黃

川山甲

白鮮皮

乳香各一錢五分

擇清

製大黃二錢

當耗煮酒五十兩入藥則瀉中有補

威靈仙

沒藥

血竭

貝母各一錢

○右各製為

末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子太另研硃砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服十丸人參湯送下奇良湯亦

可病去藥減如餘邪未盡藥不可微服忌同煎

益衛散

治肺經形症益其正氣兼服庚字化毒丸標本同治○人參

貝母

白芨

百合

何膠

桔梗

天門冬各一錢

山藥

木香

甘草各七

用水二鍾煎八分通口服渣再煎服

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症○蟬退各二錢

川貝母各二錢

川山甲各二錢

鍾乳石各一錢

硃砂各一錢

雄黃各一錢

月月各一錢

牛黃各一錢

土貝母各二錢

沉香各一錢

生生乳各一錢

鬱金二錢

牛黃四分

木香

月月紅

乳香

白鮮皮

雄黃各一錢

硃砂各一錢

月月各一錢

牛黃各一錢

土貝母各二錢

沉香各一錢

麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子太另研硃砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服十丸人參湯送下奇良湯亦可病去

藥減如餘毒未盡藥不可微服忌同煎

安神散

治心經形症益其正氣兼服丙字化毒丸標本同治○人參

茯神

黃連

甘草各一

遠志七分

石菖蒲

柏子仁

生地

赤芍

木通各一分

用水二鍾加圓肉七枚煎八分服渣再煎服

丙字化毒丸

治心經內外前後形症○牛黃

珍珠各五

犀角各一錢

瓜兒

血竭

紫草

硃砂

雄黃

白鮮皮各一錢 月月紅各一錢 姜養酒拌炒 蟬退各一錢 山甲各一錢 生生乳各一錢 赤芍藥二錢 ○右各製為末用神麴

五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研砂為衣每早空心服十六丸每晚空服服十一丸人參湯送下龍眼湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹切忌惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

凡服十丸先用滾湯咽嚥清胸中濁氣嗣服丸藥藥後咬糕果之類壓丸藥下胃日宜遵法毋忽

通氣散 治瘡症初起或兩髀俱腫作痛肉未堅實應服此方○木通 瓜蒌子各五錢 忍冬花 粉甘草各三錢 貝母各三錢

紫蘇葉各二錢 ○用水二大鐘煎八分空心服渣再煎七分服

消毒飲 治便毒單生腫硬大作痛者服此方○歸尾 粉草 熟大黃 黑丑搗碎各三錢 姜養 貝母各二錢 ○用水酒各一大鐘煎八分空腹服渣煎七分服

單方 治同前○黑丑頭末七錢 空腹熱酒調服或汗或下下後以粥飲止之

五虎湯 治同前 有元氣者服之○全蝎 姜養 川山甲各五錢 蜈蚣三条 斑毛三個去頭足 生大黃二錢

右研為末分二次空腹酒服

內托散 治便毒腫痛將作膿者服之○地榆一兩 黃芪 粉草 忍冬花 川山甲 白芷各二錢 ○用酒二大鐘煎至一鐘空腹服渣再煎服

透膿散 治便毒有膿未破作痛作脹○皂角刺 黃芪 牛膝各三錢 川芎一錢 當歸尾 川山甲 忍冬花 漢防已各五錢

用水二大鐘煎八分空腹服渣再煎七分若服前方不效者感毒必重當服甲字化毒丸收功

解毒湯 治下疳初起○連翹 荊芥 木通 黃連 生地 牛膝 忍冬花 滑石 甘草 何首烏各等分 ○用水二大鐘煎八分服渣再煎七分服

解毒丸 治同前○白芷一兩 斑毛四十個 二物和一處用酒拌濕透文火炒燥揀出斑毛用白芷 全蝎胡桃肉各一兩二物新瓦上焙微焦 生大黃一兩晒燥四物共研細末酒麴打糊為丸如菜豆大每服三錢熱酒送下

搽藥方 治下疳瘡○海巴子煨存性一錢 研極細每一兩末加冰片五分五色粉霜三分再研盛罐聽用

又方 雨前茶芽 麻黃細切各一錢五分 連四紙方七寸許用鉛粉一錢半擦在紙上鋪前二味捲筒火灼存性研細加水片一分再研盛罐聽用

因方之不當藥之不真也余願此方公之海內而後世易為採擇永無差誤然世之毒藥古方往往用之各有製度耳如水銀一物得雲母礬石同煉其毒即解不比粉霜輕粉之酷烈也余因生乳配風藥而治大痲瘋配癆藥而治傳屍癆配虫藥而治諸虫疾配隔藥而治噎塞翻胃配瘡藥而治頑毒頑癬又漏骨痛種種奇效不獨治廣瘡毒氣之聖藥也大凡藥性與稟性有異人有殺藥者毒藥服之竟不覺察奏功亦緩性有不殺藥者服之便覺眩冒奏效亦速所以為醫全在活潑經曰大積大聚衰其大半而止不必盡劑須要體察病情功效未全者宜再進藥或間日再服或停兩三日再服務宜消息增減毋使過劑以生藥病製金鼎砒方法○淨白砒二兩五錢為末 出山鉛十六兩開如大 用此藥為藥片 小泥罐一個以鉛片抗砒末重重疊在罐內用火文火溶化俟青烟起白烟來霜飛罐口方離火冷定鉛面青如水色如金者無渣質者為妙若色青黑非出山鉛也用之無效

結毒方法

夫結毒者微瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易散解作痛作腫久則硬破潰爛不已治此症者不外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所湊其氣必虛虛者無也空也譬諸國內虛則人民易散百禍易起人之虛者亦猶是矣又曰不能治其虛安問其餘蓋言虛者為百病之本宜首舉以冠諸症也

毒結於肝胆二經者內作筋痛攻走脇肋上至於頭下至於足轉側艱難手不能舉足不能步或頸項發塊或破爛上下或傳他經致生別病當用乙字化毒丸兼用煎劑調理

乙字化毒丸 治已上諸症○牛黃 丁香 牙皂各五錢 琥珀五錢 鬱金 生生乳各一錢 硃砂 雄黃 月月紅

白蘇皮 乳香 川山甲各一錢 製大黃 二錢 姜盞 四錢○右製為末用神麝末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研

硃砂為衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下炒米湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可微百日內勿使大勞大怒順時調理

煎藥方○當歸 二錢 芍藥 一錢 川芎 七分 人參 丹皮各八分 胆草 柴胡 紅花各五錢 枸杞 二錢 石斛 一錢

用水二鍾加蓮子十粒煎八分服渣再煎

胃氣弱加奇良一兩薏苡三錢魂不甯加酸棗仁二錢氣不順加烏藥香附青皮各一錢泄瀉加白朮山藥各一錢五分

毒結於膀胱并腎經者內作骨痛流注上下抽掣時痛發塊白會委中湧泉等穴或陽物腐爛不已或陰囊腫脹作潰或生獨腳湯微瘡或傳他經致生疾病當用於字化毒丸兼用煎劑調理

葵字化毒丸 治已上諸症○牛黃五分 鹿角屑三錢 沉香 生乳各一錢 硃砂 雄黃 月月紅 白鮮皮 乳香

川山甲各一錢 神水一錢 用出山鉛十斤打碎半二十塊塊上貼銀箔取火底紅二隻一撮的上紅開一孔底中穿眼細片

人中白二錢○導痰病者取入家不生病 製何首烏三錢○右製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大

另研硃砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服九丸人參湯送下枸杞湯亦可病去藥減如餘毒未盡藥不可微百日內勿使

大勞大怒順時調理

煎藥方○牛膝 枸杞 山茱萸 五加皮 當歸各二錢 何首烏 補骨脂 淫羊藿 川山甲 山藥各一錢 澤瀉七分

用水二鍾加川椒一撮煎八分服渣再煎○精氣不固加菖蒲人參各一錢 五味四分 內熱加熟地黃柏牡丹皮各一錢 盜汗加白

芍藥杏仁麥門冬各二錢

毒結於脾胃二經者外為小塊肌肉蛙爛蔓延或發大塊破潰腿膝或手足生鵝掌風癰或傳他經致生別病當用已字化毒丸兼

用煎劑調理

已字化毒丸 治已上諸症○牛黃各五錢 木香二錢 生乳一錢 乳香 沒藥各一錢 川山甲 白鮮皮 硃砂

雄黃 月月紅各一錢 蒸大黃 姜萐各二錢 血竭一錢○右製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另硃砂

為衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下砂糖湯亦可病去藥減如餘毒未盡藥不可微百日內勿使大勞大慾

順時調理

煎藥方 茯苓 山藥 石斛 陳皮各一錢 薏苡仁三錢 當歸二錢 白芍 丹皮各八錢 木香 甘草各五錢 肉桂三分

用水三鍾加砂仁六分煎至八分服渣再煎服 飲食少退腦中脹悶加厚朴荳仁各一錢 有痰加半夏枳實白朮各一錢 泄瀉如肉

果訶子各七分 減當歸

毒結於大腸肺經者為喉癰多作痰唾久則成天白蟻漸蝕鼻染低陷或肌膚生癰硬屬如錢色紅紫褪過即成白點或不生癰竟

成赤白癰風或傳他經致成別病當服辛字化毒丸兼以煎劑調理

辛字化毒丸 治已上諸症○白花蛇真蘇州者佳 羚羊角 白鮮皮各三錢 牛黃五分 鍾乳粉 生乳各一錢 川山甲

月月紅 乳香 硃砂 雄黃各一錢 槐花二錢 神水七分 川貝母二錢 蜂房一錢○右製末用神麴末五錢打稠糊

入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十三丸每晚空腹服九丸人參湯送下熟蜜湯亦可病去藥減如餘毒未盡

藥不可儼百日内勿使大勞大怒順時調理

前藥方人參 茯苓 天門冬 貝母 當歸 沙參 玄參各一分 白芍 麥門冬 黃芩各八分 五味子 四分 用水二

鍾加枇杷葉三片煎八分服渣再煎痰多如白末天麻橘紅各一喘急加桑皮甘草紫蘇子各一

毒結於心小腸經者毒注腫仁似乎內障或見或不見或毒聚舌本作腫或十指慘痛無時或瘡生遍體內有不易結痂而腐爛不

己者或俾他經致生別病當服丁字化毒丸兼以前劑調理

丁字化毒丸 治已上諸瘡牛黃 珍珠 蜈蚣去頭足炙 犀角 生生乳 牙皂各一 月月紅 白蘇皮 硃砂各一分

雄黃 乳香 川山甲各一分 琥珀五分 貝母二分 血竭 鬱金各一 製大黃二錢 右製末用神麴末五錢打稠糊

入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服十丸人參湯送下圓眼湯亦可病去藥減如餘毒未盡

藥不可儼百日内勿使大勞大怒順時調理

前藥方人參 茯苓 柏子仁 當歸 生地黃各一分 遠志 麥門冬 牡丹皮 黃連 甘草各八分 用水二鍾加圓眼

肉十枚煎八分服渣再煎不眠加桑仁梔子各一分 咳嗽加貝母知母桑白皮各一 咽喉乾燥加玄參連翹各二 心經元陽虛怯

畏寒者加大附子八分倍人參

拔毒丸 治生瘡時候服輕粉粉霜服前方無效者當用此丸間服槐花一兩 川椒二兩 象牙末一兩 黃丹 乳香

沒藥 人中白各三錢 血竭 蜈蚣 川山甲各一

九如桐子大另研硃砂為衣每日早服二十九丸晚服十五丸土茯苓湯送下百日内忌房勞惱怒日宜食豬肉數兩

又方○用出山鉛九斤打道壺瓶一大把盛火酒十斤奇良二十一兩乳香紅花各一兩川椒龜板各二兩封瓶口坐鍋中水煮一

日夜取出埋地中三日去火毒每日早晚任意飲數盃

加味地黃丸 治病愈後精血未復者宜服○熟地黃八兩 山茱萸 山藥 各四錢 茯苓 牡丹皮各二兩 澤瀉二兩

當歸身 枸杞子各二錢 右各製末搗熟地極爛和藥如乾加煉蜜再搗千杵丸如梧桐子大每日早晚服二錢淡鹽湯送下

補髓丸 治病愈後精血虛者必宜服之○人參 二兩 地黃 四兩 鹿茸 一兩五錢 當歸 四兩 枸杞子 三兩 柏子 茯苓

白朮 各一兩 麥門冬 一兩 鍾乳粉 七錢 沉香 五錢 石斛 二兩 ○右各製末煉蜜和丸如桐子大每日早晚服七十粒秋石

煎湯送下醞酒亦可

安神丸 治病愈後精神恍惚并疲動火煩渴○人參 柏子 當歸 麥冬 棗仁各一兩 生地 遠志 菖蒲 玄參 貝母

黃連 五味各六分 ○右各製末龍眼肉七兩熬膏和丸如棗豆大辰砂為衣每服五十丸燈心湯送下

加味養榮丸 治婦人病愈後氣血衰少發熱作嘔○當歸 三錢 熟地五錢 白芍 丹皮各兩 香附四兩 人參 貝母

阿膠 山藥 茯苓 黃芩 川芎各一兩 白朮一兩 ○右各製末煉蜜搗和丸如桐子大每日早晚服之九十九丸淡鹽湯送下

助胃膏 治脾胃虛弱飲食少進肌膚不澤○奇良二十兩 甘草二兩 枸杞子四兩 補骨脂三兩 薏苡仁八兩 ○先用大

棗二斤水三十碗煎至水減一半去大棗加前藥文火熬濃約存汁四鍾加飴糖十兩再熬數沸盛磁瓶坐冷水內一日每日服

五六次每次服三錢其後飲人參湯其效更速

凡患筋骨疼痛先服化毒丸七日用後方

熨烙方○川烏 草烏 肉桂 干姜 胡椒各等分 ○煮糯米飯和藥搗勻敷患處外以火熨之○患喉癰久不愈者先服化毒

丸七日用後方吹之

吹藥方○西黃 一分 冰片 一分 珍珠 二分 硃砂 八分 象牙末 七分 龍骨 一錢 瑤珠 一錢五分 麝香 一錢五分 右製共研極細盛

磁罐患者先用苦茶汨漱只吹三五次○凡患驚風癰癰先服化毒丸九日用後方薰洗方可擦藥

薰洗方 用桐油一斤內活蟾四隻文火煮之洗患處拭乾嗣用生雞腦蘸五色粉霜擦患處以肉熟為度日一吹中病則已

五色粉霜 是外科要藥貼微瘡去腐肉長新肌能愈諸瘡殺諸蟲數諸毒○水銀 二兩 鉛 一兩 水硝 四兩 白礬 三兩

青鹽 八錢 ○研勻入陽城罐內文火煨一香去其濕氣用鐵油盪盪口以鐵線扎緊並泥封固先文後武武火時蓋上擦水 三

香雖火取出埋土中二日夜取出晒乾研細盛罐聽用

死證

瘡瘍外現七惡服藥止者死未潰內陷赤面唇焦便溺者死發渴不止者死新肉如板片不食者死喘急者死煩悶者亦主死潰喉

者亦死入案者亦死胸前化爛不止者死陰瘡入腹者死髮深寸許者死潰連頤後一寸三分亦主死陰症多服涼藥者死頸腫漫

延不潰者死久疔成癰者誤治亦死肚腹瘡潰膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者此內膿穿也又有瘡口鼻如兒啼者亦內膿穿

也累瘡又生癰母者死此外腫瘍依法而不應者緣邪盛正虛不能托毒也死在一旬之外潰瘍溫補而不腐者此邪滯元虛也死

期在於二旬之外收斂之時而不應者必因初時攻伐太過死期在於月餘之後

膏藥方○貼楊梅瘡及癰疽鵝掌風結毒破爛拔毒呼膿暖筋骨長肉生肌

千里光自熬汁十兩煮酒六兩內當歸大黃赤芍肉桂生地黃參躑躅花各五錢文火煎濃約存汁一碗許收汁用麻油二十四兩加頭髮三兩煎至滴水成珠入前藥汁文火煎和加研細鉛粉蜜陀僧各五兩緩緩攪轉俟火候却好滴水不老不燥離火加入研細乳香沒藥黃占白占各三錢麝香三分粉霜一錢收罐坐水中出火毒攤貼須用重湯頓軟
余按臟腑感染陰陽傳遞配製化毒十丸以為定法而服藥亦有效但人之稟性不同有素服藥素不服藥素欲素不欲之殊在患者當請上工酌擬詳服稟賦藥性時候或補不失始復全功尊生者不可不察也

藏瘡宜忌

夫宜忌者即所苦所欲也五臟各有所宜五臟各有所忌如癰瘡一症舉世未諳藥物宜忌并飲食宜忌混同施治殊不知從其氣則和違其性則有偏勝之害故凡有益於陽者必不宜乎陰有益於陰者必不宜乎陽宜乎燥者不宜乎濕宜乎濕者不宜於燥能破散者不可以治虛能收斂者不可以治實故藥物有良毒之難齊氣味之莫測有相益相濟相畏相惡相忌相制之不同不諸宜忌者則其失也固請以余所見聞者陳之一友患便毒其勢熾盛欲速愈單服大黃五錢不利又服七錢亦不利後加至兩許終不能通而大黃毒氣上攻七竅流血而死一人染廣瘡服敗毒藥不效後服商陸根汁遂吐瀉經兩日不止藥食俱不受日而死一人患楊梅瘡毒結於百會穴破爛兩年諸醫不效偶遇方士傳靈砒方即製服之經七日齒落喉閉飲食不進而亡一人生棉花瘡無力贈藥用毒蛇一條酒煮蟬飲即時昏暈膚理腫裂出水至五日方知痛苦其瘡猶不愈一人患疳瘡便毒兼之筋骨疼痛數服草藥不放又取活蟾七隻內猪脂煮食食未畢作吐不已水漿不進方延余治余診之曰胃氣傷也非大劑人參不治遂咀人參五錢加烏梅七個同煎漸飲之又服一劑纔能進粥後用化毒甲字丸一料服盡而愈一人生魚口不痊服大料五虎湯少頃小便作脹日夜叫號尿不能溺連余診之余曰乃疳毛毒氣為患當速解之即用猪脂二兩糯米五合粉草五錢長流水煎預服外以葱白食鹽煎湯洗解出血筋數條始通其毒仍不減後又生瘡如砂仁從余調治方愈噫今之庸愚藥不經之水煎預服外以葱白食鹽煎湯洗解出血筋數條始通其毒仍不減後又生瘡如砂仁從余調治方愈噫今之庸愚藥不經之方投有毒之藥外患未盡內毒尚存諸如此類誤莫能拔宜知脈症相對名實相符方可投劑今以五臟苦欲藥物宜忌謹錄心為君主之官神明出焉其華在面充其血脉為陽中之太陽為壯臟通於夏氣神能固守則氣血流通萬物係之以興亡思慮太過則虛邪從之病于內傷者十居六七病于外感者百無四五調治者當以安神養血為主味忌鹹多食鹹則脈凝泣而變色味宜苦羊肉小麥杏鰾之屬心苦散緩急食酸以收之五味子之屬是已飲則宜靜清明故宜酸以收其緩也數者和調之義也心

君本和調邪熱乘之則燥急故復用芒硝之酸寒除其邪熱以軟其急燥堅動之氣使復其平也以鹹補之澤瀉導心氣以入腎也煩勞則虛而生熱故用參苓甘草之甘溫以益元氣而虛熱自退故為之瀉也心以下交於腎為泰少陰之鹹以潤之即得心與腎交也火空則發虛為水味得之使心氣下降是既濟之道也有補之義也故軟即補也

心經藥食所宜

藥宜

補

人參 茯神 遠志 當歸 柏子 石菖蒲 紅花 天雄 桂心 血餘 紫石英 甘草 首蓿 辰砂 琥珀

乳香

胎元

瀉

升麻 細辛 麻黃 紫葦 木通 川山甲 連翹 貝母 鬱金 蜂房 赤茯苓 犀角 珍珠 血結 片腦

赤豆

忍冬 花

黃連 牛黃 麝

食宜

羊肉

鹿肉 鷄卵 牛乳 犬肉 猪肉 火肉 風魚 淡菜 龍眼 荔枝 芝蔴 萊豆 萵菜 橙 藕

梨

香 棗

心經藥食所忌

藥忌

死砂

生硫 輕粉 苦參 麥冬 蛇 韶粉 蝸牛 硝

食忌

石膽

蟹 螳 猪肝 鴨卵 鵝 蛤 南翅 荳 蜆 茄 茭白 諸壯血

肝為將軍之官謀慮出焉血之本魂之居也其華在爪其氣從筋為陽中之少陽為牡臟通於春氣魂靜則至道不亂本性易動動則有摧折之意焉怒甚則血不歸肝而溢于外病于外感內傷者居其味忌辛多食辛則筋急而爪枯味宜酸犬肉小荳李韭之屬肝苦急急食甘以緩之甘草之屬是也扶蘇條達木之象也升發開展魂之用也故其性欲散急食辛以散之解其束縛也是散即補也辛可以散川芎之屬是也若其太過則屈制之母使通分酸可以收斂藥之屬是也急也飲也肝性之所苦也達其性而苦之肝虛矣補之以辛是辛以散為補也細辛生薑陳皮之屬是已

肝經藥食所宜

藥宜

補 當歸 川芎 地黃 山萸 酸仁 遠志 茯神 甘草 阿膠 桂皮 木瓜 烏梅 琥珀 辰砂 龍齒

龜甲 牛黃

瀉 芍藥 膽草 柴胡 青皮 忍心 香附 丹皮 瓜蒌 菊花 升麻 木通 射干 秦皮 皂角 薄荷

全蝎 川山 降香 羚羊 乳香 片腦 珍珠 膽礬 姜蚕 麝

食宜

犬肉 鴨 雁 鹿肉 鱸魚 火肉 風魚 猪腎 鷄卵 葡萄 橄欖 李 薺 林檎 馬齒莧

肝經藥食所忌

藥忌

死砂 生硫 輕粉 木鼈 胡黃 商陸

食忌

石魚 水鷄 鵝 鴨卵 猪肝 蝦 茄 蒜 芋 杏 諸血

脾為倉庫之官五味出焉主運動磨物之臟營之居也其華在唇四白其充在肌此為至陰之類通于土氣為牝臟意平則智無散越宜健而不宜滯濕則滯矣滯則邪氣從之病于內傷者多半調治者當以去濕導滯味忌酸多食酸則肉脹臃而唇揭味宜甘牛肉粳米棗葵之屬脾苦濕急食苦以燥之使復其性之所喜脾斯健矣白朮之苦溫是已過燥則復欲緩之以甘甘草之屬是已稼穡之化故甘先入脾性欲健運氣旺則行補之以甘人參是已長夏之令濕熱主人脾氣斯困故當急食苦以瀉之黃連之苦寒是已虛則宜補火甘草之甘以益血大棗之甘以益氣乃所以補其不足也

脾經藥食所宜

藥宜

補 白朮 茯苓 人參 黃芪 意仁 山藥 陳皮 甘草 蒼朮 扁豆 川石 苡薏 天麻 當歸 奇良

雄黃 辰砂 丁香 姜糖 山查

瀉 升麻 白芍 防己 白芷 砂仁 烏藥 草果 大黃 靈仙 鼠粘 忍冬 山甲 皂子 沉香 沒藥

乳香 山椒 烏蛇 牛黃 麝

食宜

牛肉 豬脂 鴨 犬肉 鹿肉 鱧 蚶 時魚 鷄卵 火肉 羊 鯽魚 豬脰 艾 蓮肉 棗

荔枝 橄欖 松子 川椒 姜 萊菔 芹

脾經藥食所忌

藥忌

冠砂 生硫 苦參 胡黃 地黃 胆草 蝦蟇 蜈蚣

食忌

石首 鵝 豬肝 鴨卵 蝦 南麴 菱 梅 柰 醋 榴 韭 諸血

肺為相傳之官治節出焉氣之本魄之居也其華在毛其充在皮為陽中之太陰為壯臟通于秋氣魄安則德修壽延氣常則順氣變則逆通則達其性矣病于外感者居半調治者當以清肅上焦而使氣平味忌苦多食苦則皮枯而毛折味宜辛鷄肉黃黍桃蔥之屬肺苦氣上逆急食苦以瀉之黃芩之屬是已其政欽肅故其性喜收宜食酸以收之白芍之屬是已賊肺者熱也肺受熱邪急食辛以瀉之桑白皮之屬是已不飲則氣無所管束是肺失其職也故宜補之以酸使逆其收斂之性是即補也五味子之屬是已

肺經藥食所宜

藥宜

補 人參 黃芪 茯苓 阿膠 白芷 木香 桂枝 沙參 蛤蚧 琥珀 鍾乳 辰砂 牛黃

瀉 麻黃 杏仁 防風 升麻 川芎 桂枝 羌活 荊芥 橘紅 射干 檳榔 蘇皮 花粉 牙皂 蘭葉

挽花 鼠粘 山甲 姜蚕 神水 片腦 白蛇 麝

食宜

鷄 豬肺 火肉 風魚 豬脰 羊肉 鷄卵 牛乳 鵝 鵝 胡荽 萊菔 芹 麻油 松子 榛子