

黴瘡秘錄

上海會文堂書局發行



蠱瘡方法

海寧陳司成九韶甫著

夫蠱瘡爲患。正氣不虛。則邪毒不入。如肝氣虛。邪毒乘之。則發橫痃。或成魚口。甚則筋疼。瘡形如砂仁。腎氣虛。邪毒乘之。則生下疳。或爲蛀梗。甚則骨痛。瘡形如爛柿。肺氣虛。邪毒乘之。則毒聚於上。不爲筋疼。必生瘡如花。脾氣虛。邪毒乘之。則毒流四肢。不作骨痛。必生瘡如痘。心氣虛。邪毒乘之。則發大瘡。形如楊梅。左右相對而作。楚有一經獨虛。而邪氣獨盛者。有兩

經三經同虛而齊病者有見於外而滿身生瘡者有
伏於內而遍體骨痛者所以出入無常而隱見不一
也當詳究脉理按其毒氣有無輕重應發表則當發
表應攻裏則當攻裏應疎利則當疎利應溫補則當
溫補應涼解則當涼解勿令虛實顛倒劉削元神蓋
病重而藥輕者但無近効病輕而藥重者必生佗變
所以治此症者須標本兼治不可偏施以攻邪補元
爲主

主方

凡染有毒之妓或與患者接談稍有所感不拘便

毒疔瘡。或髮際生瘡。梳下薄靨如麩。或手足肌膚紅點如斑。隱肉當服此方。使正氣足而邪自除也。若閒服牛黃化毒丸。取効甚捷。

人參

黃芪

川芎

甘艸

各一錢

當歸

二錢

忍

冬花

漢防已

各一錢五分

升麻

防風

川山甲

各八分

用水二大鍾。加生薑三片。煎至半。饑時服。渣再煎。

牛黃化毒丹

治已上初見形症。

牛黃

四分

須用西黃色鮮黃者用之。烏金黃亦可。肝黃形如筆管。厚實者功次之。廣黃味薄。

功不及半

琥珀

五分

血竭

製大黃

雄黃

朱砂

須擇鏡面大塊不涉沙石者用之近有煉
丹不就轉與藥店賣者有大毒不入服藥

白蘚

皮 川山甲

乳香

木香

各取頭末
一錢五分

蟬退末

二錢

生生乳

一錢

沒藥

一錢七分

川貝母

三錢

右各製為末用神麴末五錢打稠糊入藥麯勻丸
如梧桐子大另研朱砂為衣每早空心服十五丸
每飢空腹服十丸砂糖湯送下中病則已如餘毒
未盡藥不可徹服此丸切忌煩勞惱怒焦躁茶酒
止可用十分之三

養榮湯

治肝經形症益其正氣兼服甲字化毒丸標本同

治

當歸

錢三

白芍

川芎

丹皮

遠志

龍膽艸

夏枯艸

錢各一

青皮

柴胡

分各八

用水二鍾煎八分服渣再煎七分服

甲字化毒丸

治肝經內外前後形症

升麻

錢二

牛黃

分四

生生乳

配礬石用佐藥煉百
日而成成則生生不

息乃此症始末要藥但製度繁費不易修合如火
候不到者服之無驗余識此方三年始得礬石煨
煉得法十年間屢用屢效誠千古不易王道之聖
藥也未有此藥不可依方修合議余方之不靈方
法已著名醫會編因刻
未竣今錄本方附後

雄黃

須擇舊坑所產透
明不臭者用之各

錢一

硃砂

乳香

各一錢七分

月月紅

白殭蠶

川山甲

白蘚皮

各取頭末一錢五分

廣木香

熟大黃

牡丹皮

各二錢五分

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥擣勻丸如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十三丸每飢空腹服九丸人參湯送下炒米湯亦可病重者逢三六九日加服三丸元弱者不必加病去藥減如餘邪未盡藥不可徹服此丸切忌惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

補真湯

治腎經形症益其正氣兼服壬字化毒丸標本同治。

何首烏 川牛膝 枸杞子各三錢 五加皮 當

歸身 石斛各二錢 杜仲 黃柏各一錢

用水二大鍾煎八分食前服渣再煎服。

壬字化毒丸

治腎經內外前後形症。

虎脛骨炙 酥 龜版炙 酥 川山甲炙 脆 硃砂各一錢 六分

月月紅即血餘用童子頭髮 月刺者煨一錢五分 蟬退末二錢 沒藥

乳香 白蘚皮 雄黃各一錢 五分 生生乳一錢 牛

黃

分五

土貝母

錢二

沈香

七分
黑味甜

取沈水色
香者用之

琥

珀

分七

右各製爲末。用神麴末五錢。打稠糊入藥。搗勻。丸如桐子大。另研硃砂爲衣。每早空心服十五丸。每飢空腹服十丸。人參湯送下。枸杞湯亦可。病去藥減。如餘邪未盡。藥不可徹。禁忌同前。

保脾飲

治脾經形症。益其正氣。兼服戊字化毒丸。標本同治。

金釵石斛

薏苡仁

忍冬花

各二錢

山藥

茯苓

牡丹皮

陳皮各一錢

人參

甘艸

木

香各六分

用水二大鍾。加棗二枚。煎八分服。渣再煎服。

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症。

牛黃四分

升麻

生生乳各一錢

木香

硃砂

雄黃

川山甲

白鮮皮

乳香

各一錢五分
擇滴乳不襍沙

石二煮
炙用

製大黃

二錢
兩當耗
宜九浸九蒸九曬
每黃十
煮酒五十兩
人藥則瀉中

有補

威靈仙

沒藥

血竭

貝母

各一錢
八分

右各製爲末。用神麴末五錢打稠糊。入藥搗勻。丸

如桐子大。另研硃砂爲衣。每早空心服十五丸。每
飢空腹服十丸。人參湯送下。奇良湯亦可。病去藥
減。如餘邪未盡。藥不可徹。禁忌同前。

益衛散

治肺經形症。益其正氣。兼服庚字化毒丸。標本同
治。

人參 貝母 白芨 百合 阿膠 桔梗 天

門冬

錢各一

山藥

木香

甘艸

各七分

用水二大鍾。煎八分。通口服。渣再煎服。

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症。

蟬退

淨去沙土

川山甲

炙

貝母

各二錢

鍾乳石

須擇

湖廣產者長大脆白用天葵甘艸水煮一日研萬遍用之色襍性堅者不用

鬱金

二錢

生生乳

已上各一錢

牛黃

四分五釐

木香

月月紅

乳香

白鮮皮

雄黃

各一錢五分

硃砂

一錢七分

右各製爲末。用神麴末五錢打稠糊入藥擣勻。丸

如桐子大。另研硃砂爲衣。每早空心服十五丸。每

朝空腹服十丸。人參湯送下。奇良湯亦可。病去藥

減。如餘邪未盡。藥不可徹。禁忌同前。

安神散

治心經形症。益其正氣。兼服丙字化毒丸。標本同治。

人參 茯神 黃連 甘艸 各一錢 遠志 七分 石

菖蒲 柏子仁 生地 赤芍 木通 各一錢二分

用水二鍾。加圓肉七枚。煎八分服。渣再煎服。

丙字化毒丸

治心經內外前後形症。

牛黃 珍珠 各五分 犀角 蜜色味香有棕紋者用之 瓜兒血

竭 紫艸 硃砂 雄黃 白鮮皮 乳香

月月紅 各一錢五分 僵蠶 酒拌炒去絲 蟬退 川山甲

各一錢
三分

生生乳
錢一

赤芍藥
錢二

右各製爲末。用神麴末五錢打稠糊入藥。搗勻。丸如桐子大。另研硃砂爲衣。每早空心服十六丸。每翹空腹服十一丸。人參湯送下。龍眼湯亦可。病去藥減。如餘邪未盡。藥不可徹。切忌惱怒焦躁。茶酒止。可用十分之三。

凡服十干丸。先用滾湯汨嚥。清胸中濁氣。嗣服丸藥。藥後啖糕果之類。壓丸藥下胃。日宜尊法。毋忽。通氣飲。

治橫痃初起。或兩髀俱腫作痛。肉未堅實。應服此。

方。

木通

瓜蒌子

錢各五

忍冬花

粉甘艸

錢各三

貝母

紫蘇葉

錢各二

用水二大鍾煎八分。空腹服。渣再煎七分服。

消毒飲

治優毒單生腫。硬大作痛者。服此方。

歸尾

粉艸

熟大黃

黑丑

搗碎各三錢

僵蠶

貝母

錢各二

用水酒各一大鍾。煎八分。空腹服。渣煎七分服。

單方

治同前。

黑丑頭末

錢七

空腹熱酒調服。或汗或下。下後以

粥飲止之。

五虎湯 治同前。有元氣者服之。

全蝎

僵蠶

川山甲

炙各一錢五分

蜈蚣

三條

班毛

三個去頭足糯米拌炒

生大黃

二錢

右研爲末。分二次。空腹酒服。

內托散

治便毒腫痛。將作膿者服之。

地榆

一兩

黃芪

粉州

忍冬花

川山甲

白

芷

各二錢

用酒二大鍾煎至一鍾空腹服渣再煎服

透膿散

治便毒有膿未破作痛作脹

皂角刺

黃芪

牛膝

各三錢

川芎

一錢

當歸尾

川山甲

忍冬花

漢防已

各一錢五分

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分若服前方不効者感毒必重當服甲字化毒丸收功

解毒湯

治下疳初起

連翹

荊芥

木通

黃連

生地

牛膝

忍