

护理学（师）
基础知识模拟试卷



人民军医出版社

护理学（师）

基础知识模拟试卷

模拟试卷一

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 滴虫阴道炎阴道分泌物的特征是
 - 豆渣样
 - 脓性
 - 黏液状
 - 泡沫状
 - 血性
- 影响子宫内膜由增殖期转变为分泌期的主要激素是
 - 雌激素
 - 孕激素
 - 雄激素
 - 促卵泡素
 - 黄体生成素
- 女性外生殖器不包括
 - 阴阜
 - 阴蒂
 - 阴道
 - 小阴唇
 - 前庭大腺
- 正常妊娠血液循环系统的生理改变是
 - 血浆蛋白含量降低
 - 血沉减慢
 - 红细胞总数减少
 - 纤维蛋白原含量降低
 - 白细胞总数减少
- 宫内节育器避孕的原理是
 - 抑制排卵
 - 阻止受精卵的运行
 - 改变输卵管蠕动方向
 - 改变子宫内膜的功能
 - 改变宫腔内环境
- 硫酸镁治疗重度妊娠高血压综合征的药理作用是
 - 降压
 - 解痉
 - 利尿
 - 镇静
 - 扩容
- 煮沸灭菌时，在水中加入碳酸氢钠制成 2% 溶液，可使沸点提高到
 - 103℃
 - 105℃
 - 107℃
 - 109℃
 - 111℃
- 急性肾衰竭病因中属于肾性因素的是
 - 休克
 - 严重脱水
 - 心功能不全
 - 严重肾挤压伤

- E. 前列腺增生
9. 急性肾衰竭少尿期危害最大的电解质改变是
- A. 高血磷
B. 低血钙
C. 高血钾
D. 高血镁
E. 低血钠
10. 局部麻醉药中毒出现严重惊厥, 处理时首选的药物是
- A. 硫喷妥钠
B. 地西洋
C. 哌替啶
D. 氯丙嗪
E. 苯巴比妥钠
11. 最易引起喉痉挛的麻醉方法是
- A. 普鲁卡因局部麻醉
B. 普鲁卡因蛛网膜下腔麻醉
C. 氯胺酮静脉麻醉
D. 硫喷妥钠静脉麻醉
E. 氧化亚氮吸入麻醉
12. 在对心室颤动病人进行心肺复苏时, 首选药物是
- A. 碳酸氢钠
B. 阿托品
C. 利多卡因
D. 异丙肾上腺素
E. 氯化钙
13. 引起丹毒的最常见致病菌是
- A. 金黄色葡萄球菌
B. β 溶血性链球菌
C. 变形杆菌
D. 大肠埃希菌
E. 脆弱拟杆菌
14. 引起破伤风的病原体属于
- A. 革兰染色阴性厌氧芽胞杆菌
B. 革兰染色阴性需氧芽胞杆菌
C. 革兰染色阳性厌氧芽胞杆菌
D. 革兰染色阳性需氧芽胞杆菌
E. 革兰染色阴性厌氧杆菌
15. 属于烷化剂类的抗癌药是
- A. 环磷酰胺
B. 阿糖胞苷
C. 氟尿嘧啶
D. 甲氨蝶呤
E. 阿霉素
16. 虽为肿物, 并非肿瘤的是
- A. 黑色素瘤
B. 粉瘤
C. 脂肪瘤
D. 纤维瘤
E. 血管瘤
17. 中厚皮片包括有
- A. 表皮
B. 表皮及极少量真皮
C. 表皮及部分真皮
D. 表皮及全部真皮
E. 表皮、真皮及少量皮下组织
18. 乳癌最好发的部位是乳房的
- A. 外上象限
B. 内上象限
C. 外下象限
D. 内下象限
E. 中心
19. 急性脓胸最常见的致病菌是
- A. 厌氧菌
B. 大肠埃希菌
C. 肺炎球菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 溶血性链球菌
20. 最易发生嵌顿的疝是
- A. 腹股沟直疝
B. 股疝
C. 婴儿脐疝
D. 切口疝
E. 白线疝
21. 可引起原发性腹膜炎的是

- A. 胃穿孔
B. 肠穿孔
C. 阑尾炎穿孔
D. 胆囊炎穿孔
E. 女性生殖器感染
22. 胃癌最好发部位是
A. 贲门
B. 胃底
C. 胃体
D. 胃窦
E. 幽门
23. 肛瘘形成的相关因素是
A. 肛裂
B. 内痔
C. 外痔
D. 直肠肛管周围脓肿
E. 直肠脱垂
24. 门静脉高压症患者的门腔静脉交通支开放曲张, 其中最具有临床意义的是
A. 胃底与食管下段静脉交通支
B. 脐旁与腹壁上静脉交通支
C. 脐旁与腹壁下静脉交通支
D. 腹膜后静脉交通支
E. 直肠下端与肛管静脉交通支
25. 左心衰竭出现的脉象改变是
A. 奇脉
B. 不整脉
C. 交替脉
D. 水冲脉
E. 缓脉
26. 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为
A. 嗜睡
B. 昏睡
C. 意识模糊
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
27. 面容枯槁, 面色灰白或发绀, 表情淡漠是
A. 急性病容
B. 慢性病容
C. 危重病容
D. 甲亢病容
E. 二尖瓣病容
28. 胸部触诊语颤增强见于
A. 肺水肿
B. 肺淤血
C. 气胸
D. 肺空洞
E. 肺实变
29. 支气管哮喘的发病机制是
A. 遗传基因突变
B. 气道变态反应
C. 心肌急性缺血
D. 肺泡充血水肿
E. 肺动脉栓塞
30. 导致肺癌发生的最重要危险因素是
A. 电离辐射
B. 食物中毒
C. 汽车尾气
D. 吸烟
E. 遗传因素
31. 心力衰竭加重最多见的因素是
A. 呼吸道感染
B. 体力活动多
C. 精神压力大
D. 高盐饮食
E. 药物使用不当
32. 引起慢性风湿性心脏瓣膜病的病原菌是
A. 军团菌
B. 厌氧菌
C. 肺炎链球菌
D. 流感病毒
E. 溶血性链球菌
33. 心绞痛发生的最主要原因是
A. 主动脉瓣狭窄
B. 主动脉痉挛

- C. 全身小动脉痉挛
- D. 冠状动脉痉挛
- E. 肺动脉痉挛

34. 上消化道大出血最常见的原因是

- A. 慢性胃炎
- B. 胃癌
- C. 消化性溃疡
- D. 胆道结石
- E. 胰腺炎

35. 在我国,肝硬化的主要病因是

- A. 血吸虫病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆石症
- D. 胆道蛔虫病
- E. 胃溃疡

36. 急性肾盂肾炎最常见的致病菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 厌氧菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 肺炎杆菌

37. 慢性肺源性心脏病发病的关键环节是

- A. 气管阻塞
- B. 肺泡膨大
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

38. 慢性胃炎主要病因是

- A. 幽门螺杆菌
- B. 消炎药物
- C. 烟酒过度
- D. 暴饮暴食
- E. 胆汁反流

39. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素是

- A. 细菌直接损害
- B. 免疫介导炎症
- C. 超量蛋白饮食
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性心力衰竭

40. 甲状腺功能亢进的主要原因是

- A. 精神刺激
- B. 细菌感染
- C. 过度劳累
- D. 自身免疫
- E. 外部创伤

41. 阻塞性肺气肿的主要病因是

- A. 慢性支气管炎
- B. 急性支气管炎
- C. 慢性肺心病
- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

42. 脑出血最常见的原因是

- A. 肺心病
- B. 高血压
- C. 心肌炎
- D. 风心病
- E. 冠心病

43. 支气管扩张最常见的病因是

- A. 上呼吸道感染
- B. 麻疹、百日咳
- C. 肺结核
- D. 重症肺炎
- E. 支气管哮喘

44. 急性心肌梗死主要由于

- A. 肺动脉栓塞
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 冠状动脉梗死
- D. 上腔静脉受压
- E. 肾动脉狭窄

45. 成人缺铁性贫血最常见的原因是

- A. 饮食中缺铁
- B. 骨髓造血不良
- C. 铁需要量过多
- D. 慢性失血
- E. 吸收铁不良

46. 胰岛素依赖型(1型)糖尿病的发病机制是

- A. 细菌感染

- B. 摄糖过多
C. 代谢不良
D. 供血不足
E. 自身免疫
47. 系统性红斑狼疮发病原因是
A. 自身免疫
B. 烈日曝晒
C. 烟酒过多
D. 劳累过度
E. 药物过敏
48. 吉兰-巴雷危及生命的原因是
A. 吞咽困难
B. 呼吸肌麻痹
C. 面神经麻痹
D. 水、电解质紊乱
E. 肢体感觉异常
49. 在小儿年龄分期中, 幼儿期是指
A. 从出生到满 28d 内
B. 从出生到满 1 周岁
C. 从 28d 到满 1 周岁
D. 1 周岁后到满 3 周岁之前
E. 3 周岁后到满 6 周岁之前
50. 正常小儿前囟最迟闭合的时间为
A. 3~4 个月
B. 5~6 个月
C. 12 个月
D. 18 个月
E. 24 个月
51. 小儿急性上呼吸道感染最常见的病原体是
A. 细菌
B. 真菌
C. 病毒
D. 支原体
E. 衣原体
52. 出生体重为 3.5kg, 现体重为 7kg, 按公式计算其月龄为
A. 3 个月
B. 5 个月
C. 6 个月
D. 8 个月
E. 10 个月
53. 婴儿平均每日每千克体重所需水量为
A. 100ml
B. 110ml
C. 120ml
D. 150ml
E. 180ml
54. 极低出生体重儿是指出生体重不足
A. 1 000g
B. 1 250g
C. 1 500g
D. 2 000g
E. 2 500g
55. 5 岁小儿正常血压为
A. 14.7/9.33kPa(110/70mmHg)
B. 13.3/8.0kPa(100/60mmHg)
C. 12.0/8.0kPa(90/60mmHg)
D. 12.0/6.67kPa(90/50mmHg)
E. 10.7/6.67kPa(80/50mmHg)
56. 小儿中最常见的发绀型先天性心脏病是
A. 室间隔缺损
B. 房间隔缺损
C. 肺动脉狭窄
D. 大血管错位
E. 法洛四联症
57. 引起夏季小儿腹泻的病原体主要是
A. 致病性大肠埃希菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 轮状病毒
D. 变形杆菌
E. 柯萨奇病毒
58. 女性, 27 岁, G₁P₁, 自然分娩一男婴, 体重 4 100g, 胎盘娩出后半小时内阴道出血 500ml, 色红。查看胎盘完整, 见有血管中断于胎膜边缘, 其出血原因最可能是
A. 胎盘残留

- B. 子宫收缩乏力
- C. 胎盘剥离不全
- D. 软产道损伤
- E. 宫颈裂伤

59. 女性, 26岁, 宫颈黏液分泌增多, 黏液变得稀薄, 拉丝度长, 引起此种变化的激素是

- A. 促性腺激素释放激素
- B. 绒毛膜促性腺激素
- C. 促卵泡素
- D. 雌激素
- E. 孕激素

60. 女性, 34岁, 主诉停经50d, 阴道不规则出血12d, 左下腹痛1d, 妇科检查: 阴道后穹穿刺抽出不凝血4ml, 尿妊娠试验(+), 诊断为异位妊娠, 其可能的病因是

- A. 子宫肌炎
- B. 子宫内膜炎
- C. 阴道炎
- D. 宫颈炎
- E. 输卵管炎

61. 女性, 28岁, 孕35周, 阴道少量出血4h, 伴有剧烈腹痛。检查子宫硬如板状, 压痛(+), 胎心112/min, 胎位未触清。诊断可能性最大是

- A. 前置胎盘
- B. 先兆早产
- C. 急产
- D. 子宫破裂
- E. 胎盘早剥

62. 女性, 24岁, 平日月经不规律, 因自己无意中摸到腹部包块而就诊, 查尿妊娠反应阳性, 可听到胎心, 宫底在脐耻之间, 估计孕周为

- A. 10周末
- B. 12周末
- C. 14周末
- D. 16周末
- E. 18周末

63. 女性, 50岁, 频繁呕吐多日, 不能进食, 出现脱水、低血钾, 补液时家属心切, 私自将补液速度加快, 发生了高血钾, 此时治疗应选用

- A. 硫酸镁
- B. 氯化铵
- C. 碳酸氢钠
- D. 乳酸钠
- E. 葡萄糖酸钙

64. 男性, 51岁, 因严重疾病导致胃肠消化功能丧失, 但吸收能力尚好, 欲短期营养疗法, 应采用

- A. 液化饮食
- B. 要素饮食
- C. 浅静脉营养疗法
- D. 深静脉营养疗法
- E. 流食

65. 女性, 53岁, 休克已10h, 中心静脉压1.57kPa (16.02cmH₂O), 血压10.6/8.0kPa (80/60mmHg), 以此判断发生了

- A. 肾衰竭
- B. 肺衰竭
- C. 肝衰竭
- D. 脑衰竭
- E. 心力衰竭

66. 女性, 54岁, 手术前行蛛网膜下腔阻滞麻醉, 当麻醉穿刺注药后, 血压立即下降, 主要原因是

- A. 麻药注入过慢
- B. 麻醉平面过低
- C. 交感神经抑制
- D. 缺氧
- E. 穿刺部位出血

67. 男性, 55岁, 火灾事故中, 大面积烧伤后1d转来, 约占全身35%的面积为大小水泡, 血压偏低。此时患者的主要病理生理改变是

- A. 休克
- B. 心力衰竭
- C. 肾衰竭

- D. 肝衰竭
E. 感染
68. 男性, 56岁, 损伤性血胸入院4h, 患者呼吸困难, 血压低, 行闭式胸膜腔引流已3h, 每小时引出血液均在200ml以上, 目前胸膜腔内
- A. 继续出血
B. 血液已凝固
C. 血液已机化
D. 出血完全停止
E. 出血基本停止
69. 女性, 45岁, 5年来时常便血, 量少或滴出, 或附在粪便表面, 无痛, 经检查, 诊为内痔, 其扩大曲张的血管主要是
- A. 直肠上静脉丛
B. 直肠下静脉丛
C. 直肠上下静脉丛
D. 直肠上动脉
E. 直肠下动脉
70. 男性, 57岁, 门静脉高压症多年, 今日入院, 患者家属问及患者的主要病理改变, 护士解释的重点应是
- A. 肝大、脾大、腹水
B. 脾大、腹水、门腔静脉交通支扩张
C. 腹水、门腔静脉交通支扩张、黄疸
D. 门腔静脉交通支扩张、黄疸、肝大
E. 黄疸、肝大、脾大
71. 男性, 60岁, 突发左下肢动脉栓塞, 该栓子最可能来源于
- A. 大动脉
B. 大静脉
C. 心脏
D. 小动脉
E. 小静脉
72. 男性, 48岁, 误服敌敌畏约100ml, 出现呼吸困难, 面肌细颤的原因是
- A. 肾上腺素过多
B. 胆碱酯酶活性降低
C. 胰淀粉酶不足
D. 乙酰胆碱失活性
E. 去甲肾上腺素过多
73. 女性, 25岁, 天寒燃木炭取暖, 出现呕吐、昏迷, 经医生诊断为急性一氧化碳中毒, 其发病机制是
- A. 细胞中毒
B. 呼吸中枢受抑制
C. 血红蛋白不能携氧
D. 气道通气受阻
E. 大脑受抑制
74. 男, 65岁, 突发急性广泛心肌梗死, 咳大量粉红色泡沫痰, 其咳痰病因是
- A. 急性气胸
B. 急性肺气肿
C. 肺囊肿
D. 急性肺水肿
E. 肺不张
75. 男性, 24岁, 患胰岛素依赖型(1型)糖尿病已3年, 近日发生恶心呕吐、头痛、嗜睡、呼吸深快, 呼气有烂苹果味, 其原因是
- A. 酮症酸中毒
B. 呼吸衰竭
C. 短暂脑缺血
D. 低血糖
E. 脑血栓形成
76. 小儿, 3个月, 体重5kg, 每日所需8%糖牛乳的量为
- A. 450ml
B. 550ml
C. 650ml
D. 750ml
E. 850ml
77. 患儿, 8岁, 2周前患上呼吸道感染, 2d来颜面水肿, 尿少, 尿为浓茶色。诊断为急性肾小球肾炎。患儿感染的致病菌最可能是
- A. 乙型β溶血性链球菌
B. 甲型链球菌
C. 草绿色链球菌
D. 肺炎链球菌

E. 粪链球菌

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E 5个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(78~80 题共用题干)

男孩,8岁,被开水烫伤后4h送至医院急诊,患儿躯干前侧包括会阴部均为薄壁的大水疱,疼痛剧烈,双下肢红斑性改变。

78. 该患儿二度烫伤面积是

- A. 9%
- B. 14%
- C. 18%
- D. 25%
- E. 36%

79. 该患儿躯干前侧烫伤的深度达到

- A. 表皮
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层
- D. 皮下层
- E. 肌肉

80. 该患儿双下肢损伤的深度达到

- A. 表皮
- B. 真皮浅层
- C. 真皮深层
- D. 皮下层
- E. 肌肉

(81~83 题共用题干)

男性,38岁,晨起及半夜有上腹痛,进食后缓解已经2个月。既往2年每到秋冬季均有发作,经胃镜检查确诊为十二指肠溃疡。

81. 本病的主要因素是

- A. 促胃液素
- B. 胃酸
- C. 胃蛋白酶
- D. 胆汁反流
- E. 精神紧张

82. 本病的重要致病菌是

- A. 溶血链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 厌氧菌

83. 治疗本病采用三(四)联疗法,主要目的是

- A. 减少胃痉挛
- B. 保护溃疡面
- C. 减少胃酸分泌
- D. 消灭幽门螺杆菌
- E. 促进胃蠕动

(84~85 题共用题干)

女性,45岁,G₁P₁,因月经过多继发贫血2年,妇科检查:宫颈轻度糜烂,子宫如孕3个月大小,凹凸不平,双附件正常。

84. 最可能的诊断是

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 子宫肌瘤
- C. 妊娠
- D. 子宫颈癌
- E. 子宫内膜癌

85. 月经过多的原因是

- A. 营养不良
- B. 自主神经紊乱
- C. 子宫内膜面积增大
- D. 激素分泌紊乱
- E. 造血功能障碍

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E 5个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~88 题共用备选答案)

- A. 1~2个月
- B. 3~4个月
- C. 5~6个月

- D. 7~9个月
E. 10~12个月

86. 添加鱼肝油的月龄是
87. 添加蛋黄的月龄是
88. 添加肉末的月龄是

(89~90 题共用备选答案)

- A. 衔接
B. 下降
C. 俯屈
D. 内旋转
E. 复位

89. 能使枕额径变为枕下前囟径的动作是

90. 使胎头的矢状缝和中骨盆及出口前后径一致的动作是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 优锁
B. 0.02%呋喃西林溶液
C. 3%氯化钠溶液
D. 2%硝酸银溶液
E. 10%鱼石脂软膏

91. 炎症早期, 消炎退肿选用
92. 老年人肛管检查采取

93. 内痔切除术采取
94. 一般病人肛管简单检查采取

(95~98 题共用备选答案)

- A. 血糖 11.1 mmol/L
B. 尿蛋白 > 3.5g/d
C. 尿沉渣大量脓细胞
D. 尿沉渣大量蜡样管型
E. 全血细胞减少

95. 肾衰竭可致
96. 骨髓造血功能受损可致
97. 肾小球滤过膜通透性增加可致
98. 尿路上行感染可致

(99~100 题共用备选答案)

- A. 10%葡萄糖酸钙溶液
B. 氨茶碱
C. 10%氯化钾溶液
D. 50%葡萄糖溶液
E. 维生素 C

99. 禁忌静脉推注的药物是

100. 病人出现荨麻疹时可静脉推注的药物是

模拟试卷二

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 5 个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 长期饮酒致肝硬化的机制是
 - 引起门静脉扩张
 - 直接损伤肝细胞
 - 减少蛋白吸收
 - 收缩肝内血管
 - 阻碍胆汁流动
- 消化性溃疡与何种病原菌有关
 - 衣原体
 - 肺炎球菌
 - 病毒
 - 支原体
 - 幽门螺杆菌
- 消化性溃疡病人出现全腹压痛、反跳痛及板样强直，表明有
 - 食管静脉破裂
 - 癌变
 - 穿孔
 - 幽门梗阻
 - 出血
- 甲状腺功能亢进患者的大便次数多，是因为
 - 肠蠕动过快
 - 甲状腺素过少
 - 高热
 - 饮水过多
 - 进食过多
- 以下何病可致里急后重
 - 直肠癌
 - 肠结核
 - 食管炎
 - 甲状腺功能亢进
 - 急性胃炎
- 排出黑粪的疾病一般为
 - 痔
 - 直肠癌
 - 痢疾
 - 上消化道出血
 - 直肠炎
- 心绞痛与急性心肌梗死心前区痛的区别之一是
 - 前者痛更重
 - 含硝酸甘油有效
 - 前者更持久
 - 前者无诱因
 - 前者伴高血压
- 哪类肺癌多见于女性
 - 鳞状细胞癌
 - 腺癌
 - 小细胞未分化癌
 - 大细胞未分化癌
 - 支气管肺泡癌
- 二尖瓣狭窄病人易发生血管栓塞的原因是
 - 肺淤血
 - 下肢静脉淤血
 - 肺动脉淤血
 - 血管本身病变
 - 心房颤动易致栓子
- 主动脉瓣关闭不全可致
 - 水冲脉
 - 绀脉
 - 吸停脉
 - 缓脉
 - 交替脉

11. 急性肺水肿最突出的表现是
- 咯少量血
 - 咳大量脓痰
 - 咳大量白色泡沫痰
 - 咳大量粉红色泡沫痰
 - 咯大量血
12. 急性左侧心力衰竭病人端坐位的目的是
- 减轻体循环淤血
 - 减轻肺淤血
 - 减轻下肢水肿
 - 避免腹水发生
 - 避免血压升高
13. 慢性肺源性心脏病早期可出现
- 全心肥大
 - 左心室肥大
 - 右心室肥大
 - 左心房肥大
 - 心包积液
14. 肺炎球菌性肺炎在一段时间内痰呈
- 黑色
 - 黄色
 - 粉红色
 - 铁锈色
 - 绿色
15. 支气管扩张病人痰的特点是
- 黄果脓样
 - 大量脓痰久置分3层
 - 铁锈色
 - 绿色
 - 粉红色
16. 慢性阻塞性肺气肿主要引起
- 左侧心力衰竭
 - 心肌炎
 - I型呼吸衰竭
 - 心包炎
 - II型呼吸衰竭
17. II型呼吸衰竭时不可能出现
- 皮肤干燥
 - 头痛、头晕
 - 球结膜水肿
 - 精神神经症状
 - 呼吸深快
18. 支气管哮喘发作时呼吸形式是
- 潮式呼吸
 - 吸气性呼吸困难
 - 呼气性呼吸困难
 - 混合性呼吸困难
 - 间停呼吸
19. 某肺结核病人久治不愈, 近日头痛加重, 伴呕吐。查体有头向后仰、屈颈困难。是因为
- 肩关节炎
 - 颈肌痉挛
 - 颈椎病
 - 脑膜刺激征
 - 习惯
20. 某甲状腺功能亢进病人因自觉心悸, 请人协助同时二人分别计数心率及脉率。发现心率比脉率多, 这种情况称为
- 水冲脉
 - 奇脉
 - 绌脉
 - 速脉
 - 交替脉
21. 男性, 65岁, 自幼吸烟, 长期咳嗽。查体: 胸呈桶状。原因是
- 老年性肺气肿
 - 老年缺钙胸畸形
 - 长期咳嗽所致
 - 阻塞性肺气肿
 - 尼古丁中毒
22. 某肺炎病人除呼吸困难、咳嗽、咳痰外, 还可在患侧听到胸膜摩擦音。是因为
- 肺泡炎症
 - 呼吸动作太快
 - 胸膜受累发炎
 - 支气管发炎

- E. 胸腔积液
23. 某慢性肾衰竭病人预防下肢静脉血栓形成的主要措施是
- 多饮水
 - 被动运动肢体
 - 多输液
 - 绝对卧床休息
 - 多吃水果
24. 急性白血病人发热 38°C 是由于
- 感染
 - 吸收热
 - 红细胞破坏
 - 白细胞破坏
 - 血小板过少
25. 某老人行走时突然跌倒, 神志不清, 即送医院。经检查发现一侧上、下肢瘫痪, 口斜眼喎, 一侧瞳孔直径 5mm , 另一侧瞳孔直径 3mm , 其原因是
- 颅内压增高
 - 脑动脉血栓形成
 - 脑疝
 - 脑膜炎
 - 脑肿瘤
26. 某人患十二指肠溃疡, 除有空腹痛进食后缓解外, 突然发生呕吐, 所吐物为昨天吃的食物。引发原因是
- 食管炎
 - 急性胃炎
 - 胆石症
 - 幽门梗阻
 - 急性胰腺炎
27. 男性, 70 岁, 有非胰岛素依赖型 (2 型) 糖尿病, 但未认真治疗, 近 1 周来发现尿频、尿急、尿痛, 伴腰痛、低热。引发原因是
- 急性肾炎
 - 肾盂肾炎
 - 慢性肾炎
 - 肾结石
 - 肾结核
28. 高渗性脱水的病理特点是
- 体液以失钠为主
 - 体液以失水为主
 - 体液以失钾为主
 - 体液以失钙为主
 - 体液以失氯为主
29. 抗肿瘤药氟尿嘧啶属于
- 烷化剂类
 - 植物药类
 - 抗生素类
 - 抗代谢类
 - 激素类
30. 严重挤压伤引起肾衰竭, 其肾衰竭原因属于
- 肾前性
 - 肾后性
 - 肾性
 - 肾前性及肾性
 - 肾性及肾后性
31. 胃、十二指肠溃疡大出血最好发的部位是
- 胃大弯
 - 胃体
 - 胃窦
 - 胃小弯和十二指肠
 - 胃底
32. 良性肿瘤与恶性肿瘤的根本区别是
- 肿块硬度
 - 细胞分化程度
 - 生长速度
 - 表面光滑程度
 - 疼痛程度
33. 心肺脑复苏时, 应用 20% 甘露醇溶液的主要作用是
- 防治脑水肿
 - 防治肺水肿
 - 防止失钠
 - 防止心力衰竭
 - 防止肾衰竭

34. 蛛网膜下腔阻滞麻醉后去枕平卧的目的是防止
- 血压波动
 - 休克
 - 呕吐误吸
 - 头痛
 - 脑缺血
35. 颈部急性蜂窝织炎的最大危险是
- 吞咽困难
 - 继发颅内感染
 - 窒息
 - 败血症
 - 脓血症
36. 高钾血症病人应用钙剂的作用是
- 防止低钙
 - 对抗钾对心肌的抑制作用
 - 防止抽搐
 - 减低毛细血管通透性
 - 防止昏迷
37. 处理肉芽过度增生的药物是
- 2%硝酸银溶液
 - 3%氯化钠溶液
 - 5%氯化钠溶液
 - 0.1%依沙吖啶溶液
 - 3%过氧化氢溶液
38. 在我国, 门静脉高压症的主要原因是
- 门静脉血栓
 - 先天性门静脉狭窄
 - 血吸虫病
 - 胰腺肿瘤压迫
 - 肝炎后肝硬化
39. 脑震荡的病理解剖改变是
- 脑出血
 - 无明显的器质性改变
 - 脑组织明显水肿
 - 脑组织裂伤
 - 脑组织移位
40. 门静脉高压症病人, 门腔静脉交通支曲张, 这4个交通支不包括
- 食管下段与胃底交通支
 - 肛管与直肠下段交通支
 - 腹前壁交通支
 - 腹膜后交通支
 - 脾肾静脉交通支
41. 最易引起股骨头坏死的是
- 股骨干骨折
 - 股骨头下骨折
 - 股骨颈骨折
 - 股骨颈基底骨折
 - 股骨转子间骨折
42. 属于深二度烫伤特点的是
- 深达皮下
 - 水疱大, 壁薄
 - 水疱破后, 基底红润
 - 痛觉迟钝
 - 预后无瘢痕
43. 阑尾炎病人麦氏点压痛, 该点的体表投影在
- 右髂前上棘与脐连线的中外 1/3 交界处
 - 右髂前上棘与脐连线的中内 1/3 交界处
 - 右髂前上棘与脐连线的中点
 - 左髂前上棘与脐连线的中外 1/3 交界处
 - 左髂前上棘与脐连线的中内 1/3 交界处
44. 股疝易嵌顿, 主要是因为
- 病人年龄大
 - 病人肥胖
 - 股管解剖特点
 - 病人多为经产妇
 - 骨盆宽大
45. TAT 治疗破伤风的机制是
- 解痉
 - 镇静
 - 中和血中游离毒素
 - 抗破伤风杆菌
 - 抗化脓菌
46. 男性, 43岁, 胃、十二指肠溃疡病多年, 合并瘢痕性幽门梗阻, 其主要的病理生理

改变是

- A. 低钾低氯性酸中毒
- B. 高钾低氯性酸中毒
- C. 高钾低氯性碱中毒
- D. 低钾低氯性碱中毒
- E. 低钾高氯性碱中毒

47. 女性, 60岁, 乳癌患者, 其乳房皮肤出现酒窝征, 是因为

- A. 癌瘤与皮肤粘连
- B. 癌瘤与胸肌粘连
- C. 癌瘤侵犯 Cooper 韧带
- D. 癌瘤侵犯筋膜
- E. 癌瘤堵塞淋巴管

48. 女性, 5岁, 洗澡烫伤两下肢, 其烫伤面积是

- A. 63%
- B. 53%
- C. 48%
- D. 39%
- E. 33%

49. 女性, 37岁, 甲状腺功能亢进行甲状腺大部切除术, 术后3h突然窒息, 面部发绀, 颈部切口下肿胀, 其原因是

- A. 出血
- B. 黏痰堵塞咽喉部
- C. 分泌物堵塞气管
- D. 气管塌陷
- E. 喉返神经损伤

50. 女性, 45岁, 背部大片烫伤后感染, 创面脓液为绿色, 特殊的甜腥臭味, 感染的细菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 变形杆菌

51. 男性, 66岁, 局部麻醉下行体表肿瘤切除术, 注入麻药后5min, 出现中毒表现, 其中毒原因不可能是

- A. 用量过大
- B. 浓度过高
- C. 精神紧张
- D. 麻药直接入血
- E. 年老体弱

52. 男性, 30岁, 胸部损伤, 多根肋骨多处骨折, 出现反常呼吸, 是因为

- A. 疼痛
- B. 胸壁软化
- C. 肋间神经损伤
- D. 气胸
- E. 血胸

53. 男性, 43岁, 膀胱内的乳头状瘤, 就诊时医生告诉病人, 应尽早手术, 因为易发生

- A. 出血
- B. 结石
- C. 感染
- D. 尿潴留
- E. 恶变

54. 男性, 34岁, 蛛网膜下腔阻滞麻醉下行阑尾切除术, 术后发生尿潴留, 其主要原因是

- A. 手术部位疼痛
- B. 不习惯病室排尿
- C. 不习惯卧床排尿
- D. 精神紧张
- E. 麻醉反应

55. 女性青春期开始的重要标志是

- A. 音调变高
- B. 乳房丰满
- C. 月经初潮
- D. 阴毛出现
- E. 骨盆变宽

56. 使乳腺管增生的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 胎盘生乳素

- E. 绒毛膜促性腺激素
57. 受精卵着床后的子宫内膜称
- 增生期子宫内膜
 - 分泌期子宫内膜
 - 羊膜
 - 蜕膜
 - 绒毛膜
58. 孕妇血容量增加最高峰在
- 孕 20~22 周
 - 孕 23~25 周
 - 孕 26~28 周
 - 孕 29~31 周
 - 孕 32~34 周
59. 关于软产道的组成, 正确的描述是
- 由子宫体、子宫颈及阴道会阴构成的通道
 - 由子宫体、子宫底、子宫颈及阴道构成的通道
 - 由子宫下段、子宫颈、阴道及骨盆底软组织构成的通道
 - 由子宫体、子宫下段、子宫颈及阴道构成的通道
 - 由子宫颈、阴道及骨盆底软组织构成的通道
60. 胎盘早剥的概念, 正确的是
- 胎盘早剥多发生于妊娠 28 周后
 - 前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
 - 正常位置胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
 - 分娩期不易发生胎盘早剥
 - 胎盘早剥对孕妇无影响
61. 卵子从卵巢排出后, 正常受精部位在
- 输卵管峡部
 - 输卵管壶腹部
 - 输卵管伞部
 - 输卵管间质部
 - 子宫腔
62. 继发性闭经是指月经初潮后, 因某种病理性原因停经在
- 6 个月以上
 - 5 个月以上
 - 4 个月以上
 - 3 个月以上
 - 2 个月以上
63. 产妇, 26 岁, 孕期常规检查无异常, 第二产程破膜后突然呛咳, 烦躁, 呼吸困难, 随即昏迷, 血压 6.7/4 kPa(50/30mmHg), 休克。该产妇可能发生
- 子宫破裂
 - 胎盘早剥
 - 产时子痫
 - 羊水栓塞
 - 胎儿窘迫
64. 产妇, 25 岁, G₁P₁ 自然分娩后 1d, 感下腹阵痛, 可忍受。问正常宫缩痛持续的时间, 护士回答正确的是
- 产后 2~3d
 - 产后 6~7d
 - 产后 10~15d
 - 产后 20~25d
 - 产后 42d
65. 女性, 40 岁, 月经量增多, 月经周期缩短 2 年。妇科检查, 子宫增大约妊娠 3 个月大小, 质硬, 凹凸不平, 双附件(-), 最可能的诊断是
- 功能失调性子宫出血
 - 子宫内膜癌
 - 子宫颈癌
 - 子宫肌瘤
 - 围绝经期
66. 产妇, 27 岁, 正常阴道分娩, 护士给护生讲解正常的脐带结构是
- 一条动脉, 一条静脉
 - 一条动脉, 二条静脉
 - 二条动脉, 一条静脉
 - 静脉较粗壁厚
 - 动脉较细壁薄

67. 小儿生长发育的顺序规律为

- A. 由远到近
- B. 由下到上
- C. 由细到粗
- D. 由低级到高级
- E. 由复杂到简单

68. 肾病综合征水肿的主要原因是

- A. 低钠血症
- B. 低钾血症
- C. 氮质血症
- D. 高脂血症
- E. 低蛋白血症

69. 引起新生儿败血症最常见的病原菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 葡萄球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 脑膜炎双球菌
- E. 溶血性链球菌

70. 新生儿通过胎盘从母体获得的免疫球蛋白是

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgM
- D. IgE
- E. 分泌型 IgA

71. 小儿前囟晚闭最常见于

- A. 脱水
- B. 脑积水
- C. 佝偻病
- D. 小头畸形
- E. 先天性甲状腺功能减低症

72. 小儿原始反射中消失最晚的反射是

- A. 觅食反射
- B. 握持反射
- C. 拥抱反射
- D. 吸吮反射
- E. 颈肢反射

73. 急性肾小球肾炎患儿在急性期饮食中氯化钠每天

- A. 1~2g
- B. 3~4g
- C. 5~6g
- D. 7~8g
- E. 9~10g

74. 患儿, 8岁, 因低热盗汗前来就诊。为明确诊断需做 OT 试验, 一般使用 OT 稀释液的浓度是

- A. 1:100
- B. 1:200
- C. 1:500
- D. 1:1000
- E. 1:2000

75. 患儿, 5个月, 牛乳喂养, 家长来院咨询可添加的辅食是

- A. 菜水
- B. 碎肉
- C. 蛋黄
- D. 豆制品
- E. 带馅食品

76. 患儿, 8个月, 单纯羊乳喂养。为预防营养性巨幼红细胞性贫血的发生, 建议其饮食中应增加叶酸, 下列含叶酸较多的食物是

- A. 蛋类
- B. 瘦肉
- C. 海产品
- D. 干果类
- E. 新鲜绿叶蔬菜

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 5 个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(77~79 题共用题干)

女性, 27岁, 心悸气短8年, 反复咯血2年, 近2d又咯血不止就诊。查体: 双颊紫红, 唇发绀, 呼吸困难, 双肺底满布湿啰音, 脉搏强弱交替, 心率 120/min, 心尖区有舒张期杂音, 下肢无水肿, 肝、脾正常大小。