

南京中医药大学图书馆
丁祖望藏书

醫學說卷之二

中風

人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣卽爲中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑分或中臟或中血脈或中經善行數

變

外症

難名狀卒倒人地不知人痰塞喉間命欲喪東南地濕類中

風症候相同治須當。肺中風邪着四肢惡寒拘急脈浮遲中臟

唇緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脈口眼歪又有中經亦

要知六經無症弱調和口不能言肢不持古人曾作真風治三

家妙論亦須思

人名

東垣大率主氣虛河間腎虛兼火治丹溪主濕

內生瘍總

是類中分明註治之先用開闔法

皂

牙皂去皮細夏弦一兩

辛半

藜各三俱爲末再加麝香吹鼻中

有嚏則生無難活

醒後投之

三合湯。麥皮草夏南瓜當梗黃黃白。應相當。

星草歸桔芩連术竹瀝姜汁

一
共二

湯。左癱屬血右屬氣血虛加芍藥生地

四物恐泥痰瘀人黃川用姜汁炒

瘀血桃仁

與紅花。

瘀血症小便利大便黑或腹中塊痛人黃川

氣虛參芪也同劑盜汗遺尿亦如之

小便不利不可利。姜蚕全蝎閉塞加釣鱗善治牙關閉肥人息

吁少以引經。烏頭附子

右寸有力去參恐風神往痰涎于經絡風

氣實人參亦要忌。

川白活風神經絡風

白汗身體痛防風羌活并薄桂頭目不利或頭痛芎芷蔓荆

辛芥穗無汗身疼加芷羌活防蒼朮秦艽配心血虧欠神恍惚

川白活風神經絡風

茯神遠志菖蒲大或心動搖驚悸者酸棗竹茹辰砂益風痰燶

神麌曲積行大黃杞

盛須膽星防枳牙皂瓜蕷仁食傷

曲積行大黃杞

行。大便結用三化湯厚朴大黃枳

實卷活等分每服一兩微利之

示吉曰。東南類中風者多。故從火痰氣而治。是有神驗。若果係風邪外中。六經形症具著。原宜先服小續命湯。解表便秘者。三化湯。通滯之後。方用本湯調理。更爲切當。至于治口眼歪斜。方法固多。不如漏夾車地倉二穴。至左針右。至右針左。病可立愈。

傷風

頭痛發熱。鼻不通。惡風自汗。號傷風。脈來浮緩兼無力。參蘇飲。服自然鬆人參紫蘇及枳橈。桔梗乾葛。前胡同陳皮。茯苓甘半夏。木香少許水姜攻。已下加減咳嗽去參加桑杏。皮尖去皮。內有痰熟。瓜母打碎。內有痰熟。黃芩。進痰唾如膠。金沸草。胸滿痰多。薑貝。順冬月自汗。桂枝添。

若還無汗麻黃令傷食厚朴
神活麥芽中酒白蔻烏梅信頭疼羌
芎不可無氣喘杏蘇亦莫剗。
仁子

示吉曰人之易于傷風者其故有二。一因元氣虛之氣不衛
外。風乘虛入治宜參芪益氣而佐以散邪。一因素有鬱熱在
內。毛竅常閉邪風易入治宜芩連清火而佐以疏風此皆氣
虛鬱熱爲本風爲標也治本則標自愈。

中寒

中寒傷寒殊非一傷寒科傷則漸深中直入初起怖冷四肢寒。
在後無熱不渴身戰慄脈來無力父沉遲加味理中湯有益參术甘
草并乾姜加桂陳皮功妙極寒甚附子及吳萸。
鹽炒附子茯苓半

夏吐有力生姜煎就須冷服。其所以先無脹者，牛黃麻。
吃泄瀉不止加芪升姜汁三匙。嘔吐入舌捲囊縮指甲青脹絕
蒸臍不可忽。

蒸臍法。○用麝香半夏皂來末一匙，填寢臍中。後用生姜片
貼于臍上。放大艾火干姜片炙二七壯。炙閏元氣海各二十
壯。熱通于中逼寒出外。手足溫煖則生。姜一用硫黃麝香末
填臍中。放葱餅于臍上。以炭斗盛火于葱餅上熨之。如餅爛
再換一枚。葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四
五餅應用。

暑病

暑天病熱名暑症。腹痛吐瀉。冒暑病頭痛。身熱燥不寧。身如針

刺傷暑應。寒熱自汗出不止。咳嗽倦急爲中暑。脈虛身熱動而得之病屬陽。加味香薷湯可止。

爲暑痛。筋皮厚扁。

芩草皮厚扁。甘陳朴豆木瓜次

第尋黃連燈心姜棗服氣虛參采共小靈寒熟柴六

胡黃丹花

爲要藥。嘔

加霍半法爲精瀉合澤猪真妙訣。去麥芽味。渴用知分藥如神。綿綿

腹痛傷冰冷乾姜滑石法從心。去連小水不利或短赤澤。瀉山。

麥味助只

枝并滑石搘。加羌活風胸滿實極消食積。自汗不止用參

芪水瀉。白木瀉通澤有益。頭痛川芎并石羔瘦悶瓜萎及枳實。已上

法若居涼館喜風涼頭疼惡寒頭項強身形拘急熱無汗。靜而

得之陰寒傷。此因暑致病。宜服羌活并蒼朮厚朴乾葛及藿香紫蘇。

等分薑三片水煎熱服號升陽湯兼食神曲滑石炒內傷冰冷
用炮姜。

示吉曰。夏至一陰生。人內寒而外熱。若過食冰冷。及連靈益元寒涼之劑。遂至寒積于中。而成內傷寒症。凡吐瀉而腹痛無休歇。脈來遲緩者是也。治宜理中湯合平胃散溫之寒甚加附子。如誤投香薷飲則危矣。

注夏

濕熱蒸人。夏曰畏氣。虛體弱熱。因傷胸中氣促。四肢倦心煩食少。不如常。好卧口乾。或泄瀉。治用清暑益氣湯。黃芪升麻與葛根各一。參木陳皮。澤瀉。柏子仁。炒麥冬。青皮及當歸。乾葛三分。各三

味七粒。甘草水煎引姜棗益汗還加浮小麥便赤滑石并山枝
渴甚。天花烏梅食去核。去蒼頭痛川芎石羔好嗽加羔杏升蒼出木
香砂仁胸不寬瀉加肉蔻茯苓去皮白附子去麥門冬。

濕

東南之地恒多濕。居民感受病非一。或行涉水兩露蒸。或遇飲
冷因而得。小便短赤。身體重。骨肉酸麻。行不疾。漸加浮腫及身
黃。熱土滲溫湯可識。疾苓香附半陳皮原朴澤猪蒼白术引用
夏。湯。

活半

砂仁并姜棗。臨服牛匙鹽可入外溫寒。熟身腫痛。羌防木通加
有益。內溫胸滿兼嘔吐。喘脹腹膨用枳。是黃連山楂炒卜子。溺
門不通車前力。溫熱發黃使茵陳山楂車前兼滑石。

示吉曰。治溫大法。在表在上者。開鬼門。用麻黃。防風。革微汗。
是也在裏在下者。潔淨府。用五苓。輩利小便是也。丹溪云。溫
得燥則詶。然而收用蒼水是也。溫從風散。用羌獨活類是也。
溫久則生熱。用黃連山枝是也。從此而發通之亮能活人。但
麻黃止可用二三分。蓋汗多恐生變症耳。

火

相火。命門君火心二火一水不相均。惟腎屬水。經所謂五臟氣
升皆是火。氣有餘便是火妄動須知燥至陰。經所謂一水不勝五火也古人調治非
一法。一一從頭說與君。心火亢極。陽強病。人壯氣實。鹹冷進癲
狂便閉。用硝黃。大承氣湯。朴硝大黃根實厚朴水煎服大便如常。芩連應。黃連解

芩黃連黃柏山枝烏梅水煎服治大實火可瀉從上方隨經調
熱錯語呻吟不眠煩燥脈數乾嘔

治須中央飲食勞倦身發熱元氣不足內傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝

補中益氣湯人參黃芪當歸白朮陳皮甘草升麻柴胡生姜大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火甘寒降知柏四物法

通靈

四物湯當歸生地芍藥川芎加黃柏知母二味鹽酒炒

腎水受傷陰虛病面白紅耳熱

熾火盛左尺洪數無根火柏龜六味治如神

六味地黃丸地黃山藥茱萸肉桂苓

丹皮澤瀉蜜丸淡鹽湯送下加黃柏龟板空心服已上補虛火法

胃虛過食生冷傷抑遏陽氣

脾中央火鬱之症升散之升陽散火最爲良

升陽散火湯治五心煩熱胃脫時疼

四肢之力肌熱筋痺或骨髓中熱用升麻葛根羌獨活白芍人

參各五分炙甘草生甘草柴胡各三分防風二分半水煎服忌

寒涼物去獨活及生

命門火衰陽脫病面赤煩躁虛火盛足冷

脈沉陰極燥回陽救急醫中理。回陽救急見復寒科。陰虛發熱火旺甚。

脈數無力屬心腎內傷發熱乃陽虛脈大無力脾肺分氣從左起肝之火陰火還從脇下生脚下熱來侵腹者斯人虛極莫難平。熱從腳起先用附子末津調貼腳心中平。湯泉穴引火下行後加四物降火之劑。

示吉按積熱論曰治火之法始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則枝窮矣是徒知清熱以寒而不知熱之不衰由平真水之不足也當壯水之主以制陽光經曰寒之而熱者取之陰陰腎水也求其屬也此獨爲積熱者說愚意治火除人壯氣實者便秘者火微者從正治外俱當遵此爲則蓋火非水不降未有腎水足而心火熾者也益坎

勝離湯實爲火症之總司湯見勞瘵。

內傷

飲食勞倦是內傷。或因餓飽過行房。風寒傷人名外感。辨明調治。病無妨。入迎繁盛手背熱。寒熱邪作無間歇。惡寒無汗。鼻不通。此是外感。君須別。內傷之症。氣口洪。手心有熱。微惡風。寒熱間作。不知味。更兼氣弱。語言慵。內傷惡寒得緩解。外感近火寒。仍攻外感。內傷相挾者。脈症並見。須辨通。內傷不足急補之外。感有餘瀉不同。或先補養。或先散。先後之間無苟從。治內補中益氣用芪參歸朮升柴甘與陳引加姜棗水煎服氣和微汗最

黃人半白麻胡草一皮花
爲精救腎水虧酒炒柏入心養血紅三分升麻柴胡自汗去夜

間不睡加棗仁

炒爲末亦可
細升柴

川芎蔓荆頭疼用口乾乾葛葉爲

末

甚者再加遠志

食加廻芽

巔頂痛時辛菜本性冲驚降

神甚者再加遠志
內柏子仁葛蒲

棗莢神內柏子仁葛蒲

食加廻芽

細升柴

查枳椇

瀉添惺瀉

苟菝葜芩黃連枳椇除胸悶

有痰前半枝爲君
胡夏葛

防已木瓜除脚弱

龍骨牡蠣

未爲風活白川

治遺精防羌芷苦身熱川

兼寒頭疼

虛火知母柏玄參

黃火炎上未爲風活白川

黃芩黃連清內熱菊花熟地

上火炎上未爲風活白川

醫眼疼。

傷食

後天之本屬脾胃納化飲食滋榮衛。胃主經飲食不下爲胃病。脾主化飲食不消爲脾病。養生妙法節飲食脾胃受傷飲食倍。胸腹飽悶并作酸嘔氣惡食腹痛累或吐瀉時下洟屁種種皆因傷食例甚則發熱與頭

疼。惟身不痛傷寒。

有傷食類傷寒
條在傷寒科

脈左關平和右門緊。香砂平

胃功有濟蒼术陳皮厚朴。

草平胃散
甘此四味

查附砂仁香理氣川芎

枳。檀并藿香水姜煎服食須忌。

消肉查

炮皮
山草子
杏仁
加索粉傷時加杏。

藥曲飯食神麴及麥芽生冷瓜

萸青逐
糯米

加索粉傷時加杏。

仁西瓜多吃安鹽促魚傷椒

梔紫蘇
稻草

將來消牛肉。麝香

能消蔬果核葛梅白蔻酒傷入

枳壳桔梗除胸滿
茶

挾氣鳥兵寒

姜益傷飲須合四苓湯。

飲茶湯涼水之類四苓
茯苓澤瀉猪苓白术

嘔吐臨服加姜

汁白术茯苓治脾虛泄瀉車前蔻白术。

已上消
導之法

上部有脈下無

脈其人當吐不吐卒蓄物探吐是良方。

否則瓜蒂散有力
赤小

蓋爲未溫水調食積鬱久成濕熱芩連大黃不可缺再入白术

下二小肚之

黃芩
大黃

食積鬱久成濕熱芩連大黃不可缺再入白术

并澤瀉去蘿砂。在蒼朮訣。胃中停滯。生冷物心腹急痛。人暴卒。
大黃乾薑巴豆肉等分爲末。名備急密丸。大服三丸。或吐或
瀉。痛自息。已上下

食積法

按丹溪曰。明知身受寒氣。口吃寒物。初得之宜溫。散溫稍稍
久。則成鬱。久則成熱。熱久則生火。若仍用溫藥。寧不助火
添病乎。宜用辛涼以發表。辛寒以理中。和易伏面。病易退也。
至東垣則有輕則損其穀。重則逐其滯之論。蓋小壯新病。宜
推逐急去爲美。如老人久病。又宜導化漸去爲佳也。二公之
旨。真清導法中口訣。故特拈出。

調理脾胃

至哉坤元。調脾胃萬物資生無病累胃陽納受是所可。脾陰消化精神遂飲食自倍脾胃傷潔古枳术丸爲最。白术八兩將王炒四兩枳檳炮皮爲末子。荷葉包米煨飯丸一補一瀉方真好。

附七

半夏陳皮消痰用理氣香砂不可少。元氣素弱脾不磨食多腹內卽不和。加入木香砂陳皮白芍人參亦用多。素有痰火鬱胸膈酸嘔氣并酒積炒枝連山黃白川芍陳皮砂仁木香茯苓大胃強脾弱人好食食後反飽難消尅。黃連山枝甚石羔人參白芍甘草及。

按王節齋曰。凡治諸病若見胸膈飽悶或噫氣嚥酸腹痛泄瀉惡食少食等症便問曾何飲食審明傷積卽先調理脾胃。