

# 内科护理学（中级）资格考试



人民军医出版社

# 内科护理学（中级）资格考试 模拟试卷一



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

## 专业知识

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 呼吸系统最常见的症状是

- A. 咳嗽
- B. 咽喉肿痛
- C. 高热
- D. 心动过速
- E. 胸痛

2. 慢性阻塞性肺气肿双肺叩诊呈

- A. 鼓音
- B. 实音
- C. 浊音
- D. 过清音
- E. 清音

3. 肺性脑病患者出现昏迷，一侧瞳孔扩大，急救措施首先用

- A. 20%甘露醇静脉推注
- B. 5%NaHCO<sub>3</sub> 静脉滴注
- C. 加大吸氧量
- D. 气管插管
- E. 氢氯噻嗪

4. 中毒性肺炎的显著表现是

- A. 高热
- B. 出现明显呼吸系统衰竭症状
- C. 出现神经系统症状
- D. 出现休克
- E. 白细胞计数显著增多

5. 肺炎球菌肺炎在炎症消散后

- A. 肺部遗留纤维化
- B. 肺泡功能受损
- C. 肺组织完全恢复正常

D. 胸膜粘连、增厚

E. 以上都不是

6. 肺脓肿患者最关键的治疗措施是

- A. 抗菌和痰液引流
- B. 抗感染
- C. 手术切除病灶
- D. 处理原发灶
- E. 对症治疗

7. 肺脓肿最显著的临床症状是

- A. 咳嗽咯血
- B. 高热
- C. 咳大量脓臭痰
- D. 胸痛
- E. 消瘦

8. 呼吸衰竭病人最早、最突出的表现是

- A. 视物模糊
- B. 呼吸困难
- C. 皮肤湿冷
- D. 血压升高
- E. 肝肾功能损害

9. 对急性呼吸性酸中毒患者的治疗主要是

- A. 静脉输注碳酸氢钠
- B. 增加通气量
- C. 积极补充钾盐
- D. 碱化尿液
- E. 利尿增加酸从肾排出

10. 治疗肺炎支原体肺炎首选的抗生素为

- A. 头孢菌素
- B. 红霉素
- C. 链霉素
- D. 米康唑
- E. 甲硝唑

11. 二度房室传导阻滞伴反复发作阿-斯综合征的首选治疗是

- A. 高流量吸氧
- B. 异丙肾上腺素
- C. 安装人工心脏起搏器
- D. 静脉推注阿托品
- E. 维拉帕米

12. 病态窦房结综合征伴有窦性停搏病人最佳治疗方法是

- A. 长期口服阿托品
- B. 同步电复律
- C. 静脉滴注异丙肾上腺素
- D. 安装永久心脏起搏器
- E. 心脏移植

13. 急性心肌梗死胸部疼痛宜用下列哪种药物镇痛

- A. 吗啡
- B. 芬太尼
- C. 异山梨酯
- D. 硝酸甘油
- E. 去痛片

14. 心绞痛发作时疼痛常见部位是

- A. 心前区
- B. 胸骨体上段或中段之后
- C. 胸骨体下段之后
- D. 剑突下
- E. 肩胛部

15. 急性下壁心肌梗死最常见的心律失常为

- A. 室早
- B. 室颤
- C. 房早
- D. 房室传导阻滞
- E. 房颤

16. 下列临床现象中可以排除心肌梗死的是

- A. 心前区剧烈持续性疼痛
- B. 血压下降 85/50mmHg

C. 心律失常，出现房室传导阻滞

D. 含服硝酸甘油疼痛缓解

E. 恶心、呕吐、上腹部胀痛

17. 急性心肌梗死与心绞痛的疼痛主要区别是

- A. 心肌梗死疼痛程度重，持续 30 分钟以上
- B. 疼痛缓解的方法不同
- C. 疼痛的性质不同
- D. 疼痛的部位不同
- E. 疼痛的诱因不同

18. 急性心肌梗死后冠脉再通（再灌注）的最佳时间为起病后

- A. 30 分钟内
- B. 6 小时内
- C. 2 小时内
- D. 4 小时内
- E. 12 小时内

19. 下列哪些病人适宜安装人工心脏起搏器

- A. 心室颤动
- B. 阿-斯综合征
- C. 室性期前收缩
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

20. 下面哪种情况最适宜选用同步电复律的治疗

- A. 心室颤动
- B. 心房纤颤
- C. 室性心动过速
- D. 房室传导阻滞
- E. 病态窦房结综合征

21. 预防慢性胃炎的原则不包括

- A. 养成良好饮食习惯
- B. 忌食生、冷食物
- C. 戒烟、戒酒
- D. 长期服用抑制胃酸分泌的药物
- E. 饮食清淡，避免刺激性食物

22. 雷尼替丁属于

- A. 抗胆碱能药物  
B.  $H_2$ 受体拮抗药  
C. 胃泌素受体拮抗药  
D.  $H_1$ 受体拮抗药  
E.  $H^+-K^+-ATP$ 酶泵抑制药
23. 关于消化性溃疡疼痛特点错误的是  
A. 常与饮食有关  
B. 胃溃疡疼痛常在进食后 0.5~1 小时出现  
C. 十二指肠溃疡疼痛位于上腹部偏右  
D. 十二指肠溃疡疼痛常在进食后 0.5~1 小时出现  
E. 疼痛时服抗酸药常能缓解
24. 肝硬化患者肝功能失代偿的特征性症状是  
A. 上消化道出血  
B. 肝功能异常  
C. 意识改变  
D. 脾大  
E. 蜘蛛痣
25. 下列哪项不属于肝硬化患者内分泌紊乱症状  
A. 雌激素灭活减少, 相对增多  
B. 男性乳房发育、睾丸萎缩  
C. 肾上腺皮质激素增多  
D. 醛固酮增多  
E. 抗利尿激素增多
26. 肝癌引起的肝区疼痛特点是  
A. 持续性钝痛或胀痛  
B. 持续性隐痛  
C. 肝区压痛  
D. 空腹时烧灼痛  
E. 持续性绞痛
27. 原发性肝癌最常见的体征为  
A. 肝大  
B. 黄疸  
C. 消瘦  
D. 蜘蛛痣  
E. 肝区疼痛
28. 下列措施不适用于肝性脑病患者的是  
A. 肥皂水灌肠  
B. 静脉滴注糖盐水  
C. 半流质饮食  
D. 给予谷氨酸钾或谷氨酸钠  
E. 鼻饲 50%硫酸镁
29. 急性胰腺炎最基本的治疗方法是哪一项  
A. 肠内营养  
B. 使用抗生素  
C. 抑制胃酸分泌  
D. 禁食及胃肠减压  
E. 使用施他宁
30. 对消化性溃疡出血的患者不适用的是  
A. 禁食  
B. 双气囊三腔管压迫  
C. 冰盐水洗胃  
D. 西咪替丁静脉注射  
E. 置胃管
31. 溃疡性结肠炎腹痛的特点是  
A. 疼痛部位固定, 为压痛  
B. 进食后疼痛加重  
C. 痉挛性腹痛, 肠鸣音亢进, 排便后缓解  
D. 疼痛有便意, 便后缓解  
E. 腹部绞痛
32. 抗甲状腺药物丙硫氧嘧啶、甲巯咪唑等最常见的副作用是  
A. 发热  
B. 精神异常  
C. 肾脏受损  
D. 粒细胞减少  
E. 易产生药物性皮炎
33. 初次使用胰岛素治疗时宜选用  
A. 速效胰岛素制剂从小剂量开始  
B. 中效胰岛素制剂从小剂量开始  
C. 速效胰岛素制剂从大剂量开始

- D. 速效胰岛素与长效胰岛素制剂联合应用
- E. 长效胰岛素制剂从小剂量开始

34. 不属于肥胖 2 型糖尿病患者的饮食治疗原则的是

- A. 限制每日热量摄入量
- B. 主食增加粗粮的摄入
- C. 三餐热量分配为 1/5、2/5、2/5
- D. 少食粗纤维食物
- E. 每日脂肪宜限量

35. 下列哪种毒物中毒后宜用牛奶洗胃

- A. 安定片
- B. 乐果
- C. 浓硫酸
- D. 汽油
- E. 氰化钾

36. 金属物质中毒宜采用下列哪种物质解毒

- A. 亚甲蓝
- B. 维生素 C
- C. 二巯丙醇
- D. 纳洛酮
- E. 牛奶

37. 误服大量农药敌敌畏后，最早出现的症状是

- A. 烟碱样症状
- B. 毒蕈碱样症状
- C. 意识模糊
- D. 迟发性神经症
- E. 血压下降

38. 有机磷农药急性中毒时瞳孔

- A. 先缩小后扩大
- B. 明显缩小
- C. 扩大
- D. 两侧瞳孔大小不等
- E. 无变化

39. 迟发型神经病多见于有机磷中毒治疗后，中毒症状消失后

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 24~96 小时
- D. 2~3 周
- E. 3 个月后

40. 有机磷农药中毒患者烟碱样症状表现为

- A. 多汗
- B. 支气管痉挛及分泌物增加
- C. 昏迷
- D. 流泪
- E. 肌纤维颤动

41. CO 中毒的最有效措施是

- A. 高流量吸氧
- B. 血液置换
- C. 静脉阿托品
- D. 静脉普鲁卡因
- E. 高压氧舱

42. 由于烈日暴晒或强烈辐射作用头部，大量紫外线进入颅内，出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐等症状，称

- A. 中暑
- B. 日射病
- C. 辐射病
- D. 热辐射
- E. 先兆中暑

43. 单侧面部和肢体瘫痪为

- A. 单瘫
- B. 偏瘫
- C. 局部性瘫痪
- D. 交叉性瘫痪
- E. 软瘫

44. 某青年 5 年内常于同一肺段反复发生肺炎伴咯血，最可能是

- A. 肺结核
- B. 肺癌（早期）
- C. 支气管扩张

D. 气管炎

E. 慢性支气管炎

45. 一青年男性肺脓肿患者住院治疗 4 个月余仍有咯血, 反复发作, 最佳治疗方法是

A. 体位引流

B. 痰培养选用敏感抗生素

C. 肺泡内灌洗

D. 气管滴入药物

E. 肺叶切除

46. 男性, 27 岁。外伤休克纠正后 1 天出现进行性呼吸困难, 发绀, 血氧进行性下降, 血气分析为:  $\text{PaO}_2 40\text{mmHg}$ 。诊断为 ARDS, 此时呼吸机辅助呼吸最好的通气方式是

A. 容量控制通气

B. 压力支持通气

C. SIMV (同步刺激辅助通气)

D. 控制呼吸及呼吸末正压 (PEEP)

E. 吸气时正压, 呼气时负压通气模式

47. 女, 25 岁。发热 7 天, 心悸 2 天。EKG 示: 室性心动过速, 心室律 160 次/分。静推利多卡因无效, 测血压 80/42mmHg, 应紧急给予以下哪种处理

A. 非同步电复律

B. 同步电复律

C. 继续静脉注射利多卡因

D. 静脉注射阿托品

E. 心前区按压

48. 男, 31 岁。劳累后气促半年, 阵发性夜间呼吸困难 1 个月入院。查体: 脉压增大, 心尖冲动弥散, 心界向左下移位, 周围血管征阳性。应诊断为

A. 高血压性心脏病

B. 风湿性心脏病伴二尖瓣狭窄

C. 风湿性心脏病主动脉瓣关闭不全

D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病

E. 肺心病

49. 女, 43 岁。反复上腹部疼痛不适 1 年余, 均经进食或口服抗酸药缓解, 近 1 个月疼痛加重且不规律, 经口服抗酸药效果差, 并呈进行性加重, 恶心、呕吐, 呕吐物为宿食, 伴贫血、消瘦, 该患者可能是

A. 胃溃疡出血

B. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻

C. 胃癌所致幽门梗阻

D. 十二指肠球部以下的梗阻性病变

E. 胃底贲门癌所致的梗阻

50. 肝性脑病昏迷前期最突出的表现是

A. 多语

B. 行为异常

C. 意识错乱、睡眠障碍

D. 昏睡、精神错乱

E. 意识丧失

51. 女, 30 岁。患 1 型糖尿病 10 年。5 年前开始使用胰岛素治疗。近 2 周擅自停用胰岛素, 改服中药。3 天前患者腹股沟处长一疖肿, 经用抗生素治疗未见好转, 并出现恶心、呕吐、头痛、呼吸深快、脉细速, 急送医院。检查: 血糖 24mmol/L, 血酮体升高, 尿酮体强阳性, 白细胞增高。该患者被诊断

A. 脓毒血症

B. 酮症酸中毒

C. 高渗性非酮症性昏迷

D. 脑水肿

E. 感染性休克

52. 误服汽油而导致的急性中毒宜先口服下列何种溶液后再洗胃

A. 牛奶

B. 果汁

C. 液状石蜡

D. 高锰酸钾

E. 亚甲蓝

53. 女, 25 岁。因口服敌敌畏而急诊入院, 经急救治疗症状缓解后, 再度陷入昏迷最可

能的原因是

- A. 阿托品用量过大
- B. 洗胃不彻底
- C. 解磷定用量不足
- D. 迟发性神经病
- E. 中间综合征

54. 一女性，在冬季室内用煤火炉取暖，被家人发现时已昏迷，呼之不应，同时伴有大小便失禁，查体面呈樱桃色，脉搏和呼吸增快，伴有阵发性惊厥。宜迅速采取的措施是

- A. 开窗换气
- B. 迅速将病人搬至空气流通处
- C. 人工呼吸
- D. 继续用煤取暖以提高室内温度
- E. 取半卧位，有利于膈肌活动

55. 一男性高血压病人，突然意识丧失且很快进入深昏迷，喷射样吐出咖啡样胃内容物，检查有一侧上、下肢瘫痪，此病人可能发生了

- A. 高血压危象
- B. 脑出血
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 癫痫持续状态
- E. 脑栓塞

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（56～57 题共用题干）

女性，65 岁。因 CO 中度已昏迷 1 小时。面色苍白、呼吸减慢，心率 100 次/分。急诊送医院。

56. 对此患者治疗的最有效措施为

- A. 高浓度吸氧
- B. 清除尚未吸收的毒物

- C. 立刻吸入 3 个大气压纯氧
- D. 透析治疗
- E. 血液置换

57. 用 20%甘露醇静脉滴注的目的为

- A. 减轻心肺负担
- B. 增加氧供
- C. 促进脑细胞功能恢复
- D. 防治并发症及迟发性脑病
- E. 防治脑水肿

（58～59 题共用题干）

女，18 岁。大学生。在烈日下进行步行训练 2 小时后，出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安，体温 37.5℃。

58. 该患者诊断为

- A. 中暑
- B. 日射病
- C. 低血糖
- D. 热衰竭
- E. 中暑衰竭

59. 此时宜采取的护理措施是

- A. 口服大量葡萄糖盐水
- B. 就地休息
- C. 口服大量清凉饮料
- D. 头部用冰袋或冷水湿敷
- E. 快速滴入甘露醇

（60～63 题共用题干）

男，73 岁。心绞痛发作持续 3 小时，伴恶心、呕吐、出冷汗，含服硝酸甘油无效。心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段呈弓背样抬高 6mm，V<sub>1</sub>～V<sub>3</sub> 导联 ST 段压低 4mm，偶发室性期前收缩 1 次，诊断为急性心肌梗死。

60. 在配合医师进行治疗时，病人突然意识丧失，血压 70/34mmHg，心电图示：室性心动过速，应采取的急救措施是

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律

- C. 静脉推注肾上腺素
- D. 心前区按压
- E. 气管插管

61. 此后患者渐平稳,第2天晨又出现频发室性期前收缩,此时治疗上首选

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 心前区按压
- D. 静脉推注利多卡因
- E. 静脉推注阿托品

62. 此时最有效的治疗措施是

- A. 溶栓治疗
- B. 吸氧
- C. 绝对卧床休息
- D. 静脉滴注利多卡因
- E. 静脉滴注极化溶液

63. 2小时后随访心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联出现病理性Q波,其心肌梗死部位可能在

- A. 后壁
- B. 左前壁
- C. 下壁
- D. 右侧壁
- E. 前间壁

(64~66题共用题干)

男,41岁。因胃溃疡行胃部分切除术后半年,自觉饭后出现上腹饱胀不适,腹胀等消化不良现象,伴呕血1次,量少。体检上腹轻压痛,经诊断为“急性胃炎”。

64. 以下护理措施不当的是

- A. 少食多餐
- B. 感轻度不适时应禁食,以免加重胃的负担
- C. 注意休息,避免劳累
- D. 加强心理疏导,消除恐惧
- E. 进温热半流质饮食

65. 此病的主要病因是

- A. 用药不当

- B. 饮食不当
- C. 幽门螺杆菌
- D. 胆汁反流
- E. 自身免疫反应

66. 下列哪项不符合急性胃炎引起上消化道出血的诊断

- A. 呕吐咖啡色液
- B. 柏油样便
- C. 出血呈间歇性
- D. 呕吐物中偶见血块
- E. 鲜血便

(67~69题共用题干)

女,50岁。因在家燃烧煤气取暖突然昏倒。患者面色潮红,口唇呈樱桃红,脉快,多汗,神志不清伴发热

67. 患者最可能是

- A. 一氧化碳中毒
- B. 心律失常
- C. 休克
- D. 脑卒中
- E. 汞中毒

68. 此时病人中毒的程度为

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 重度伴发迟发性脑病
- E. 中毒前期

69. 下列哪项检查最有利于确诊

- A. 脑部CT
- B. 脑部磁共振
- C. 血液碳氧血红蛋白测定
- D. 全血胆碱酯酶活力测定
- E. 脑电图检查

(70~74题共用题干)

女性,55岁。处于慢性肺心病心功能失代偿期,经一段时间治疗后,仍有中度水肿,

血钾为 2.5mmol/L。

70. 下列哪项不能判断该病人氧疗有效

- A. 呼吸平稳
- B. 手指脉氧升高
- C. 发绀减轻
- D. 皮肤转暖
- E. 呼吸过缓或间停呼吸

71. 对该病人实施的护理措施错误的是

- A. 鼓励患者及时咳出痰液，痰稠不易咳出的，可先湿化痰液
- B. 对神志不清者可进行机械通气
- C. 给予高流量、高浓度持续吸氧，以纠正缺氧及二氧化碳潴留
- D. 在保持呼吸道通畅的前提下可使用呼吸兴奋药
- E. 正确记录 24 小时出入量及观察体重变化

72. 该病人可选择以下哪种药物利尿

- A. 氢氯噻嗪
- B. 乙酰唑胺
- C. 氨苯蝶啶
- D. 呋塞米（速尿）
- E. 利尿酸钠

73. 下列哪项表现可反映该病人出现二氧化碳潴留

- A. 血压升高
- B. 颈静脉怒张
- C. 意识模糊
- D. 球结膜充血水肿
- E. 反应迟钝

74. 该病人治疗的关键是

- A. 改善通气
- B. 纠正缺氧及二氧化碳潴留
- C. 控制感染
- D. 强心
- E. 补钾

（75～77 题共用题干）

某青年女性，患支气管扩张多年，常反复咯血。本次因大咯血而急诊住院，经救治后咯血不止。

75. 下列护理措施可加重病情的是

- A. 给予温或凉的流质饮食
- B. 适当活动，以利恢复
- C. 保持大便通畅
- D. 避免情绪激动
- E. 卧床休息

76. 24 小时内咯血量超过多少称为大量咯血

- A. 1 000ml
- B. 800ml
- C. 600ml
- D. 400ml
- E. 500ml

77. 下列哪项护理措施有利于减少支气管扩张患者呼吸道感染的发生

- A. 卧床休息
- B. 适当活动
- C. 保持口腔清洁
- D. 病室空气流通
- E. 加强病室消毒

（78～80 题共用题干）

男，68 岁。有吸烟史 30 余年，出现慢性咳嗽、咳痰已 20 多年，近 5 年来明显加剧，已常年不断，伴有喘息和呼吸困难，且以冬春季更甚。3 天前患者因受凉感冒而致发热，剧烈咳嗽，咳多量黄脓痰，气急、发绀，今晨起出现神志模糊，躁动不安，送医院急诊。急测血气结果为动脉血氧分压 52mmHg（6.9kPa），CO<sub>2</sub> 分压 60mmHg（8kPa）。

78. 患者目前确切的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢支肺气肿合并呼吸衰竭
- C. 慢性气管炎
- D. 呼吸衰竭

E. 支气管哮喘

79. 患者宜采用的吸氧方式为

- A. 持续低流量吸氧
- B. 间断低流量吸氧
- C. 面罩吸氧
- D. 间断高流量吸氧
- E. 持续中流量吸氧

80. 患者应采用的卧位为

- A. 平卧位
- B. 端坐位
- C. 胸卧位
- D. 半坐卧位
- E. 腿部抬高

(81~85 题共用题干)

女, 45 岁。近半个月来感疲乏无力、失眠头痛, 不伴恶心、呕吐。查体: 多血质面容, 满月脸, 水牛背, 四肢瘦小, 皮肤菲薄, 腹部及股部多发宽大皮肤紫纹。体温 36.5℃, 脉搏 80 次/分, 血压 165/95mmHg, 钾 3.8mmol/L, 病人既往无高血压病史, 家族无高血压患者。

81. 导致该患者满月脸、水牛背、四肢瘦小的原因是

- A. 机体摄入热量过多
- B. 机体锻炼不足
- C. 水钠潴留
- D. 脂肪代谢异常
- E. 皮质醇激素分泌减少所致

82. 该病人饮食原则是

- A. 高蛋白、高维生素、低糖、低脂、低盐、富含钾的饮食
- B. 高蛋白、高维生素、高糖、低脂、低盐、富含钾的饮食
- C. 高蛋白、高维生素、高糖、低脂、低盐饮食、高钾饮食
- D. 低蛋白、高维生素、高糖、低脂、高盐、

富含钾的饮食

E. 高蛋白、高维生素、低糖、高脂肪、低盐饮食

83. 以下哪种食物最利于补钾

- A. 腌菜
- B. 牛奶
- C. 葱头
- D. 芝麻酱
- E. 糖水

84. 病人皮肤菲薄的原因主要是

- A. 糖异生增强, 致皮肤营养障碍
- B. 脂肪的合成减少
- C. 蛋白质分解消耗亢进
- D. 蛋白质摄入减少
- E. 营养不良

85. 病人血压升高可能原因是

- A. 原发性高血压
- B. 继发性高血压继发于嗜铬细胞瘤
- C. 继发性醛固酮增多症
- D. 继发性皮质醇增多症
- E. 恶性高血压

(86~89 题共用题干)

男, 32 岁。因误服药物半小时而出现头晕、头痛、多汗、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。体格检查: 两肺湿啰音, 呼吸有蒜味, 意识清楚。

86. 如病人系误服药物美曲膦脂, 忌用下列哪种溶液洗胃

- A. 生理盐水
- B. 2%碳酸氢钠
- C. 1:5000 高锰酸钾溶液
- D. 温开水
- E. 淡盐水

87. 如病人出现昏迷, 不能用下列哪种方式清除毒物

- A. 洗胃

- B. 导泻
- C. 催吐
- D. 阿托品
- E. 解磷定

88. 利用阿托品抢救患者的作用机制是

- A. 阻断乙酰胆碱对胆碱能受体的作用
- B. 消除毒蕈碱样症状
- C. 恢复胆碱酯酶的活力
- D. 对抗呼吸中枢抑制
- E. 提高心率

89. 为判断患者中度程度需测定

- A. 呕吐物中有机磷的含量
- B. 血中胆碱酯酶活力
- C. 血、肝、脾功能
- D. 尿中三氯乙醇的含量
- E. 呼吸道分泌物有机磷的鉴定

三、以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（90～93 题共用备选答案）

- A. 可出现鼓音
  - B. 可出现气过水声
  - C. 可出现过清音
  - D. 可出现语颤增强
  - E. 可出现胸廓塌陷
90. 胸腔积气

- 91. 增强肺实变
- 92. 胸膜粘连与增厚
- 93. 肺气肿

（94～96 题共用备选答案）

- A. 首选红霉素
  - B. 首选两性霉素
  - C. 首选大环内酯类
  - D. 喹诺酮类
  - E. 丙烯胺类
94. 军团菌肺炎的治疗
95. 肺炎支原体肺炎的治疗
96. 肺真菌病的治疗

（97～98 题共用备选答案）

- A. 慢性萎缩性胃炎
  - B. 十二指肠球部溃疡
  - C. 胃溃疡
  - D. 胃穿孔
  - E. 胃泌素瘤
97. 上述疾病易并发幽门梗阻的是
98. 上述疾病易癌变的是

（99～100 题共用备选答案）

- A. 三腔两囊管压迫止血
  - B. 洛赛克
  - C. 胃大部分切除术
  - D. 立止血
  - E. 输血
99. 肝硬化引起的上消化道出血首先的治疗方法为
100. 消化性溃疡引起的上消化道出血首先的治疗方法为

## 专业实践能力

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的

方框涂黑。

- 1. 在呼吸道感染流行时为预防交叉感染，接触病毒感染者应

- A. 卧床休息
  - B. 服用抗病毒药物
  - C. 服用中药抗病毒
  - D. 室内食醋熏蒸
  - E. 呼吸道隔离
2. 对于慢性阻塞性肺气肿病人的护理, 下列哪项不妥
- A. 保持室内空气流通
  - B. 鼓励病人采用腹式呼吸
  - C. 给予高浓度吸氧
  - D. 慎用镇静药
  - E. 预防和治疗呼吸道感染
3. 缓解肺气肿患者呼吸困难的首选措施是
- A. 保持端坐位
  - B. 通畅呼吸道, 持续低流量吸氧
  - C. 扩张支气管
  - D. 抗感染治疗
  - E. 呼吸兴奋药
4. 肺心病呼吸衰竭病人, 鼻导管供氧原则是
- A. 必要时低流量 (1~2L/分)
  - B. 高流量间断给氧
  - C. 高流量 (6L/分) 持续给氧
  - D. 低流量持续给氧
  - E. 中流量持续给氧
5. 对肺炎球菌肺炎患者对症护理中, 下列哪项应慎用
- A. 有缺氧症状时可给予鼻导管吸氧
  - B. 腹胀、鼓肠做局部热敷或肛管排气
  - C. 高热者尽量使用解热药
  - D. 进行健康指导, 增加患者对疾病的认识
  - E. 胸痛剧烈者取患侧卧位
6. 中毒性肺炎休克患者宜取何种体位
- A. 每 2 小时变换体位
  - B. 头高足低位
  - C. 仰卧位
  - D. 头低足高位
  - E. 去枕平卧位或头略高、足高的特殊位
7. 下列哪项措施不利于减轻心源性呼吸困难的症状
- A. 坐位或半卧位
  - B. 平卧位
  - C. 吸氧
  - D. 双腿下垂
  - E. 保持镇静
8. 肺结核患者突发大咯血不止时最关键的护理措施是
- A. 吸氧
  - B. 维持静脉通道, 止血处理
  - C. 做镇静、镇咳等对症处理
  - D. 保持呼吸道通畅, 防止窒息
  - E. 准备好急救药品和器械
9. 护士在查房时发现该支气管扩张患者面色青紫, 呼吸困难, 表情痛苦, 应立即采取的抢救措施是
- A. 用导管吸除血块, 保持呼吸道通畅
  - B. 安慰患者
  - C. 进行气管切开
  - D. 加大吸氧流量
  - E. 应用呼吸兴奋药
10. 肺脓肿患者进行体位引流时, 护士关注的重点是下列哪项
- A. 有无发生窒息
  - B. 痰量
  - C. 痰的颜色
  - D. 心率
  - E. 肺部湿啰音
11. 关于胸腔闭式引流的护理, 下列哪项措施是错误的
- A. 病人可采取半卧位
  - B. 观察引流管是否通畅
  - C. 在拔除引流管前先夹闭引流管 24 小时
  - D. 引流瓶的位置必须低于胸腔
  - E. 肺修复后立即拔管

12. I 型呼吸衰竭患者吸入高浓度氧，要严格控制时间，一般连续吸氧不超过

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 24 小时
- D. 12 小时
- E. 1 小时

13. 对伴有水肿的心力衰竭患者进行皮肤护理，是因为病人容易发生

- A. 压疮
- B. 皮肤营养不良
- C. 局部供血不足
- D. 皮肤瘙痒
- E. 水、电解质失衡

14. 对急性肺水肿患者的护理中，下列哪项措施不妥

- A. 按医嘱静脉注射毛花苷 C
- B. 持续低流量吸氧
- C. 氧气湿化瓶中加入去泡沫剂
- D. 给予高流量吸氧
- E. 遵医嘱静脉注射氨茶碱

15. 下列项目中不是组成直流电复律装置的是

- A. 电源
- B. 心电示波
- C. 脉冲发生器
- D. 电极
- E. 同步触发装置

16. 急性心肌梗死护理措施中最重要的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 盐水灌肠，促进排便
- C. 高流量吸氧
- D. 清淡、低盐饮食
- E. 心电监护

17. 心绞痛病人进食过量的严重后果是

- A. 胃胀，膈肌抬高，影响呼吸
- B. 加重心肌供血不足

C. 诱发心律失常

D. 血压升高

E. 加重冠状动脉粥样硬化

18. 急性心肌梗死的护理措施中错误的是

- A. 镇静，避免情绪激动
- B. 保持大便通畅
- C. 持续吸氧
- D. 监护期间绝对卧床休息
- E. 排便困难时，嘱患者用力排便

19. 下列哪种食物不适于高血压患者食用

- A. 豆浆
- B. 牛奶
- C. 猪肝
- D. 菠菜
- E. 香菇

20. 下列哪项不属于高血压急症

- A. 高血压昏迷
- B. 高血压脑出血
- C. 高血压脑病表现严重头痛、呕吐甚至抽搐
- D. 高血压危象
- E. 高血压病一期

21. 安装永久性人工心脏起搏器的病人并发室性心动过速或心室颤动时，最有效的处理措施是

- A. 心前区按压
- B. 电击复律
- C. 更换旧心脏起搏器
- D. 更换起搏器电池
- E. 吸氧

22. 关于电击复律术护理中正确的措施是

- A. 继续服用洋地黄以提高电复律的疗效
- B. 禁食 6 小时，排空大小便
- C. 病人采取半卧位持清醒状态
- D. 暂时停止心电监护，确保安全
- E. 备皮时应将胸部汗毛剃尽

23. 进行电复律治疗时，下列措施不当的是

- A. 病人仰卧于硬板床上  
B. 电极置于胸骨右缘第 2 肋间和心尖部  
C. 放电时抢救人员扶好病人  
D. 严密心电监护  
E. 放电后立即观察心律转复情况
24. 慢性心房颤动病人电复律治疗最易并发脑梗死的时间是术后  
A. 2 小时  
B. 4 小时  
C. 24~48 小时  
D. 72 小时  
E. 96 小时
25. 下列对一位药物治疗无效的阵发性心房颤动病人进行电复律治疗术前指导中不正确的是  
A. 治疗时会给予吸氧  
B. 治疗时需仰卧于硬板床上  
C. 在治疗前 6 小时需禁食、禁水  
D. 治疗过程中病人始终保持清醒状态  
E. 治疗中严密心电监护
26. 对慢性心房颤动病人电复律术后观察的重点是  
A. 体温改变  
B. 情绪的改变  
C. 意识状态的改变  
D. 液体出入量的平衡情况  
E. 氧饱和度的改变
27. 安装人工心脏起搏器的病人应远离的家电是  
A. 电风扇  
B. 微波炉  
C. 电脑  
D. 电话  
E. 洗衣机
28. 对慢性心房颤动电复律术后病人护理中不正确的措施是  
A. 卧床休息 1~2 天  
B. 禁食、禁水 24 小时  
C. 观察生命体征每小时 1 次  
D. 吸氧  
E. 心电监护
29. 下列疾病中不必常规禁食的是  
A. 急性肠梗阻  
B. 急性胃炎  
C. 胃镜检查前  
D. 急性胃肠穿孔  
E. 消化道大出血
30. 下列消化性溃疡病人健康教育内容错误的是  
A. 生活规律, 避免过度劳累  
B. 禁烟禁酒  
C. 抑酸药宜在空腹时服  
D. 胃黏膜保护药宜在饭后服  
E. 季节变换时注意保暖
31. 下列不属于对肝硬化病人健康教育内容的是  
A. 低盐饮食  
B. 可以饮啤酒  
C. 避免刺激性食物  
D. 血氨偏高限蛋白质  
E. 高维生素饮食
32. 预防原发性肝癌最重要的措施是  
A. 不吃发霉变质的食物  
B. 不吃腌制食品  
C. 防治病毒性肝炎、肝硬化  
D. 禁酒  
E. 生活规律
33. 肝性脑病的诱发因素, 不包括下列哪项  
A. 大量利尿  
B. 多次灌肠和导泻  
C. 药物性肝损害  
D. 上消化道出血

E. 高蛋白饮食

34. 肝硬化患者，出现表情欣快，语无伦次，昼睡夜醒。考虑为肝性脑病昏睡期。病人不宜的饮食原则是

- A. 高糖饮食
- B. 增加糖类及维生素饮食
- C. 限制水、钠摄入
- D. 高蛋白质饮食
- E. 不能进食者可静脉滴注葡萄糖

35. 对急性胰腺炎患者的护理，下列哪项措施不正确

- A. 严密观察生命体征
- B. 加强口腔护理
- C. 禁食
- D. 注意休息
- E. 饮食无特殊要求

36. 下列对三腔两囊管的护理中不正确的是

- A. 观察、记录引流液的颜色及量
- B. 胃囊的压力为 50mmHg
- C. 出血停止后立即拔管
- D. 禁食、禁水
- E. 拔管前口服液状石蜡 20~30ml

37. 为防止口臭，口腔和牙龈出血患者宜选择的漱口液为

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 1%过氧化氢溶液
- D. 2%~4%碳酸氢钠
- E. 0.02%呋喃西林

38. 下列对甲状腺功能亢进患者进行健康教育的内容不妥的是

- A. 坚持按医嘱服用甲巯咪唑
- B. 合理安排休息与活动
- C. 每天应食用含碘多的食品
- D. 增加蛋白质和维生素的摄入
- E. 保持情绪稳定

39. 皮质醇增多症患者的饮食原则是

- A. 高糖、高蛋白、高脂、高维生素、低钾、高钠
- B. 低糖、低脂、高蛋白、低脂、高维生素、低钾、高钠
- C. 低糖、高蛋白、低脂、高维生素、高钾、低钠
- D. 低糖、低蛋白、低脂、高维生素、低钾、低钠
- E. 高糖、高蛋白、低高脂、低维生素、低钾、不限钠

40. 普通胰岛素和长效胰岛素混合配制时，必须先抽普通胰岛素的原因是

- A. 两者易发生中和反应
- B. 丧失普通胰岛素的速效特性
- C. 加速胰岛素降解
- D. 降低中效胰岛素的效价
- E. 发生不良反应

41. 糖尿病患者控制饮食的主要目的是

- A. 控制体重、防止肥胖
- B. 控制血糖，减轻胰岛 B 细胞的负担
- C. 减轻胃肠负担
- D. 减少胰液分泌
- E. 延缓消化道吸收

42. 以下哪项糖尿病健康教育内容是不正确的

- A. 控制饮食
- B. 适当锻炼
- C. 监测血糖
- D. 进食富有营养的食物，多摄取高蛋白食品
- E. 加强皮肤呼吸

43. 以下对系统性红斑狼疮的护理措施中错误的是

- A. 保持床单清洁平整
- B. 床上应阳光充足
- C. 病室内温度 18~20℃
- D. 保持室内空气流通
- E. 病室内湿度 50%~60%

44. 对不明原因的急性中毒宜采用以下哪种液体洗胃

- A. 鸡蛋清
- B. 温开水、生理盐水
- C. 牛奶
- D. 2%~4%鞣酸
- E. 2%碳酸氢钠

45. 消化道中毒后洗胃, 每次注入洗胃液量宜控制在

- A. 500~600ml
- B. 500~1 000ml
- C. 1500ml
- D. 800~1 200ml
- E. 200~250ml

46. 下列哪种有机磷农药中毒后不能用 1:5000 高锰酸钾溶液洗胃

- A. 内吸磷
- B. 对硫酸
- C. 美曲磷酯
- D. 乐果
- E. 敌敌畏

47. 患者在家燃烧煤气取暖突然昏倒, 面色潮红, 口唇呈樱桃红色, 脉快, 多汗, 神志不清伴发热。确诊的首选检查是

- A. 脑部 CT
- B. 血液碳氧血红蛋白测定
- C. 脑电图检查
- D. 肺功能检查
- E. 全血胆碱酯酶活力测定

48. 下列对重症中暑患者的护理不正确的是

- A. 保持室内通风
- B. 严密观察体温的变化
- C. 物理降温时, 要不断按摩四肢及躯干皮肤, 使之潮红, 以促进散热
- D. 昏迷者应按昏迷常规进行护理
- E. 药物降温使用氯丙嗪静脉滴注, 滴速要严格控制, 以防血压下降

49. 中暑痉挛者宜口服下列何种饮料

- A. 果汁
- B. 淡茶水
- C. 柠檬汁
- D. 盐水
- E. 白开水

50. 急性肾衰竭病人血压为 130/80mmHg, 体温 37℃, 脉搏 80 次/分, 呼吸 16 次/分, 意识丧失, 压迫眼眶有躲避反应, 没有言语应答, 无意识的自主动作, 瞳孔对光反射、吞咽反射、角膜反射存在, 此时病人处于

- A. 深昏迷状态
- B. 睡眠状态
- C. 昏睡状态
- D. 浅昏迷状态
- E. 清醒状态

51. 癫痫发作时错误的做法是

- A. 解开患者的衣领、衣扣, 保持呼吸道通畅
- B. 在患者上下臼齿间放压舌板
- C. 将体温表置于口腔内测温
- D. 将患者置于平卧位, 头部侧向一边
- E. 扶持患者卧倒

52. 为终止癫痫发作而静脉注射地西泮时需重点观察患者

- A. 心率
- B. 脉氧
- C. 呼吸
- D. 脉搏
- E. 血压

53. 青年女性, 近 2 个月来轻度咳嗽, 咳白色黏痰, 内带血丝; 午后低热, 面颊潮红, 疲乏无力, 常有心悸、盗汗, 较前消瘦。经 X 线摄片检查, 发现右上肺第 2 前肋部位有云雾状淡薄阴影, 无透光区。痰菌 3 次检验阴性。对这例患者, 以下哪项措施不必要

- A. 住院隔离
- B. 给予高热量、高维生素、高蛋白饮食