

新编伤寒论类方

刘渡舟编著

武 岩 张光华 吴凤全 尉敏廷
整 理

山西人民出版社

新编伤寒论类方

刘渡舟编著 武岩等四人整理

责任编辑赵玺如

*

山西人民出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：7 字数：163千字

1984年8月第1版 1984年8月太原第1次印刷

印数：1—8,300册

*

书号：14088·123 定价：0.98元

目 录

前言

桂枝汤类概述

一、桂枝汤	(2)
二、桂枝加葛根汤	(4)
三、桂枝加附子汤	(6)
四、桂枝去芍药汤	(8)
五、桂枝去芍药加附子汤	(9)
六、桂枝麻黄各半汤	(11)
七、桂枝二麻黄一汤	(13)
八、桂枝二越婢一汤	(14)
九、桂枝去桂加茯苓白术汤	(16)
十、桂枝加厚朴杏子汤	(18)
十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	(19)
十二、桂枝甘草汤	(21)
十三、小建中汤	(22)
十四、桂枝去芍药加蜀添牡蛎龙骨救逆汤	(24)
十五、桂枝加桂汤	(26)
十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(28)
十七、桂枝附子汤	(30)
十八、去桂加白术汤	(31)

十九、桂枝加芍药汤	(33)
二十、桂枝加大黄汤	(35)
二十一、桂枝人参汤	(36)

麻黄汤类概述

一、麻黄汤	(40)
二、大青龙汤	(42)
三、小青龙汤	(44)
四、麻黄杏仁甘草石膏汤	(46)
五、麻黄连轺赤小豆汤	(48)
六、麻黄细辛附子汤	(50)
七、麻黄附子甘草汤	(51)
八、麻黄升麻汤	(53)

葛根汤类概述

一、葛根汤	(57)
二、葛根加半夏汤	(59)
三、葛根芩连汤	(60)

抵当汤类概述

一、桃核承气汤	(63)
二、抵当汤	(65)
三、抵当丸	(66)

梔子豉汤类概述

一、梔子豉汤	(68)
二、梔子甘草豉汤	(70)
三、梔子生姜豉汤	(71)
四、梔子厚朴汤	(72)
五、梔子干姜汤	(74)
六、枳实梔子豉汤	(75)

七、栀子柏皮汤.....(77)

陷胸汤类概述

- 一、大陷胸丸.....(79)
- 二、大陷胸汤.....(81)
- 三、十枣汤.....(83)
- 四、小陷胸汤.....(85)
- 五、白散.....(86)
- 六、瓜蒂散.....(88)

泻心汤类概述

- 一、半夏泻心汤.....(91)
- 二、大黄黄连泻心汤.....(93)
- 三、附子泻心汤.....(95)
- 四、生姜泻心汤.....(96)
- 五、甘草泻心汤.....(98)
- 六、旋复代赭汤.....(100)

甘草汤类概述

- 一、甘草汤.....(103)
- 二、炙甘草汤.....(105)
- 三、甘草附子汤.....(106)
- 四、甘草干姜汤.....(108)

苓桂术甘汤类概述

- 一、茯苓桂枝白术甘草汤.....(111)
- 二、茯苓桂枝甘草大枣汤.....(114)
- 三、茯苓甘草汤（苓桂姜甘汤）.....(115)
- 四、五苓散.....(117)
- 五、猪苓汤.....(119)
- 六、文蛤散.....(120)

黄芩黄连汤类概述

- 一、黄芩汤 (122)
- 二、黄芩加半夏生姜汤 (124)
- 三、黄连汤 (125)
- 四、黄连阿胶汤 (126)

白虎汤类概述

- 一、白虎汤 (130)
- 二、白虎加人参汤 (132)
- 三、竹叶石膏汤 (134)

承气汤类概述

- 一、调胃承气汤 (137)
- 二、小承气汤 (139)
- 三、大承气汤 (140)
- 四、麻子仁丸 (142)
- 五、蜜煎导方 (144)
- 六、猪胆汁灌方 (144)

柴胡汤类概述

- 一、小柴胡汤 (147)
- 二、大柴胡汤 (150)
- 三、柴胡加芒硝汤 (152)
- 四、柴胡桂枝汤 (154)
- 五、柴胡桂枝干姜汤 (156)
- 六、柴胡加龙骨牡蛎汤 (158)
- 七、四逆散 (160)

芍药当归汤类概述

- 一、芍药甘草汤 (163)
- 二、芍药甘草附子汤 (165)

- 三、当归四逆汤 (166)
四、当归四逆加吴茱萸生姜汤 (168)

干姜汤类概述

- 一、干姜附子汤 (170)
二、干姜黄芩黄连人参汤 (172)
三、理中丸 (汤) (174)

赤石脂汤类概述

- 一、赤石脂禹余粮汤 (177)
二、桃花汤 (179)

四逆汤类概述

- 一、四逆汤 (182)
二、四逆加人参汤 (184)
三、茯苓四逆汤 (185)
四、通脉四逆汤 (187)
五、通脉四逆加猪胆汁汤 (189)
六、真武汤 (190)
七、白通汤 (192)
八、白通加猪胆汁汤 (194)
九、附子汤 (196)

杂方类概述

- 一、厚朴生姜半夏甘草人参汤 (198)
二、茵陈蒿汤 (200)
三、猪肤汤 (202)
四、桔梗汤 (203)
五、苦酒汤 (205)
六、半夏散及汤 (206)
七、乌梅丸 (207)

- 八、白头翁汤.....(209)
- 九、吴茱萸汤.....(211)
- 十、烧裈散.....(213)
- 十一、牡蛎泽泻散.....(214)

桂枝汤类概述

桂枝汤类计有二十一方，是全书最多的一组类方。桂枝汤类应以桂枝汤方为代表。桂枝汤用途极广，它能滋阴和阳、解肌祛风、外调荣卫、内和脾胃，故不惟发汗以止汗，且发汗而不伤正，止汗而不留邪，又能对汗下后的表不解、或无关中风而荣卫不和等证均可用它治疗。

桂枝汤的加减方法有两种不同的情况：如桂枝汤或加葛根，或加附子，或加厚朴、杏仁等，则属于治疗太阳中风兼证而设，此时仍有风邪在表不解。至于桂枝汤或者增桂枝剂量，或者增加芍药剂量，抑或减去桂枝、或减去芍药等方，乃是中风表邪已解，为治疗各类杂病而设。另外，还有只以桂枝为名（如桂枝人参汤），其实并非桂枝汤加减之方，为了连类发明，也将它归纳于桂枝汤类进行论述。

学习本门方证，可以掌握对桂枝汤的运用，以及加减方证的灵活变化。还可看到桂枝汤的一药之增减，则原有证候面目全非，治疗的性质也随之而变。可见，经方用药如此严谨，对人的启发是很大的。

一、桂枝汤

【药物组成】

桂枝(去皮)三两 芍药三两 甘草(炙)二两 生姜(切)三两 大枣(擘)十二枚

【煎服法】

上五味、㕮咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身染染微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服，依前法。又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

【适应证】

(一)适用于太阳中风，头痛、发热、汗出、恶风、鼻鸣、流涕、干呕、舌苔薄白、脉浮缓等证。

(二)适用于表证或汗或下，而外证未解，脉见浮弱者，或下后其气上冲，或发汗后脉洪大而不烦渴者。

(三)适用于脏无它病，外见营卫失调，而时发热自汗出者。

(四)适用于头痛有热，不大便六七日，脉浮而小便色白者。

【原 文】

第12条、13条、15条、16条、17条、19条、24条、25条、42条、44条、45条、53条、54条、56条、57条、91条、95条、164条、

234条、240条、276条、372条、387条。

【方义】

本方为解肌祛风、调和营卫而设。桂枝辛温，通阳散寒；芍药酸苦微寒，益营敛阴。桂芍相配，于解肌中寓敛汗之意，和营中有调卫之功。生姜辛散，温胃止呕，佐桂枝以发汗通阳；大枣甘缓，助芍药以敛汗护阴；甘草调和阴阳，既可佐桂枝辛甘发散，以祛在表之邪，又可助芍药酸甘化阴，以和在内之营，而能安内攘外，调和诸药。

【选注】

《医宗金鉴》：“名曰桂枝汤者，君以桂枝也。桂枝辛温，辛能发散，温通卫阳。芍药酸寒，酸能收敛，寒走阴营。桂枝君芍药，是于发汗中寓敛汗之旨；芍药臣桂枝，是于和营中有调卫之功。生姜之辛，佐桂枝以解表；大枣之甘，佐芍药以和中。甘草甘平，有安内攘外之能，用以调和中气，即以调和表里，且以调和诸药。以桂芍之相须，姜枣之相得，借甘草之调和，阳表阴里，气卫血营，并行而不悖，是刚柔相济以相和也。”

【按语】

本方发汗而不伤正，止汗不留邪，外能解散风邪、调营卫，内能理气血、协阴阳、和脾胃。它应用十分广泛，不仅用于外感，亦多用于杂病。凡由于气血不和、营卫失调引起的发热、汗出、脉弱等证，均可用本方治疗。仲景把桂枝汤列为第一方的意义，在于它的调和营卫、气血、阴阳，而有寓方于治的精神在内，体现出“察色按脉、先别阴阳”的这一原则。

使用本方时，桂枝与芍药的剂量要相等，否则，不能起到调和营卫的作用。本方凡增减桂枝、白芍任何一种药剂，都会改变其治疗的意义。

还应指出，服用桂枝汤，一定要喝热稀粥，这既可助药力以发汗，又可益胃气以资汗源。服药后，应当盖被避风，而有利于发汗的作用。此方不发汗则不能祛除风邪，但发汗以微似汗出者为佳，而不可令如水流漓。汗出中病，余药可不必再服。若不汗出，应当继续服药，并可缩短服药时间，以催促汗出。如汗不出，可连续服用二、三剂，以汗出病解为目的。

本方对太阳病发热、无汗、脉浮紧的伤寒表实证、证类外感的酒容病，以及温病舌红口渴的，均应禁服。

【方 歌】

桂枝汤方桂芍草 佐用生姜和大枣
啜粥温服取微汗 调和营卫解肌表

【医案选录】

余曾于某年夏，治一同乡杨兆彭。病先其人畏热，启窗而卧，周身热汗淋漓，风来适体，乃即睡去。夜半觉冷，覆被再睡，其冷不减，反加甚。次日诊之。病者头有汗，手足心有汗，背汗不多，周身汗亦不多，当与桂枝汤原方；桂枝三钱 白芍三钱 甘草一钱 生姜三片 大枣三枚。

又次日，未请复诊。后以他病来乞治，曰：“前次服药后，汗出不少，病遂告瘥。药力何其峻也？”然安知此方乃吾之轻剂乎？

（摘《经方实验录》第2页）

二、桂枝加葛根汤

【药物组成】

葛根四两 芍药二两 生姜（切）三两 甘草（炙）二两 大枣（擘）十二枚 桂枝（去皮）二两

【煎 服 法】

上七味，以水一斗，先煮葛根，减二升，去滓，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息及禁忌。

【适应证】

适用于太阳中风，发热汗出而兼有项背强几几证。

【原文】

第14条。

【方义】

桂枝汤能解肌祛风，调和营卫，加葛根，既可加强解肌祛风的作用，又可疏通经脉的凝滞；而又升腾津液，以滋润筋脉的拘紧，则项背强几几自然得愈。

【选注】

张志聪：“此承上文头痛而及于项背，以见太阳循经自上而下之义也。太阳经脉，循于脊背之间，今风邪涉于分部，而经气不舒，故项背而几几然也。是当无汗，反汗出者，肌肤不密也。肌肤虚，故恶风。用桂枝汤以解太阳肌中之邪，加葛根宣通经脉之气，而治太阳经脉之邪。”

【按语】

成无己云：“几几者，伸颈之貌也。动则伸颈，摇身而行。项背强者，动则如之。”这是风邪客于太阳经脉，经气不能流通，筋脉失于濡养的表现。加葛根以宣通经络之滞，又可升腾津液而滋筋脉之拘急。后世还用本方治疗外感不解，而又有下利之证，或治疗风寒背部痹痛，以及下颌关节炎等也都有效。

【方歌】

桂加葛根走经输 项背几几反汗濡

解肌驱风滋经脉 用治柔痉理不殊

【医案选录】

庚戌，建康徐南强得伤寒，背强、汗出、恶风。予曰：桂枝加葛根汤证。病家曰：他医用此方，尽二剂而病如旧，汗出愈加。予曰：得非仲景三方乎？曰然。予曰：误矣。是方有麻黄，服则愈见汗多。林亿谓止于桂枝加葛根汤也。予令生而服之，微汗而解。

（摘许叔微《伤寒九十论》第19页）

三、桂枝加附子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 芍药三两 甘草（炙）三两 生姜（切）三两 大枣（擘）十二枚 附子（炮去皮破八片）

【煎 服 法】

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今加附子，将息如前法）

【适 应 证】

治发汗后遂漏不止，恶风寒，四肢拘急疼痛，屈伸不便，而小便难。

【原 文】

第20条。

【方 义】

用桂枝汤调和营卫，加附子扶阳温经固表。俾阳能摄阴，则漏汗止，营卫调和而诸证可愈。

【选 注】

成无己：“太阳病，因发汗，遂汗漏不止而恶风者，为阳气不足；因发汗，阳气益虚而皮腠不固也。《内经》曰：‘膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则出’。小便难者，汗出亡津液，阳气虚弱，不能施化。四肢者，诸阳之本也，四肢微急，难

以屈伸者，亡阳而脱液也。《针经》曰：“液脱者，骨属屈伸不利”。与桂枝加附子汤，以温经复阳。”

尤在泾：“夫阳者，所以实腠理、行津液、运肢体者也。今发汗而使阳虚，既不能护其外，又不能温其里，则汗出而小便难矣。邪风之气，亦不能随汗而解，所以恶风、四肢微急、难以屈伸”。

【按语】

桂枝加附子汤为表阳虚而风邪不解设，或因外邪不解而又误治伤阳之证。来路虽不尽同，然阳虚而兼外感则一。

这里的辨证关键是汗出不止，然脉必浮而不沉。若汗多脉沉，则为亡阳之征，非四逆汤则不可为功。

本方还治疗风寒肢痛，脉沉而弦，而有温经散寒之用。若因风寒痹阻的肌肤麻木不仁，可酌加当归、红花等理血之品，则效果为更捷。

【方歌】

桂加附子治有三 风寒肢痛脉迟弦
汗漏不止恶风甚 肌肤麻木卫阳寒

【医案选录】

顾某，卫气素虚，皮毛不固，动则汗出。忽感风邪，始则啬啬恶寒，渐渐恶风，继则翕翕发热，腰背酸楚，间以恶心、自汗淋漓。迁延两日，病势有增，四肢拘急，屈伸不利，手足发冷，延余就诊。见其面带垢晦，怯手缩足，自汗颇多，气息微喘。此太阳表证，卫虚未厥，必需一鼓而克之，否则顾此失彼，难保无肢厥脉沉之虞。乃处以桂枝加附子汤，桂枝三钱、芍药四钱、炙甘草二钱半、熟附片五钱、生姜钱半、大枣十枚，一剂而愈。”

（摘《江苏中医》1959、5、16）

有一士人得太阳证，因发汗，汗不止，恶风，小便涩，足挛

曲而不伸。予诊其脉浮而大，浮为风，大为虚。予曰：在仲景方中有两证大同而小异，一则小便难，一则小便数。用药稍差，有千里之失。仲景第七证云：太阳病，发汗遂漏不止，其人恶风小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤。第十六证云：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁吐逆。一则漏风小便难，一则自汗小便数，或恶风，或恶寒，病各不同也。予用第七证桂枝加附子汤，三啜而汗止。复佐以甘草芍药汤，足便得伸。”

（摘《普济本事方》第106页）

四、桂枝去芍药汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十
二枚

【煎服法】

上四味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。（本云桂枝汤，今去芍药，将息如前法。）

【适应证】

误下以后，心胸阳气受挫，表邪内陷，出现脉促、胸满等证。

【原 文】

第21条。

【方 义】

误下以后，心胸之阳虽伤，而犹能鼓其力以抗邪，故胸虽满而脉反促。桂枝配甘草辛甘化阳，以温心胸之阳气；生姜、大枣调和营卫，务使陷入之邪由胸出表，得以外解。去芍药之义，因其酸收，而反掣桂枝之肘。此乃治阳而远阴之义。

【选注】

成无己：“太阳病下之，其脉促不结胸者，此为欲解。此下后脉促而胸满，则不得为欲解，由下后阳虚，表邪渐入而客于胸中也。与桂枝汤以散客邪，通行阳气。芍药益阴，阳虚者非所宜，故去之。”

【按语】

太阳病误下伤正，表邪乘虚内陷。表与胸通，故首先犯胸。胸阳受挫，然犹能力争，故脉来急促。“满”读为“闷”，是邪客胸中，胸阳不振的反映。邪虽入胸，从脉促分析，仍有出表之势，故用桂枝汤去芍药，调和营卫，宣通胸阳，因势利导，则诸证可愈。

本证除有胸满外，往往伴有心悸、咳逆、短气等证。

【方歌】

桂枝去芍药何居 胸满心悸膻中虚
若见咳逆和短气 桂甘姜枣治无遗

【医案选录】

王某，男，36岁。自述胸中发满，甚或作痛，每逢冬季发作更甚，兼见咳嗽、气短。切其脉弦而缓，扪其手则凉而不温，问其小便则清白而长。参合上述脉证，诊为胸阳不振而阴寒上踞。处方用桂枝9克、生姜9克、炙甘草6克、大枣7枚、附子9克。

服此方数剂，而胸满气短皆愈。

（刘渡舟医案）

五、桂枝去芍药加附子汤

【药物组成】

桂枝（去皮）三两 甘草（炙）二两 生姜（切）三两 大枣（擘）十