

盈亨利編譯

賀氏療學

第五版

中華民國二十四年六月
西歷一千九百三十五年

中華醫學會編譯部出版

第一章

GENERAL THERAPEUTICAL CONSIDERATIONS

療學總論

療學者、乃講明各病之醫法、並各藥之功效也、夫醫之所當學者甚繁、惟此學爲醫家之根本、若不研究此學、雖通達化學體學與體功內科外科等學、於行醫一途、尙未必能有把握、近二十餘年、外科之療法、較昔年大有進步、非僅在器具之新巧與割法之習熟、乃因療學日求日精耳、倘於此學中免腐之藥、未能考究而通曉之、則所見之功效、恐亦無殊於昔日也、蓋醫士之療病、其盡心設法、無非欲其痊癒、如遇不治之症、不可置而不顧、亦必設法俾病者減少其苦難、夫療學者、乃在考查各藥之妙能、以顯示於來學、醫士果能通達此學、所用之藥必有神效、如輕視此學、雖素善割症、其所見之效、尙不如精熟療學之拙手、醫士每遇病人、最宜細詢其病源、既得其病源、又宜診明其病體、然後投之以藥、此論雖係常理、亦有時不可拘泥、如初見病人、病勢已至危急、宜先治其表、因無暇其裏也、卽如膽石膀胱等症、痛極難忍、宜用空針射莫非、先止其痛、後再追病源、蓋考查病源、有時須遲至數日、方能通曉、且於未用藥之先、當有定章心、按定章投藥、較無定章者、其效必大、遵此理而行、所用之藥味、必不甚多、自能醫病、至於定分劑之大小、當與用藥同視爲緊要、否則必少見功效也。

藥之用法 MODES OF ADMINISTERING DRUGS 此法甚多、所常用者有五、

一、一吸、一敷、一射皮內、一射肛內、最常用者惟服法。

服法 服藥之常理、多在飯後、若胃經生瘍、宜在飯前、必如此藥力方能達於胃、小腸生瘍、宜在飯後數句鐘、必如此藥力與食物同入小腸、患處方得藥之功效。

吸法 此法多用於氣管炎症、用法、有以藥置於滾水內、令病人吸其氣者、有於噴霧具內令吸之者、亦有專治瘡症、用顛茄佛茄兒等藥、裝入烟袋內、令病人吸之者、人患楊梅、有時不能服藥、以銻氫弱鹽置於火上、令病人吸其氣者、亦有數類症、令病人吸氫者、惟哥羅芳伊打喜氣等、只用爲迷蒙之藥、此皆吸法之類也。

敷法 此法可用之藥、大約係魚肝油、銻抹膏、氫抹膏等油藥類、宜敷於皮薄而血脂多處、卽腋與股內等處、此外有氣酒與各類擦藥、更有貼膏與糊藥、亦歸敷藥類、貼膏乃貼於皮膚上、令藥力由皮膚達於患處、糊藥因其溼熱之力、令患

處速於生膿、並有止痛之功。

皮內射法 此理乃因皮內之連膈、陳藥甚速故也、但用時藥與針務必潔淨、且必用可溶之藥、忌用惹力過大者、恐有生瘡之患也、可射藥處、一在肘外、一在腓、『俗名腿肚』一在背、總之不宜射於血脂多處、與皮膚硬處、其法以左手之拇食二指、提起皮膚、用右手執針、射入其內、但用此法之險有二、一如針射入盂內、藥必隨血立至生命司所、或至殞命、二如所用之針與藥、有一不淨、必致生瘡、預備射藥、宜用滾水溶之、且針內不可少存空氣。

肛內射法、此法有二、一射肛類、一肛彈類、射肛類之用有三、一能令藥被噉、二能令藥達於肛、或膈內『俗名大腸』之病處、三肛膈被塞、易於冲下、若用此法、令藥被噉、切不可用之過多、從二至四兩(60.0-120.0)爲止、如過四兩、肛肌受惹、即將所用之藥逼出矣、如欲冲下肛膈內之塞物、即至一二斤亦無妨、有時肛受激而其肌發板、不能存所射之藥、故宜緩緩射之、若加油與鴉片酒數滴尤妙、有時人雖日見大便、膈內仍有餘糞存積、日久必成重患、此等症多射溫水、可注出之、如遇腸塞症、無論因何而致、宜用溫水數斤、以弔水袋緩緩射之、此水當熱至百度、弔水袋當高於病者二三尺、切不可射之過猛、須滴滴而入、可免腸外統膜崩裂之虞、如多用此水當加鈉氫鹽少許、令與血中所含之鹽同、『即此水之百分之一之十分之七』方可、若病者不進飲食、可以合宜之食物、射入肛內、亦能養育病人、至能用食物之時、但所射之食物、亦不宜過二至四兩、(60.0-120.0)肛彈類之用有二、一令藥達於病處、二令藥噉入感於全身。

製劑

PREPARATIONS. 製劑繁多、所常用者如下。

強散藥類 Abstracta, 乃以某藥之膏、研成細末、置於乳糖內而成者、使其力倍於本藥。

醋藥類 Aceti, 乃以某藥浸於醋內而成者。

碱藥類 Alkaloids, 乃以化學法由生藥取出、與酸類相合而成礬、其力較本藥甚大。

水藥類 Aquæ, 多係氣易散之藥、置於水內、溶解而成者。

糊藥類 Cataplasmae, 多係胡麻子、或饅首、用滾水浸之而成者。

蠟抹膏類 Cerata, 乃抹膏內加以蠟者、使其不易溶化耳。

紙藥類 Chartæ, 以吸水紙浸於藥內而成者。

糖菓藥類 Confectiones, 乃以糖菓和藥搗爛而成者。

煮水藥類 Decocta, 乃以藥置於水內煮之、熱時隔渣即成。

甘香酒藥類 Elixir, 乃以淡酒精加糖與香類而成、爲使病者易服。

貼膏類 Emplastra, 乃以藥置於粘性物內、勻攤於紙或布或皮革上。

勻類藥 Emulsiones, 乃以油藥類、置於白樹蒴內、漸次加水研勻而成者。

藥膏 Extracta, 乃以生藥置於酒或水內、煎之而成乾膏者。

流膏藥類 Fluidextracta, U. S. Extracta Liquida, B. P. 此類之製法、與製膏類同、但煉之成漿而止。

甘油藥類 Glycerites, 乃以藥置於甘油類而成者。

沖藥類 Infusa, 以滾水沖之、候至冷時、隔渣而成、亦有以冷水沖之者。

擦藥類 Linimenta, 此類之製法、與抹膏類同、惟其油乃爲流質耳。

丸藥類 Pilulae, 此丸之大小、約不可過三厘、(0.2) 過則不易下咽、如藥體沉重、至五厘 (0.3) 亦可、有裹皮者、亦有無皮者、裹皮之益有二、一免藥力散失、二免藥味觸鼻、惟以筋膠爲皮最妙、裹糖皮者、日久不宜用之。

肛彈類 Suppositoria, 將藥置於寇寇脂內、製成彈形。

輪藥類 Tabellae, 乃用機器壓之而成輪。

藥酒類 Tincturae, 將生藥散置於濾筒內、以酒澆之、淋出而成。

乳糖散類 Triturates, 將藥一分、乳糖九分、研勻而成者。

藥餅類 Trochisci, 以藥與糖及白樹蒴相合而成者。

抹膏類 Unguenti, 將藥置於脂內、調勻而成者。

葡萄酒類 Vini, 此製法與製他藥酒相同、但此必用葡萄酒而成之、


分劑 DOSAGE. 分劑

所以無定者、緣人有男女老幼強弱與病勢之不同、且因人有服藥之癖忌與否、最妙之法、乃視人身體之輕重而定、如體重百斤者、宜服十厘、(0.6) 五十斤者、宜服五厘(0.3) 由此可以遞推、若身體過胖、與得疥腫者、仍當按本體定之、若醫孩童之症、有常用之法、如孩

第一圖



第二圖



第三圖



量 盃

4 第一章 分劑 藥陳遲速 藥效久暫 配藥輔助

童四正歲、加十二、得十六、用孩童本歲除十六、得四、此孩童可服成人分劑四分之一、無論孩童之年歲幾何、皆宜加十二、後用本歲除之、此爲常理、用流質藥類之分劑、宜按量滴量之、不可論滴、緣其滴之大小不同也、用藥射入皮膚、當按所服分劑之半、用有力之藥、如恐人有癖忌、初宜用最小之分劑、後漸加之、射入肚內、宜用服分劑之兩倍、如係被噁甚速之藥、宜少用之。

藥陳遲速 ABSORPTION OF DRUGS 藥陳之遲速、醫士宜切記之、否則不知用藥之時、夫藥噁入之遲速、大半由於血運之遲速、如救溺水者、血運不週、形狀似死、必當妨用藥過多之險、若頻灌有力之藥、存積胃中、及其蘇醒時、血一運動、藥即噁入、恐生命司所大受其害、酒狂者宜用莫非、或服或射、蓋欲令其安睡也、如用足分劑無效、不宜再用、恐有中毒之患、曾有忽畧此理者、用之過多、以致殞命、患疥腫者、噁藥甚遲、必致藥力存於身內、俟其瀉腹、或放水後、此藥方能噁入、如用之過多、則中毒矣、若於此病用空針射藥、不但無益、反致有損、因射藥之處、易於生膿也、論噁藥之常理、飽腹時噁入必遲、空腹必速、如人飯前飲酒、雖未及量而醉、飯後飲酒、即及量亦不至醉、其理一也、藥在胃、或腸內、惹力若不甚大、則無感身之能、因其未曾噁入之故、近有人查明酒藥類、較水藥甘油等類、易於噁入、如胃經受阻、噁藥之力、必致減少、果有此患、當於所用之藥內、加辣椒類之激發藥、則噁入甚速矣。

藥效久暫 DURATION OF ACTION OF DRUGS 藥效存時之久暫、在噁入之遲速、一在身內之改變、或祛離之遲速耳、如酒精、伊打哥羅芳、戔氫弱礬等氣易散之藥、效於身內、存時不久、緣其祛離甚速也、若鋳氫鹽與狄吉他利、效於身內、可存十數句鐘之久、因其改變或祛離甚遲也、若以固拉拉射於皮內、必致呼吸司所被癱、如服中分劑、隨噁入隨由腎經祛離、則呼吸司所、不致被癱矣、醫士必查明藥祛之遲速、方知每日宜服幾次、譬如錳礬強礬、祛離甚速、每二句鐘、宜服一次、狄吉他利噁入甚遲、即一日服至三次、亦不爲少、祛離甚遲之藥、若不謹慎用之、或有積效之虞。

配藥輔助 COMBINATION OF DRUGS FOR JOINT EFFECT 近代醫士、多研究藥之體功效、故醫病之法、亦漸次加增、如哥拉有阻心之力、莫非有阻呼吸之力、若擇此二藥之一而專用之、能治不寐、但不如以此二藥之小分劑、兼而用之爲妙、且無阻心與呼吸之損、若配瀉藥、加顛茄與馬前子、爲補腸內肌之藥、相輔用之、大爲有益、醫士選藥配方、不但宜取同效之藥、且留意於難服之藥、若

其症必須用難服之藥、固不能不用、然遇有可變通者、宜盡心變通之、令病者易服也。

藥力

STRENGTH AND RELIABILITY OF DRUGS, 昔日輪車輪船未興、生藥從

遠方而來、受風雨摧淋、藥力故常減少、近轉運較速、少失其藥力、然多有生藥產於原野、或深山之處、採藥之人、取非其時、藥力亦必不足、近之製藥者、能將所備之藥、試其力與揀藥冊同否、但用已試之藥、價值必昂、然價雖昂、較未試之藥功效甚妥、曾有人遞購五藥行之馬前子酒、以化學法、挨次取其酒中之士的年、最著名之藥行、酒中所含者、較揀藥冊加倍、若用此藥之足分劑、甚屬危險、他藥行酒中所含者、少十分之九、其不同之故、皆在所用之生藥不同耳、若用經試之藥、則免此等之虞、如無經試者、宜將糖藥類成丸用之、或以淡酒精溶服、惟狄吉他利與綠藜蘆之糖、不可如此用、因此二藥之糖、其效與本生藥不同也、狄吉他利之糖甚多、綠藜蘆之糖有二、然迄今未識此二藥之糖如何用之、方合生藥之效也、曾有幼童用鴉片表散一服、卽至殞命、因配藥者未將此藥研勻、其中所含之鴉片甚多也、按幼童原不宜服鴉片散類、如必須用、只服鴉片酒類、可免此虞、醫家用藥不知其力、正如匠人用器具不當、難免無誤矣。

癍忌

IDIOSYNCRASY, 癍忌無定理、有服某藥之微分劑、卽見危險之形狀者、有服過分劑、毫無功效者、惟常患癍症之婦女、癍忌易顯、有人服錄韋弱鹽之微分劑、卽中錄毒者、曾有一三十歲婦人、患頭痛甚重、二日之內、服印度麻膏十五厘、(1.0)竟不見效、此分劑、乃男子所應服之七倍也、且因其每日午後作燒、三日之內、服貴林百五十厘、(10.0)亦無功效、並不令其耳鳴、後又於十六句鐘內、服安替派林六十厘(4.0)仍如未服、此分劑係常人所應服之六倍也、又每二十分鐘、射披路加便韋鹽、一厘之八分之一、(0.008)共射一厘之四分之三、(0.045)亦無功效、此等過分劑、不能令其發汗、亦不能令其流涎、皆因有癍忌之故、醫士於初見之病人、宜用藥之小分劑、蓋試其有癍忌否也。

宜用

INDICATIONS. 見病狀而用所宜用之藥、且所用之藥、不宜令其他處受害。

禁用

CONTRAINDICATIONS. 見病狀而禁用所不宜用之藥、如腦衣炎症、熱度過多、貴林雖能退熱、則不可用、因其能令腦衣絡多有積血也。

不符之藥

INCOMPATIBILITY. 醫士所以必學化學者、爲免其將不符之藥合爲一方、至變成毒類、或崩類之藥也、按藥類之不符者、不可勝數、惟將人

易犯者畧言之。

一 酸鹼二類不可合用。

二 酸類與酒類不可合用 不符之方如下。

鈹氣鹽	R·Potassii iodidi	二錢	(8.0)
皇強酸	Acidi nitro-hydrochlorici	一量錢	(4.0)
辛寇拏雜酒	Tincturæ cinchonæ comp.	三兩	(90.0)

此方之酸與氣不符、亦與酒不符。

三 凡鹼類置於糖類之礬鹽中、則易成他類之藥、不符之方如下。

士的年硫強礬	R·Strychninæ sulphatis	一厘	(0.06)
鈹氣鹽	Potassii iodidi	二錢	(8.0)
洋荻苓雜糖漿	Syrupi sarsaparillæ compositi	三量兩	(90.0)

此方之鈹氣鹽能令士的年沉澱、病者服至瓶底之時、必皆爲士的年、因有中毒之患、

四 鈹氣強礬、與炭匿酸不符、若合用之、必成崩藥、鈹錳上礬亦然。

五 鈹氣強礬、與銨氣鹽不符、若合用之、則易燃著。

六 鐵藥類、與炭匿酸不符、若合用之、必成鐵炭礬、植物斂藥類、常含炭匿酸、故亦不可與鐵藥合用、惟此類之中、瓜沙與加林啤可與鐵藥合用。

七 糖類若製成溶液、不可與炭匿酸合用。

八 鐵類鉛類砒酸類與白樹落不能合用。

九 樟腦酒、與水不可合用。

十 流膏類、與水不可合用、因水必令膏力沉澱、

十一 鹼礬類與酸類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十二 酸礬類與鹼類不符、若合用之、必改二藥之體質。

十三 植酸類、與砒酸類不能合用。

十四 氣及氣鹽類、與糖類不可合用。

十五 銻氣強鹽、鉛類、鈹氣鹽、銀氫強礬、俱屬單用之藥、惟銻氣強鹽與鈹氣鹽可合用、銀氫強礬、與鴉片膏或開羊花、亦可合用。

十六 海葱糖漿、與銻礬強礬不可合用、因海葱糖漿、內含醋酸之故。

十七 郁李桂水、Cherry Laurel Water 與莫非不可合用、若二藥相合、必變

成甚毒之藥。

- 十八 哥拉與鈉衰治、不可合用、因二藥互為改變、致成氫衰酸、
 十九 寇卡印與硼砂相合、即成不消溶之礬、惟與硼強酸合用、則不改其體質。
 二十 銻氫弱塩與安替派林、不可合用。
 廿一 安替派林、與熾氫弱酒、不可合用。
 廿二 水藥類因消溶之力已盡、而猶用之製他類濃溶液、則無消溶之力、故不可用。
 廿三 胃化脛糖、與脛糖不可合用、因胃化脛糖能於酸內成功、脛糖乃於鹼內成功。

飲食 多有醫士、於病人之飲食、不甚留意、以致飲食不當、難獲痊癒、可知但以藥醫病、不足為妙、必須留意於病者之飲食、否則不但少有功效、恐病者亦不以其為名醫、而信賴之矣。

chap. I 藥之分類 CLASSIFICATION OF DRUGS. 打胎藥類、非醫家所宜用、故不細論、然遇有胎之婦人、因有故必須打落者、用器具取下可也、但須約同他醫協和辦理。

chap. II 解抽藥

甘松

樟腦

醉母花

鎮靜劑
ANTISPASMODICS,

Valeriana,

Camphora,

Humulus, U. S.

麝香

阿魏

熾氫弱酒

洋升麻

Moschus,

Asafoetida, U. S.
Asafoetida, B. P.

Spiritus Ætheris Nitrosi,

Cimicifuga.

chap. III 迷蒙藥

伊打

ANÆSTHETICS,

Æther,

氫氫下治

哥羅芳

Nitrous Oxide,

Chloroform,

chap. IV 睡藥

✓哥拉

索弗拿

✓怕拉第亥

HYPNOTICS, **催眠劑**

Chloralum Hydratum, U.S.
Chloral Hydras, B.P.

Sulphonal,

Paraldehydum,

鴉片

哥拉阿米

台歐那

Opium,

Chloralamidum,

Trional,

chap. V 激腦藥

顛茄

鬧洋花

猶肯

CEREBRAL EXCITANTS,

Belladonna,

Hyoscyamus,

Eucaïne.

印度麻

佛茄兒

寇卡

Cannabis Indica,

Stramonium,

Coca,

Chap. VI	激動系藥	EXCITO-MOTORS,	馬前子	Nux Vomica,
Chap. VII	阻動系藥	DEPRESSO-MOTORS,	加拉巴豆	Physostigma,
	鉍氫鹽	Potassii Bromidum,	炆氫弱礬	Amylis Nitris, U.S.
	路卑利	Lobelia,	黃茉莉	Amyl Nitris, B.P.
	哥念	Conium.		Gelsemium,
Chap. VIII	激呼吸藥	RESPIRATORY	魁拔寇	Aspidosperma.
Chap. IX	激心藥	STIMULANTS,	鍾泚	Ammonia,
	酒精	CARDIAC STIMULANTS,	狄吉他利	Digitalis,
	康昇箭毒	Alcohol,	加非印	Caffeina,
	洋鈴蘭	Strophanthus,	金雀印	Sparteina.
Chap. X	阻心藥	Convallaria,	鉍鈎菓礬	Antimonii et Potassii Tartras, U.S.
	綠藜蘆	CARDIAC DEPRESSANTS,	辣菜根	Antimonium Tartaratum, B.P.
	烏頭	Veratrum Viride,	氫衰酸	Arnica Radix,
	菓酸	Aconitum,	檸檬酸	Acidum Hydrocyanicum,
	醋酸	Acidum Tartaricum,		Acidum Citricum,
	欬藥	Acetum.		
	加湧酸	ASTRINGENTS,	炭匿酸	Acidum Tannicum,
	佳奴	Acidum Gallicum,	兒茶	Gambir, U.S.
	架美喇	Kino,	赤蘇木	Catechu, B.P.
	鉛弱養	Krameria,	白礬	Hæmatoxylon,
	鉍礬強礬	Plumbi Oxidum	鉛醋礬	Alumen,
	鉍草礬	Bismuthi Carbonas,	鉍氫下礬	Plumbi Acetas,
	銅硫強礬	Cerii Oxalas,	鉍硫強礬	Bismuthi Subnitrates,
	補藥	Cupri Sulphas,	銀氫強礬	Zinci Sulphas,
	高錳弱養	TONICS,	鐵藥類	Argenti Nitras.
	氫氫強酸	Mangani Oxidum Nigrum,	硫強酸	Ferrum,
	皇強酸	Acidum Hydrochloricum,	氫強酸	Acidum Sulphuricum,
	改症藥	Acidum Nitro-Hydrochloricum.		Acidum Nitricum,
	砒弱酸	ALTERATIVES,	砒	Phosphorus,
	鐵鈉氫強鹽	Arseni Trioxidum, U.S.	銻藥類	Hydrargyrum,
		Acidum Arseniosum, B.P.	氫	Iodum,
		Auri et Sodii Chloridum,		

鉀碘鹽	Potassii Iodidum,	黃碘	Iodoformum,
魚肝油	Oleum Morrhuae,	磷酸	Acidum Phosphoricum,
哥枝禁	Colchicum,	洋茯苓	Sarsaparilla, U.S.
怪阿克	Guaiacum,	魚石膽	Ichthyol,
牌欄	Thyroid Gland,	腎上腺	Suprarenal Gland
盟症敵	ANTITOXINS.		
瘡癰解	ANTIPERIODICS,	貴林	Quinina,
郁加列托	Eucalyptus,	匹克酸	Acidum Picricum.
熱藥退	ANTIPYRETICS.	沸酸	Acidum Carbolicum, B.P. Phenol, U.S.
幾阿蘇	Creosotum,	幾阿蘇碳強治	Creosotum Carbonas,
怪阿寇即怪	Guaiacol,	洋蘇冰	Thymol,
喇瑣辛阿可	Resorcinum,	柳酸	Acidum Salicylicum,
撒婁	Salol,	安息香	Benzoinum,
安替派林	Antipyrina, U.S. Phenazonum, B.P.	阿司炭尼利	Acetanilidum,
芬阿錫吞	Phenacetin.		
胃藥激	STOMACHICS,	瓜沙	Quassia,
龍膽草	Gentiana,	加林啤根	Calumba,
印度龍膽草	Chirata,	洋郁李	Prunus Virginiana.
洋桂	Cinnamomum,	丁香	Caryophyllum,
豆蔻	Cardamomum,	薑	Zingiber,
胡椒	Piper,	辣椒	Capsicum,
白柴油	Oleum Cajuputi,	沙沙油	Oleum Sassafras,
洋苦菊	Anthemis,	馬兜鈴	Serpentaria,
加思架	Cascarilla.		
藥吐	EMETICS,	衣必格	Ipecacuanha,
阿甫莫非氫鹽	Apomorphinae, Hydrochloridum,	芥	Sinapis
硫強礬	Zinci Sulphas.		
瀉藥輕	APERIENTS,	甘露	Manna,
槐花青	Cassia Fistula	洋杜仲	Euonymus,
鎂礬	Magnesia,	硫	Sulphu

蓖麻油	Oleum Ricini,	錄	Hydrargyrum,
大黃	Rheum,	阿羅	Aloes,
辛那	Senna,	鎂硫強礬	Magnesii Sulphas,
鈉硫強礬	Sodii Sulphas,	鈉硫強礬	Sodii Phosphas,
鈉鉀菓礬	Potassii et Sodii Tartras.		
重瀉藥類 PURGES,		渣笠	Jalapa,
哥羅新	Colocynthis,	士金無年	Scammonium,
獨腳蓮	Podophyllum,	洋苦瓜汁	Elaterium,
藤黃	Cambogia,	巴豆油	Oleum Tiglii, U. S. Oleum Crotonis, B. P.
利小便藥 DIURETICS,		海葱	Scilla.
金雀花	Scoparius,	錄鉀弱鹽	Hydrargyri Chloridum Mite, U.S. Hydrargyri Subchloridum, B.P.
熾氫弱酒	Spiritus Ætheris Nitrosi,	狄吉他利	Digitalis,
鉀	Potassium,	派怕拉辛	Piperazine,
烏羅透品	Urotropin,	銻	Strontium,
布球	Buchu,	沛利泣	Pareira,
嗽花	Uva Ursi,	愛冬葉	Chimaphila,
杜松	Juniperus,	以利準油	Oleum Frigerontis,
檀香油	Oleum Santali,	玉蜀黍	Zea,
松節油	Oleum Terebinthinæ,	哥拜巴	Copaiba, 249
畢澄茄	Cubeba,	瑪替開拉	Matica,
卡伐卡伐	Kava-Kava,	洋斑蝥	Cantharides,
發表藥 DIAPHORETICS.		披路加便	Pilocarpina,
熾氫弱酒	Spiritus Ætheris Nitrosi,		
祛痰藥 EXPECTORANTS,		路卑利	Lobelia,
鉍鉀菓礬	Antimonii et Potassii Tartras, U.S. Antimonium Tartaratum, B. P.	衣必格	Ipecacuanha,
鉀檸檬	Potassii Citras, *	阿甫莫非錄鹽	Apomorphina Hydrochloridum,
銻鉀鹽	Ammonii Chloridum,	膠草	Grindelia,
皮路脂楠	Balsamum Peruvianum,	透路脂楠	Balsamum Tolutanum,
蒜	Allium,	海葱	Scilla,
松瀝	Pix Liquida,	阿摩特	Ammoniacum,

辛伊加	Senega,	替利賓	Terebenum.
調經藥	EMMENAGOGUES,	檀香油	Oleum Santali,
鉍錳上礬	Potassii Permanganas,	洋斑蝥	Cantharides,
怪阿克	Guaiacum,	沙芬	Sabina,
芸香	Ruta,	炭阿西吞	Tanacetum.
縮子宮藥	XYTOTOXICS,	芫荽油	Apiol,
麥奴	Ergota,	金印草	Hydrastis,
棉根	Gossypii Radicis Cortex,	玉蜀黍菌	Ustilago,
外惹內效藥	COUNTERIRRITANTS,	洋斑蝥	Cantharides,
芥	Sinapis,	辣椒	Capsicum,
松節油	Oleum Terebinthinæ,	銹化	Ammonia,
巴根地櫚	Pix Burgundica.		
潰藥	CAUSTICS,	鉍化	Potassa,
砒弱酸	Arseni Trioxidum, U. S.	鉍氫鹽	Zinci Chloridum,
銻氫強鹽	Acidum Arceniosum, B. P.		
高銻氫強礬溶液	Hydrargyri chloridum corrosivum, U. S.		
氫強酸	Hydrargyri perchloridum, B. P.		
氮	Hydrargyri Nitritus,	硫強酸	Acidum Sulphuricum,
潤藥	Acidum Nitricum,	鎢強酸	Acidum Chromicum,
卡喇桿	Bromum.		
洋石花菜	DEMULCENTS,	白樹薈	Acacia,
胡麻子	Tragacantha,	義斯蘭苔	Cetraria,
潤皮藥	Chondrus (Carrageen)	甘草	Glycyrrhiza,
寇寇脂	Linum.		
白蜂蠟	EMOLLIENTS,	豬脂	Adeps,
胡麻子油	Oleum Theobromatis,	鯨頭油	Cetaceum,
棉子油	Cera Alba,	黃蠟	Cera Flava,
甘油	Oleum Lini,	洋橄欖油	Oleum Olivæ,
糊藥	Oleum Gossypii Seminis,	羊毛脂	Adeps Lanæ,
改酸藥	Glycerinum,	軟煤油蠟	Petrolatum, U. S.
	CATAPLASMATA.		Paraffinum Molle, B. P.
	ANTACIDS,	鈉氫碳酸強礬	Sodii Bicarbonas,

錯弱羹	Calx,	澱錯碳強礬	Calcii Carbonas. Praecipitatus,
殺腸蟲藥 ANTHELMINTICS,			
士拜枝喇	Spigelia,	藜藿	Chenopodium,
山道年	Santoninum,	非利瑪	Aspidium, U.S. Filixmas, B.P.
東瓜子	Pepo,	松節油	Oleum Terebinthinæ,
石榴根皮	Granatum,	洋蘇冰	Thymol,
卡瑪拉	Kamala.		
助消化藥 DIGESTANTS,			
脰梅	Pancreatinum,	胃化脰梅	Pepsinum,
木瓜精	Papain,	糟膏	Extractum Malti,
滅瘴毒藥 DISINFECTANTS,			
錯銀粉	Calx Chlorinata,	氯	Chlorum,
銻銀強鹽	Hydrargyri Chloridum Corrosivum, U.S. Hydrargyri Perchloridum, B.P.	硫強酸	Acidum Sulphurosum,
銻錳上礬	Potassii Permanganas,	祇毛	Formalin,
訥他連	Naphthalenum,	氫銀強治溶液	Aqua Hydrogenii Dioxidi, U.S. Hydrogenii Peroxidi Liquor, B.P.
腓酸	Phenol, U.S. Acidum Carbolicum, B.P.	訥透	Betanaphthol,
礬強酸	Acidum Boricum,	來蘇	Liquor Cresolis Compositus,

第二章

論·解鎮抽症藥類 *Antispasmodics*

此類藥人所常用者、因其性和平也、腦力虛弱、易生惱怒者、用之有效、如不甚重者、名曰瘳症、甚重者則至於癱症、因此類藥能補腦力、故有謂為補腦藥類者、其中僅有樟腦與伊打雜酒、畧含毒力、然必用過分劑、其毒力方顯。

麝香 MOSCHUS, p. s. 此藥多出於西藏、乃麝鹿陽莖前袋所含者、香味甚濃、鋪中所售者、多係不純。

療效 此藥有補力之效、並有解抽平腦之功、各類低熱症 low fevers, 如其力過於微弱、腦部甚受阻者、宜以此藥五至十厘 (0.3-0.6) 加糖水、射入肚內、有效、如腦系部受激或腦力脫失, nervous excitement or nervous collapse, 此藥有效、但不可早用、惟病至危急時用之、可使病者出此危險、若早用之、則藥力漸失、及至病危之時、反無功用矣、呃逆重症、hiccough 此為最妙之品。

製劑與分劑

麝香酒 Tinctura Moschi, U. S. 四十至六十量滴 (2.6-4.0)

麝香散 Moschus, U. S. 五至十五厘 (0.3-0.6)

甘松 VALERIANA, U. S.

VALERIANÆ RHIZOMA, B.P.

此藥有數種、出歐洲中華等處、入藥者係該草之根、內含氣易散之油、亦含一酸、油名甘松油、酸名甘松酸。

體功效 此藥畧有阻腦之力、能令腦系部平靜、服過分劑脉則畧速、身自覺暖、並有時嘔吐、如所服之分劑過大、必致瀉腹、知覺亦受其阻。

療效 婦女腦系部受激、nervous excitement, 致患不寐症、insomnia 或專用此藥、或與他藥並用、有效、癱症 hysteria 亦有效、酒狂症、delirium tremens 與莫非兼服、乃為常用者。

製劑與分劑

甘松流膏 Tinctura Valerianæ, U.S. 六十量滴 (4.6)

甘松銹化酒 Tinctura Valerianæ, Ammoniata, 半至一量錢 (2.0-4.0)

甘松沖藥 (Infusum Valerianæ) 二量兩 (60.0)

甘松酒 Tinctura Valerianæ, U.S. 一至三量錢 (4.0-12.0)

甘松油 (Oleum Valerianæ) 二至四量滴 (0.12-0.25)

此藥不入揀藥冊

甘松酸 (ACIDUM VALERIANICUM) 此藥乃無色之油、味甚猛而濃、入藥者、惟此酸中之銓、鐵、貴林、銹等礬、有平腦之力、與補藥之功。

製劑與分劑

銓甘松礬	Zinci Valeras, U.S.	半至三厘	(0.03-0.2)
鐵甘松礬	(Ferri Valeras)	一至三厘	(0.06-0.2)
貴林甘松礬	(Quininae Valeras)	二至十厘	(0.12-0.6)
銹甘松礬	Ammonii Valeras, U.S.	二至十厘	(0.12-0.6)

神經過敏 癱瘓 痙攣 二症之良方如下。

貴林甘松礬	R-Quininae valeratis.	二十厘	(1.3)
鐵甘松礬	Ferri valeratis.	二十厘	(1.3)
銹甘松礬	Ammonii valeratis.	二十厘	(1.3)

共成二十九、日服三次、每次服一至二九。

Fiant Pilulae No. XX S.—One or two pills three times a day.

阿魏

ASAFETIDA, U.S.
ASAFETIDA, B.P.

此藥產於阿弗干、乃以樹汁製成、兼紅黃白 色、味似蒜、其臭頗烈、服之而胃覺暖、有平育道之功、亦可為祛風之藥。

療效 此藥常用為祛風藥、其功多顯於大腸內、年邁者、因胃不消化、致腸胃氣脹、服之最妙、孩童腸胃脹之疳、Colic of children 亦可用之、孩童之氣脹 tympanites of children 或腸熱症之氣脹、tympantites of typhoid fever 可用為射肛藥、氣管肺炎、bronchitis 可用為祛痰藥、孩童腦部過於受激、亦常有效。

製劑與分劑

阿魏丸 Pilulae Asafetidae, U.S. 每丸內有此藥三厘、(0.2)

每次可服二三九。

阿魏勻藥	Emulsum Asafetidae, U.S.	半至一兩	(15.0-30.0)
阿魏酒	Tinctura Asafetidae, U.S. Tinctura Asafetidae, B.P.	三十至六十量滴	(2.0-4.0)
阿魏肛彈	(Suppositoria Asafetidae)	每彈內有此藥八厘	(5.0)

年邁人食後因氣虛致胃脹滿者、良方如下。

馬前子膏	R-Extracti nucis vomicae	五厘	(0.3)
寇拉膏	Extracti kolae	五厘	(0.3)
阿魏	Asafetidae Asafetidae	四十厘	(2.0)

共成二十九、早晚各服一九。 Fiant pilulae No. xx
S.—One night and morning.

樟腦 CAMPHORA, 此藥原出於中華日本等處,由樟木取出,泰西所售者乃屢用升法製成,純者色白、或淡紅、其氣易散、味熱而臭烈、別具一種氣息、最易燃著、其煙色黑、冷水千分、或酒精一分、各能溶藥一分。

體功效 服過分劑、必致頭暈、耳鳴、膽語、後則癱瘓、有如癇症、脈速而微、皮冷而紫、全身生汗、或覺腹內燒痛、中毒日久者、腎必發炎、若服小分劑、則能增人氣力、脈畧速而有力、亦覺胃暖、腦部清明、全身暢快、服足分劑、有謂為平陰陽藥者、有謂為激陰陽藥者、大概服過分劑、有激陰陽之力、此藥於人身內改其體質者居多、由腎祛離亦有由汗與呼吸祛離者。

療效 此藥服敷皆可、孩童或婦女服之、可作平腦 nervous sedative 或解抽藥 antipasmodic, 若經痛 dysmenorrhoea 之婦女、有頭痛 headache 或癩患者 nervousness 此藥有效、如與阿司炭尼利、或安替派林同用、甚效、若製成輪藥服之尤妙、瘧 cholera 與似瘧症 cholera morbus 可用之、各類盟瀉 serous diarrhoea 亦可用之、惟各類瀉瀉少效、莖舉硬痛 chordee 與鉅氮鹽同用、有效、有名醫、於各類低熱症 adynamic fever, 曾以此作激力藥用之、無論何症、致腦部驟然受阻 sudden nervous depression 有效、倘病勢已危、恐服藥不及、宜以樟腦一分、用洋橄欖油九分溶之、射十五滴 (1.0) 於皮內、但用時最宜謹慎、所用之油、亦務求純淨、有名醫云、癆症之腦部受阻、或積效之患者、常用此法治之、呃逆症 hiccough, 此為妙劑、如用力太過而致心跳 cardiac palpitation, 與細氣管久炎 capillary bronchitis, 或氣管泗膜久炎 chronic bronchitis, 服之皆效、鼻泗膜久炎 cold, 聞樟腦酒、有補助泗膜生液之功、口出臭氣者、用之漱口有效、人患傷風、初患時、聞樟腦酒大效、並有良方如下。

樟腦	R-Camphorae	二厘	(0.12)
顛茄流膏	Fluidextracti belladonnae, U.S. Extracti belladonnae Liquidi, B.P.	一量滴	(0.05)
貴林硫強礬	Quininae Sulphatis	二厘	(0.12)

共成十丸、隔一句鐘服一丸、每日只可服五次。

Fiant tabellae No. X. S:—One every hour for four or five doses.

如於初患時服之、可減頭痛 headache, 噴嚏 sneezing 鼻嚏等患、若不早用無效、無故鼻嚏流淚不止、並噴嚏不斷者、宜以樟腦散、或樟腦塊、置於滾水內、顛之、或顛樟腦酒亦可。

敷用 患停瘍者、可用此藥激之、對磨癢 indolent ulcer 以白石粉與樟腦