


阿虎医考

护士执业资格考试
押题秘笈
模拟试卷三

阿虎医考命题研究中心 组编



上海科学技术出版社

护士执业资格考试

押题秘笈

模拟试卷三



阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社



护士执业资格考试

专业实务

姓 名: _____

准考证号: _____

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现是

- A. 头晕、头痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 蜘蛛痣
- D. 腹痛、腹泻
- E. 腹水

2. 关于脊髓灰质炎减毒活疫苗的特点及服用方法,正确的是

- A. 为被动免疫制剂
- B. 皮下注射
- C. 灭活疫苗
- D. 用凉开水送服
- E. 肌肉注射

3. 扩张型心肌病的主要临床表现是

- A. 心音减弱
- B. 左心室明显扩大
- C. 出现第三心音或第四心音
- D. 心尖区可听到收缩期杂音
- E. 下肢水肿

4. 易导致泌尿系统感染的检查是

- A. 静脉胆道造影
- B. 逆行肾盂造影
- C. 尿培养和菌落计数
- D. 静脉肾盂造影
- E. 放射性核素检查

5. 羊水的功能不包括

- A. 保证胎儿活动度,防止与羊膜粘连
- B. 气体交换
- C. 保护胎儿不受外来损伤
- D. 羊水检查可监测胎儿成熟度
- E. 分娩时传导子宫收缩的压力

6. 水痘的主要传播途径是

- A. 血液传播
- B. 虫媒传播
- C. 飞沫传播
- D. 消化道传播
- E. 密切接触传播

7. 不属于基础护理与重症护理质量标准中“四无”的是

- A. 无压疮
- B. 无坠床
- C. 无跌倒
- D. 无烫伤
- E. 无交叉感染

8. 老年人药物代谢的特点错误的是

- A. 肝药物代谢酶活性降低
- B. 药物排泄半衰期延长
- C. 药物血浆半衰期延长
- D. 肝合成蛋白质能力降低,致结合型药物增多
- E. 肾血流量及肾小球滤过率下降

9. 患者,男,40 岁,出差时患急性甲型肝炎住院治疗,欲写信通知家人,对其信件最佳的消毒方法是

- A. 高压蒸汽灭菌法
- B. 甲醛浸泡法
- C. 紫外线照射法
- D. 过氧乙酸擦拭法
- E. 洗必泰溶液喷雾法

10. 某病区护理人员的工作方式是:一位责任护士对其所管患者从入院到出院提供连续、全面、整体的护理。该种工作方式是

- A. 个案护理
- B. 责任制护理
- C. 经验护理
- D. 小组护理
- E. 综合护理

11. 为患者采血进行哪项检查时,需用抗凝管采血

- A. 甘油三酯的测定
- B. 肝功能检查
- C. 血清酶测定
- D. 尿素氮测定
- E. 血钠测定

12. 患者,女,61岁,风湿性瓣膜病,因心源性水肿医嘱给予噻嗪类利尿药治疗,护士执行完医嘱后应重点预防

- A. 低钾血症
- B. 高钠血症
- C. 低钠血症
- D. 高钾血症
- E. 低镁血症

13. 以下不属于护理评价意义的是

- A. 了解服务对象对健康问题的反应
- B. 提升护理经济效益
- C. 验证护理效果
- D. 调控护理质量
- E. 为修订护理计划提供依据

14. 在消化性溃疡的治疗中,抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A. 铝碳酸镁
- B. 西咪替丁
- C. 碳酸氢钠
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 奥美拉唑

15. 以下有关医嘱的说法中,不正确的是

- A. 医嘱是护士对患者实施治疗的依据
- B. 执行医嘱时必须仔细核对
- C. 执行医嘱后需签名
- D. 抢救患者时,应立即执行口头医嘱
- E. 护士发现医嘱有明显错误时,需告知相关医生

16. 有机磷农药中毒时,属于烟碱样症状

的是

- A. 呼吸困难
- B. 流涎
- C. 心跳减慢
- D. 肌肉抽搐
- E. 多汗

17. 慢性心力衰竭患者宜采用的饮食是

- A. 高热量、高蛋白、高维生素、低纤维素饮食
- B. 低热量、低糖低脂、高纤维素饮食
- C. 低脂、低热量、高盐、粗纤维饮食
- D. 高蛋白、高维生素、高铁饮食
- E. 高蛋白、低盐、高维生素饮食

18. 下列心律失常中,可通过缓解情绪控制的是

- A. 心房颤动
- B. 室早二联律
- C. 心室颤动
- D. 二度室传导阻滞
- E. 房性期前收缩

19. 患者,男,53岁,因心肌梗死被送急诊,患者当时神志清楚,由于费用问题,拒绝住院坚持回家。此时,医护人员应该

- A. 尊重患者自主权,同意其回家
- B. 行使特殊干涉权,强行把患者留在医院
- C. 行使自主权,为救治患者强行留患者住院
- D. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时行使干涉权
- E. 尊重患者自主权,但应尽力劝导患者住院,无效时办好相关手续

20. 患者,女,60岁,心前区压榨样疼痛1小时,伴脉速、冷汗、恐惧感,来院急诊。护士采取的措施中不妥的是

- A. 准备好抢救物品和药品
- B. 抽血送检

- C. 推车送放射科拍 X 线胸片
D. 开放静脉通路
E. 心电监护并密切观察病情变化
21. 黄色痰液,静置后分层,可见上层泡沫黏液、中层浆液、下层坏死组织沉淀物,该痰液可见于
A. 支气管肺炎
B. 慢性支气管炎
C. 支气管扩张症
D. 肺气肿
E. 细菌性痢疾
22. 患者,女,33 岁,在胆囊造影前,需做碘过敏试验,做试验的时间宜在检查前
A. 1~2 小时
B. 6~12 小时
C. 12~24 小时
D. 24~48 小时
E. 48~72 小时
23. 患儿,女,7 岁,以先天性心脏病收入院第 1 天,拟行手术治疗。当天晚上夜班护士查房时患儿开始哭闹:“我要爸爸妈妈,现在就要,离开他们我睡不着。”护士最佳的回答是
A. “你想爸爸妈妈了吧?我陪你说说话吧。”
B. “如果你要乖乖地睡觉,我就给你拿玩具玩。”
C. “你再闹的话,我就给你扎针了。”
D. “你不许瞎闹,再闹大灰狼就来了。”
E. “医院有规定,你现在的情况父母不能陪床。”
24. 初产妇,24 岁,妊娠 40 周,待产。产妇规律宫缩 8 小时,宫口开大 3 指,胎心 136 次/分,宫缩 3~4 次/分,每次持续 50 秒。产妇精神紧张,不断叫嚷“活不成了”。对该产妇首先应采取的护理措施是
A. 适当休息
B. 做好心理调适
C. 鼓励进食
D. 定时排尿
E. 按时做肛检
25. 患者,女,48 岁,阑尾炎术后第 2 天,患者自觉腹胀,术后尚未排气、排便,下列护理措施错误的是
A. 针灸疗法
B. 腹部热敷
C. 床上多翻身
D. 给予阿托品肌肉注射
E. 床边多活动
26. 患者,男,35 岁,淋雨后发热、咳嗽 2 天,右侧胸痛,咳铁锈色痰。体检:神志清楚, T 38.6℃, P 100 次/分, R 24 次/分, 血压 100/72 mmHg, 胸部 X 线检查示右下肺叶大片模糊阴影,遵医嘱首选的抗生素是
A. 青霉素
B. 红霉素
C. 头孢菌素
D. 左氧氟沙星
E. 苯唑西林
27. 《突发公共卫生事件应急条例》的方针是
A. 预防为主,常备不懈
B. 分级负责,责任到人
C. 反应及时,措施果断
D. 加强合作,协同落实
E. 统一领导,统一措施
28. 目前控制哮喘最有效的抗炎药物是
A. β 受体激动药
B. 吡唑美辛
C. 糖皮质激素
D. 色甘酸钠
E. 头孢类抗生素
29. 患者,女,58 岁,卵巢癌晚期不治身亡。死亡是逐步发展的过程,其中机体不可复活的死亡阶段是

- A. 濒死期
B. 临终状态
C. 临床死亡期
D. 生物学死亡期
E. 死亡接受期
30. 患者,男,55岁,肝硬化病史6年,黑便1周,呕血1天入院治疗。体检:面色苍白,精神不振, T 38.2℃, P 120次/分, R 25次/分, BP 90/60 mmHg。该患者目前存在的最主要的护理问题是
- A. 潜在并发症:上消化道出血
B. 活动无耐力
C. 体液不足
D. 体温过高
E. 有受伤的危险
31. 体温记录单 40~42℃ 栏内填写的内容不包括
- A. 转入时间
B. 手术时间
C. 分娩时间
D. 首次治疗时间
E. 死亡时间
32. 患者,男,40岁,左前臂二度烧伤5天,局部创面湿润、疼痛。护士为了改善患者的局部状况,可在局部进行
- A. 红外线照射,每次20~30分钟
B. 热湿敷,水温40~60℃,局部及周边涂凡士林,盖单层纱布
C. 冷湿敷,每次10~15分钟
D. 放置45~50℃热水袋,避免烫伤
E. 放置冰袋,每次15分钟
33. 患者,女,68岁,癌症晚期,感到恐惧和绝望,当其发怒时,护士应
- A. 热情鼓励,帮助患者树立信心
B. 理解忍让,陪伴保护患者
C. 说服教育,使患者理智地面对病情
D. 指导用药,减轻患者痛苦
E. 同情照顾,满足患者的要求
34. 患者,男,43岁,有乙肝病史15年,因肝区隐痛、疲乏、食欲差、双眼巩膜黄染来候诊,门诊护士处理方法正确的是
- A. 安排提前就诊
B. 转急诊室诊治
C. 将患者转隔离门诊诊治
D. 给患者测量生命体征
E. 立即送抢救室抢救
35. “硝普钠 2.5 mg, po, sos”,此医嘱属于
- A. 长期医嘱
B. 临时医嘱
C. 长期备用医嘱
D. 临时备用医嘱
E. 口头医嘱
36. 患者,女,52岁,因糖尿病入院治疗。护士为其铺好床单位后,告诉患者:“我是您的责任护士,我姓李,叫我小李就行,有事请按床头呼叫器,我随时为您服务。”此时护士承担的主要角色是
- A. 热情的接待者
B. 主动的介绍者
C. 细心的照顾者
D. 认真的计划者
E. 耐心的教育者
37. 患者,女,46岁,因肝硬化食管静脉曲张、腹水入院。放腹水后出现意识不清、呼之不醒,但压迫其眶上神经仍有痛苦表情,下列饮食护理正确的是
- A. 高盐饮食
B. 无蛋白高热量饮食
C. 低维生素饮食
D. 高蛋白饮食
E. 限制含糖食物
38. 婴儿腹泻重度脱水时,首选下列哪种液体

- A. 生理盐水
B. 2: 1 等渗液
C. 11.2% 乳酸钠
D. 1.4% 碳酸氢钠
E. 10% 葡萄糖溶液
39. 为女患者导尿操作, 下列哪项是错误的
A. 患者取仰卧屈膝位
B. 脱下近侧裤腿盖到对侧腿上
C. 初次消毒外阴顺序是由外向内、自上而下
D. 第二次消毒顺序由内向外、自上而下
E. 导尿管插入尿道 4 ~ 6 cm
40. 重大医疗事故的报告时限为
A. 12 小时
B. 18 小时
C. 1 天
D. 2 天
E. 3 天
41. 患者, 女, 21 岁, 眼部整形术后, 上睑肿胀, 局部有少量出血。为配合止血, 护士可采取的措施是
A. 手掌根部压迫上下眼睑
B. 眼部放置冰囊
C. 局部涂凡士林保护皮肤, 放置热水袋, 注意避免烫伤
D. 局部红外线照射
E. 用 50% 硫酸镁湿热敷
42. 患儿, 2 岁, 因佝偻病入院。医嘱: 鱼肝油 10 滴, 每天 1 次。护士为患儿配药时, 在药杯中都先加少量温开水, 再加鱼肝油, 其原因是
A. 有利于吞服
B. 减少药量损失
C. 利于患儿口感
D. 避免药物挥发
E. 避免过凉
43. 患者, 女, 23 岁, 因车祸致胸部损伤后出现吸气时胸壁内陷、呼气时胸壁外凸, 护士为其评估病情, 应考虑为
A. 血胸
B. 张力性气胸
C. 多根多处肋骨骨折
D. 闭合性气胸
E. 胸部爆震伤
44. 婴儿, 男, 8 个月, 体格、智能发育正常, 此期小儿心理发展的特征是
A. 与父母建立良好的依赖关系
B. 表现出明显的自主性
C. 具有丰富的想象力及进取精神
D. 能很好地发展勤奋的个性
E. 能确认自我认同感
45. 患者, 男, 18 岁, 诊断为急性淋巴细胞白血病。应用环磷酰胺化疗时, 护士应着重观察患者是否出现下列哪项毒副反应
A. 出血性膀胱炎
B. 末梢神经炎
C. 心肌损害
D. 高尿酸血症
E. 口腔溃疡
46. 患者, 女, 26 岁, 意识丧失, 被家属送入院。查体: 患者不能被唤醒, 压眶有反应, 瞳孔对光反射、角膜反射存在。估计此患者的意识状况属于
A. 谵妄
B. 昏睡
C. 意识模糊
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
47. 患者, 女, 36 岁, 得知自己患晚期乳腺癌后心情沮丧, 常暗自落泪, 感觉自己时日不多, 不时出现拒绝治疗的现象。护士与患者沟通时应避免的行为是
A. 当患者拒绝治疗时直接告诉主管

- 医生
- B. 鼓励患者积极配合治疗
- C. 认真倾听患者内心的感受
- D. 及时满足患者的合理需求
- E. 密切关注患者的情绪变化,及时疏导
48. 患者,女,42岁,混合痔行痔核切除术后,出院时护士的健康指导中不正确的是
- A. 高纤维素饮食
- B. 保持大便通畅
- C. 大便秘结可口服缓泻药
- D. 保持肛门清洁
- E. 可以适当进食辛辣食物
49. 患者,男,28岁,因大叶性肺炎入院。医嘱青霉素80万单位肌内注射。护士用5ml注射器往密封瓶内注入稀释液时,可以用手接触的部位是
- A. 针尖
- B. 针梗
- C. 乳头
- D. 针栓外壁
- E. 活塞
50. 患者,男,35岁,“见到”床上有虫爬(幻视),要求护士清理,护士此时的正确做法是
- A. 帮助患者清除床上的虫
- B. 拒绝帮助
- C. 告诉患者目前处于病态,医护人员会帮他
- D. 避开话题
- E. 否认床上有虫
51. 与血浆成分相比,血清不含有的物质是
- A. 血液的有形成分
- B. 纤维蛋白原
- C. 血浆白蛋白和球蛋白
- D. 电解质
- E. 水
52. 中医情志是指
- A. 怒、喜、思、悲、恐
- B. 气、血、津、精、神
- C. 风、寒、暑、湿、火
- D. 酸、苦、甘、辛、咸
- E. 心、肝、脾、肺、肾
53. 新生儿生理性体重下降是指平均比出生时下降了
- A. $\leq 2\%$
- B. $\leq 10\%$
- C. $\leq 13\%$
- D. $\leq 15\%$
- E. $\leq 18\%$
54. 下列不属于吸气性呼吸困难的情况是
- A. 气管痉挛
- B. 气管管腔狭窄
- C. 气管异物
- D. 喉癌
- E. 支气管哮喘
55. 患者,女,52岁,身高155cm,体重75kg,诊断为2型糖尿病,“三多一少”症状不明显,空腹血糖9.8mmol/L。首选的口服降糖药物是
- A. 格列齐特
- B. 甲苯磺丁脲
- C. 格列吡嗪
- D. 二甲双胍
- E. 格列本脲
56. 关于秋季腹泻的病原体,正确的是
- A. 痢疾杆菌
- B. 轮状病毒
- C. 大肠埃希菌
- D. 埃可病毒
- E. 乙型溶血性链球菌
57. 下列属于阴的症状是
- A. 声高气粗
- B. 精神亢奋

- C. 面色潮红
D. 脉细涩
E. 舌苔黄糙
58. 留取 24 小时尿标本时,标本中加甲醛的作用是
- A. 防止尿液中的激素被氧化
B. 固定尿中有机成分
C. 防止细菌污染
D. 保持尿液中的化学成分不变
E. 延缓尿液中化学成分的分解
59. 在强心苷应用过程中,关于患儿的饮食护理正确的是
- A. 多进食含钾高的食物
B. 多进食含钠高的食物
C. 多进食含钙高的食物
D. 多进食含磷高的食物
E. 多进食含铁高的食物
60. 患儿,2 岁,因化脓性脑膜炎入院,脑脊液细菌培养结果为肺炎链球菌,为其首选的药物是
- A. 罗红霉素
B. 链霉素
C. 青霉素
D. 庆大霉素
E. 克林霉素
61. 孕妇,32 岁,停经 55 天,阴道少量流血 6 天,因出血量增多 2 小时就诊。妇检:子宫颈口扩张,少量宫腔内容物堵子宫颈口,子宫体略大;尿 HCG(+),首先考虑为
- A. 稽留流产
B. 不全流产
C. 先兆流产
D. 难免流产
E. 完全流产
62. 患者,男,45 岁,消化性溃疡 5 年,呕血、黑粪 1 天。查体:脉搏 100 次/分,血压 90/60 mmHg。该应给予患者的护理是
- A. 特级护理
B. 一级护理
C. 二级护理
D. 三级护理
E. 专人护理
63. 差异性发绀最常见于以下哪种先天性心脏病
- A. 动脉导管未闭
B. 房间隔缺损
C. 室间隔缺损
D. 法洛四联症
E. 肺动脉瓣狭窄
64. 《献血法》规定,我国现行的献血制度是
- A. 自愿献血制度
B. 无偿献血制度
C. 法定献血制度
D. 强制献血制度
E. 有偿献血制度
65. 患者,女,42 岁,确诊为“腰椎间盘突出症”,请问该疾病最基本的病因是
- A. 椎间盘退行性变
B. 损伤
C. 妊娠
D. 营养不良
E. 遗传因素
66. 患者,男,45 岁,血压持续升高 3 天,住院检查。患者入院后,护士主动自我介绍,并帮助患者熟悉病区环境和病友。此时,护士与患者处于护患关系发展时期的
- A. 熟悉期
B. 工作期
C. 协作期
D. 解决期
E. 结束期
67. 患者,女,52 岁,因哮喘急性发作急诊入

院。下列哪项不属于护士在入院时的初步护理

- A. 护士自我介绍,消除陌生感
- B. 立即给患者氧气吸入
- C. 安慰患者,减轻焦虑
- D. 详细介绍环境和规章制度
- E. 通知医生,给予诊治

68. 原发性急性肾小球肾炎最常见的病因为

- A. 大肠杆菌
- B. 变形杆菌
- C. β 溶血性链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 副大肠杆菌

69. 患者,男,23岁,示指刺伤5天,患指肿胀、搏动性疼痛,手下垂时疼痛加剧,伴轻度发热,拟诊为化脓性指头炎。最常见的致病菌是

- A. 白色念珠菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 拟杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 沙门菌

70. 患者,男,27岁,诊断为精神分裂症。当谈论振奋人心的事时,患者都很悲伤;在诉说自己遭受迫害的妄想体验时,患者却津津乐道。这些症状是

- A. 情绪高涨
- B. 欣快感
- C. 情感淡漠
- D. 情感倒错
- E. 真性痴呆

71. 患者清晨注射长效胰岛素,应警惕最易发生低血糖反应的时间是在

- A. 注射后半小时
- B. 午饭后
- C. 下午
- D. 早餐前

E. 夜间

72. 患者,女,55岁,慢性呼吸衰竭。护士遵医嘱给予吸氧,应用支气管舒张药、呼吸兴奋剂等。应用呼吸兴奋剂后,患者会出现的表现是

- A. 咳嗽加剧
- B. 双下肢水肿改善
- C. 痰液分泌减少
- D. 呼吸变浅变慢
- E. 呼吸加深加快

73. 以下属于甲类传染病的疾病是

- A. 艾滋病
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 麻疹
- D. 鼠疫
- E. 狂犬病

74. 患者,女,35岁,入院评估时护士问患者:“您哪里不舒服?”患者小声地说:“单位体检时医生说可能得了性病。”护士又问:“您是怎么得上性病的?”患者回答:“我也不知道。”护士嘲讽地笑着说:“不知道?好吧,上床检查看看。”说得病房里在场的其他患者和家属都笑了。此案例中护士的行为侵犯了患者的何种权利

- A. 保护隐私权
- B. 知情同意权
- C. 医疗公平权
- D. 生命健康权
- E. 自主决定权

75. 护士在护理实践中应遵循对患者的尊重原则,主要是尊重患者的

- A. 个性
- B. 自主性
- C. 病情
- D. 家属和朋友
- E. 生活习惯

76. 患者,女,40岁,慢性肾炎病史5年余,目前尿蛋白(+++),明显水肿,尿少,血压正常,血肌酐正常。目前其主要护理诊断为
- A. 营养失调,低于机体需要量
 - B. 有感染的危险
 - C. 生活自理缺陷
 - D. 体液过多
 - E. 知识缺乏
77. 护士对慢性肾衰竭患者采取的护理措施中,最重要的是每天
- A. 记录24小时出入量
 - B. 监测生命体征
 - C. 测体重
 - D. 尿比重测定
 - E. 尿常规检查
78. 护士在执行医嘱时,如有疑问,可采取的做法是
- A. 忠实执行医嘱
 - B. 自行更改医嘱
 - C. 按护士认为正确的措施执行
 - D. 及时向开具医嘱的医师提出疑义
 - E. 直接向护士长报告
79. 患者,女,35岁,胆道感染,非手术治疗中,出现阵发性寒战、高热、面色潮红、呼吸急促、腹泻。行血液细菌培养,最佳的采血时间是
- A. 发热高峰时
 - B. 腹泻缓解后
 - C. 寒战前
 - D. 寒战时(体温上升)
 - E. 呼吸平稳后
80. 患者,女,18岁,因急性阑尾炎需急诊手术。患者表现十分害怕,焦虑不安,食欲差,失眠。急诊护士应首先考虑给予
- A. 饮食指导
 - B. 心理护理
 - C. 观察病情变化
 - D. 术前常规护理
 - E. 镇静药物
81. 冷疗控制炎症扩散的机制是
- A. 增强白细胞的吞噬功能
 - B. 降低细菌的活力
 - C. 降低神经的兴奋性
 - D. 溶解坏死组织
 - E. 增强免疫功能
82. 一位肿瘤晚期患者向医生诉说“虽然我得的是恶性肿瘤,但你们一定要使用最先进的疗法,我会全力配合,只要我们不放弃,希望总是有的,我会好起来的。”该患者处在心理反应的
- A. 忧郁期
 - B. 协议期
 - C. 接受期
 - D. 否认期
 - E. 愤怒期
83. 患者,男,34岁,颅脑损伤,受伤后昏迷20分钟后清醒,6小时后又发现昏迷,左侧瞳孔散大,右侧肢体活动障碍。护士可据此判断该患者可能出现了
- A. 脑挫裂伤
 - B. 右侧硬膜下血肿
 - C. 脑内血肿
 - D. 左侧硬膜外血肿
 - E. 脑震荡
84. 以下医嘱应最先执行的是
- A. prn
 - B. sos
 - C. st
 - D. qh
 - E. bid
85. 患者,女,64岁,脑中风后卧床2周。护士查看患者臀部时,判断其压疮属于淤血红润期,该期的主要特点是

- A. 局部皮肤红、肿、热、痛
- B. 皮肤有破溃
- C. 表皮有水疱形成
- D. 局部皮肤可闻及臭味
- E. 浅表组织有脓液流出

86. 患者,男,50岁,护士为其测体温时,得知5分钟前患者饮过热开水,以下做法正确的是

- A. 嘱其用冷开水漱口后再测
- B. 暂停测一次
- C. 改测直肠温度
- D. 告知30分钟后再测口腔温度
- E. 继续测量

87. 下列哪项不属于口腔护理的目的

- A. 保持口腔清洁
- B. 预防口腔感染
- C. 增进食欲
- D. 观察口腔内的变化,提供病情变化信息
- E. 去除牙结石

二、以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(88~89题共用题干)

患者,男,45岁,因车祸伤急诊入院,CT检查示颈椎骨折,行颅骨牵引术。

88. 护士应为患者安置

- A. 膝胸卧位
- B. 半坐卧位
- C. 头低足高位
- D. 头高足低位
- E. 去枕仰卧位

89. 为该患者翻身时,以下方法哪项是正

确的

- A. 先放松牵引后翻身
- B. 翻身后放松牵引
- C. 头侧向一边后再翻身
- D. 翻身后头侧向一边
- E. 不可放松牵引

(90~93题共用题干)

王某,47岁,工人,脊髓损伤致腰以下截瘫后1周转入,患者意识清醒,大小便失禁。

90. 该患者的护理问题不包括

- A. 潜在的皮肤完整性受损
- B. 社交孤立
- C. 自理能力缺乏
- D. 躯体移动障碍
- E. 尿失禁

91. 住院期间,患者的工友来院探视,患者取半坐位与工友聊天3小时,结果护理体检时发现左侧坐骨结节处呈暗红色,该患者的皮肤问题属于

- A. 局部暂时性缺血
- B. 压疮淤血红润期
- C. 压疮炎性浸润期
- D. 压疮坏死溃疡期
- E. 压疮浅表溃疡期

92. 为该患者做按摩时可用

- A. 50%乙醇
- B. 70%乙醇
- C. 90%乙醇
- D. 松节油
- E. 温水

93. 按摩的手法中,以下哪项是错误的

- A. 以手掌大小鱼际部分紧贴皮肤
- B. 做压力均匀离心方向按摩
- C. 压力变化为轻一重一轻
- D. 每次3~5分钟
- E. 随时询问患者感受,观察病情变化

(94~95 题共用题干)

患者,男,66岁,因肺癌行肺癌根治术,术后收入 ICU。术后第一天,患者身上留置了气管插管、胃管、胸腔引流管、导尿管、静脉输液管等多种管道。患者神志清楚,但情绪较为烦躁,并多次试图拔除身上的管道。

94. 护士向患者解释说明各种管道的作用,为患者安置较为舒适的体位,分散患者的注意力,护士的行为符合护理伦理原则,其中不涉及哪项

- A. 公正原则
- B. 不伤害原则
- C. 尊重原则
- D. 有利原则
- E. 知情同意原则

95. 患者仍试图拔管时,护士加以制止并直接用宽绷带对患者的腕部及膝部进行约束,对其行为进行伦理分析中正确的是

- A. 行使了护士的特殊干涉权
- B. 违反了尊重患者的自主权
- C. 行使了护士的强制执行权
- D. 违反了患者的医疗保健权
- E. 违反了患者的生命健康权

(96~98 题共用题干)

刘小姐,24岁,右侧第二磨牙牙龈红肿,牙痛影响睡眠。

96. 最佳的护理指导是

- A. 口含冰块
- B. 口含温开水
- C. 侧卧位面颊置热水袋
- D. 侧卧位面颊置冰袋
- E. 红外线照射

97. 护理指导的依据是

- A. 热促进炎症的消散与局限
- B. 热减轻组织充血
- C. 热减低痛觉神经的兴奋性

D. 冷使神经末梢敏感性降低

E. 冷降低局部温度

98. 以下关于冷热疗法的叙述正确的是

- A. 是临床上常用的化学治疗方法
- B. 可以直接使内脏器官的血管收缩或扩张
- C. 可以直接刺激大脑皮层
- D. 可以通过皮肤内大量的神经末梢将刺激传导到大脑皮层
- E. 一般不影响机体各系统的体液循环和新陈代谢活动

(99~100 题共用题干)

患者,男,18岁,因高考失利自服家中有机磷农药,经过洗胃等抢救后,现患者病情稳定。

99. 因抢救患者,护士未能及时记录,抢救记录和护理病历的完成时间应在抢救结束后

- A. 1 小时内
- B. 3 小时内
- C. 6 小时内
- D. 9 小时内
- E. 24 小时内

100. 下列病历资料中,不能复印的是

- A. 体温单
- B. 护理记录
- C. 医嘱单
- D. 会诊记录
- E. 检查报告

(101~102 题共用题干)

患者,男,35岁,阿米巴痢疾。医嘱:甲硝唑保留灌肠。

101. 灌肠的溶液量不宜超过

- A. 50 ml
- B. 100 ml
- C. 150 ml
- D. 200 ml

E. 500 ml

102. 保留灌肠液应保留的时间是

- A. 5 ~ 10 分钟
- B. 10 ~ 20 分钟
- C. 25 ~ 30 分钟
- D. 35 ~ 45 分钟
- E. 60 分钟以上

(103 ~ 106 题共用题干)

张先生, 60 岁, 因术中失血过多, 医嘱: 输入库存血 1 200 ml。输血后患者出现手术部位渗血较多, 皮肤、黏膜多处可见明显瘀点、瘀斑。

103. 下列有关输入库存血的叙述正确的是

- A. 库存血变质后分两层
- B. 可置于 37 °C 温水中加热后再输入
- C. 取血时应严格“三查七对”
- D. 库存血中的血小板含量较少
- E. 输血前由操作护士一人进行

104. 患者可疑发生了

- A. 空气栓塞
- B. 过敏反应
- C. 出血倾向
- D. 枸橼酸钠中毒
- E. 循环负荷过重

105. 患者出现上述症状的原因主要是

- A. 输血过快
- B. 输血量过多
- C. 库存血保存过久
- D. 血型不合
- E. 血液变质

106. 下列措施正确的是

- A. 酒精湿化吸氧
- B. 静脉滴注碳酸氢钠
- C. 皮下注射肾上腺素 0.5 ~ 1 ml
- D. 再输入一定量的新鲜血

E. 取头低脚高, 左侧卧位

(107 ~ 109 题共用题干)

患者, 女, 25 岁, 低热、乏力、盗汗 2 周, 近日常体重下降明显, 伴呼吸困难、胸痛, 故来诊。经 X 线胸部检查诊断为浸润型肺结核, 收入院抗结核治疗。

107. 患者治愈出院, 对其携带的收音机可采用的消毒方法是

- A. 电离辐射消毒
- B. 高压蒸汽灭菌
- C. 日光暴晒
- D. 环氧乙烷消毒
- E. 紫外线照射消毒

108. 对该患者护士应给予的隔离措施是

- A. 严密隔离
- B. 一般隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 接触性隔离
- E. 昆虫隔离

109. 关于疾病防治, 护士的正确操作应不包括

- A. 患者痰液用漂白粉搅拌, 静置 2 小时后倒掉
- B. 在病室不与患者直接接触时, 护士可不戴口罩
- C. 病室每天用紫外线进行空气消毒
- D. 需密切观察患者用药后有无不良反应
- E. 给予异烟肼、链霉素治疗

(110 ~ 112 题共用题干)

患者, 男, 65 岁, 口腔囊肿术后, 患者一般情况良好, 持续输液, 鼻饲供给营养。

110. 插管过程中, 以下操作哪项是错误的

- A. 核对、解释
- B. 协助患者取半坐卧位
- C. 插至 10 ~ 15 cm, 嘱患者做吞咽动作

- D. 新鲜果汁与牛奶混合后注入
- E. 注入流质饮食后,嘱患者维持原来卧位 20~30 分钟

111. 插管过程中,如果插入不畅,护士应该
- A. 立即拔出胃管
 - B. 嘱患者深呼吸
 - C. 指导患者做吞咽动作
 - D. 左手托起患者下颌部
 - E. 查看胃管是否盘在口咽部,将胃管抽出少许,再小心插入

112. 鼻饲后记录的内容不包括
- A. 鼻饲的时间
 - B. 鼻饲物的种类
 - C. 鼻饲物的量
 - D. 患者的反应
 - E. 鼻饲物的温度

(113~114 题共用题干)

患者,女,32 岁,颅脑损伤后昏迷 1 周,现体温 39.8℃。医嘱:复方氨基比林 2 ml 肌肉注射 st。

113. 护士选择股外侧肌作为注射部位,正确的注射范围是
- A. 大腿外侧,膝关节以上
 - B. 髌关节以下,膝关节以上大腿外侧
 - C. 髌关节以下 10 cm,膝关节以上大腿外侧
 - D. 大腿内侧,膝关节以上 10 cm
 - E. 髌关节以下 10 cm,膝关节以上 10 cm 大腿内侧

114. 肌肉注射时,进针深度为
- A. 针头斜面
 - B. 针梗的 1/4~1/3
 - C. 针梗的 1/3~1/2
 - D. 针梗的 1/2~2/3
 - E. 全部针梗

(115~118 题共用题干)

患者,男,75 岁,咳嗽、咳痰、气喘加重 4 个月,诊断为“慢性阻塞性肺气肿”入院。

115. 为保持病室空气清新,病室应定时开窗通风的时间每次约为
- A. 10 分钟
 - B. 20 分钟
 - C. 30 分钟
 - D. 40 分钟
 - E. 60 分钟

116. 病室的温度应保持在
- A. 14~16℃
 - B. 16~18℃
 - C. 18~22℃
 - D. 22~24℃
 - E. 24~26℃

117. 病房湿度应保持在
- A. 15%~25%
 - B. 30%~40%
 - C. 40%~50%
 - D. 50%~60%
 - E. 60%~70%

118. 若目前病房湿度为 85%,患者可能会出现的情况是
- A. 寒冷不适
 - B. 闷热难受,肾脏负担加重
 - C. 疲惫、焦躁、头痛、耳鸣
 - D. 失眠、血压升高
 - E. 口干舌燥、咽痛、烦渴

(119~120 题共用题干)

陆女士,50 岁,行乳腺癌根治术,患者于下午 14:00 回病房,一般情况尚好。医嘱:哌替啶 50 mg, im, q6 h, prn。

119. 关于此种医嘱的特点,不正确的论述是
- A. 有效时间在 24 小时以上