

# 儿科护理学（中级）资格考试



人民军医出版社

# 儿科护理学（中级）资格考试 模拟试卷一



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

## 专业知识

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 除外哪项，均属于儿科护理学所涉及的范围

- A. 专科护理学
- B. 生理学
- C. 运动学
- D. 社会学
- E. 营养学

2. 最能反映小儿营养情况的重要指标是

- A. 坐高
- B. 头围
- C. 体重
- D. 腰围
- E. 皮下脂肪

3. 以下哪项指标最能反映小儿骨骼发育情况

- A. 下肢长度
- B. 身长
- C. 坐高
- D. 体重
- E. 牙齿数目

4. 对小儿进行体格检查时身体下部测量是指

- A. 髌关节到足底
- B. 耻骨联合上缘到足底
- C. 脐部到足底
- D. 耻骨联合下缘到足底
- E. 髂嵴上缘到足底

5. 护士在评估 1 岁半小儿乳牙数量，正确的是

- A. 8~10 个

B. 12~14 个

C. 14~16 个

D. 16~18 个

E. 18~20 个

6. 小儿生后何时能协调注视物体

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 3 周
- E. 4 个月

7. 小儿正常的体重差异的波动在

- A. 5%左右
- B. 6%左右
- C. 10%左右
- D. 12%左右
- E. 15%左右

8. 违背小儿辅食添加的原则是

- A. 从少量开始
- B. 从细到粗
- C. 小儿患病期间不添加新品种辅食
- D. 由稠到稀
- E. 由一种到多种

9. 符合小儿动作发育规律的是

- A. 由下至上
- B. 由远到近
- C. 由协调到不协调
- D. 由精细动作到粗动作
- E. 由低级向高发展

10. 小儿第一次接种卡介苗的年龄是

- A. 出生后 2~3d
- B. 2 个月以上
- C. 3 个月以上

D. 6 个月以上

E. 1 岁以上

11. 小儿意外事故的最易发生的时期为

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 学龄期

D. 幼儿期

E. 学龄前期

12. 下述哪项是婴儿禁用药物

A. 水合氯醛

B. 苯巴比妥

C. 地西泮（安定）

D. 氯丙嗪

E. 吗啡

13. 某新生儿生理性体重下降常发生在

A. 1 周内

B. 2 周内

C. 4 周内

D. 半年内

E. 一年内

14. 以下哪项是新生儿期中枢神经系统感染最常见的疾病

A. 葡萄球菌脑膜炎

B. 中毒性脑病

C. 大肠埃希菌性脑膜炎

D. 肺炎双球菌性脑膜炎

E. 脑积水

15. 新生儿窒息抢救的最重要步骤是

A. 大量补液

B. 高流量吸氧

C. 药物治疗

D. 建立有效循环

E. 保持呼吸道通畅

16. 新生儿窒息的严重并发症是

A. 新生儿肺炎

B. 新生儿缺氧缺血性脑病

C. 新生儿寒冷损伤综合征

D. 新生儿肺透明膜病

E. 新生儿败血症

17. 新生儿破伤风最典型的临床表现是

A. 惊厥寒战

B. 口吐泡沫，唇周发绀

C. 牙关紧闭，苦笑面容

D. 谵妄躁动

E. 四肢抽动

18. 儿童佝偻病最主要的病因是

A. 营养供应不足

B. 牛奶中钙磷比例不适宜

C. 日光照射不足

D. 生长发育过快

E. 慢性疾病影响

19. 佝偻病患者出现乒乓颅（颅骨软化）临床表现的年龄段是

A. 1~3 个月

B. 3~6 个月

C. 8~9 个月

D. 8~10 个月

E. 1 岁左右

20. 处于生长发育高峰的婴幼儿，给予其维生素 D 的预防量是

A. 200U/天

B. 300~400U/天

C. 400~800U/天

D. 800~1 000U/天

E. 1 万~2 万 U/天

21. 以下哪项是夏季腹泻最常见的病原体

A. 葡萄球菌

B. 柯萨奇病毒

C. 轮状病毒

D. 大肠埃希菌

E. 合胞病毒

22. 等渗性脱水患儿其血钠浓度在

- A.  $<120\text{mmol/L}$   
B.  $120\sim130\text{mmol/L}$   
C.  $130\sim150\text{mmol/L}$   
D.  $>150\text{mmol/L}$   
E.  $>180\text{mmol/L}$
23. 婴幼儿重度脱水时, 第 1 天补液总量为  
A.  $60\sim80\text{ml}$   
B.  $80\sim120\text{ml}$   
C.  $120\sim150\text{ml}$   
D.  $150\sim180\text{ml}$   
E.  $180\sim200\text{ml}$
24. 患儿腹泻输液过程中突然出现惊厥考虑为  
A. 血钙降低  
B. 血钾降低  
C. 高渗性脱水  
D. 低磷血症  
E. 碱中毒
25. 患儿腹泻输液过程中出现腹胀、心音低钝、肌张力下降考虑为  
A. 中毒性肠麻痹  
B. 低钾血症  
C. 肠梗阻  
D. 低磷血症  
E. 低钠血症
26. 引起儿童支气管肺炎最常见的病原体是  
A. 葡萄球菌  
B. 肺炎衣原体  
C. 轮状病毒  
D. 合胞病毒  
E. 肺炎链球菌
27. 心血管畸形最容易发生在胚胎的哪个时期  
A.  $2\sim4$  周  
B.  $2\sim8$  周  
C.  $8\sim12$  周  
D.  $12\sim16$  周  
E.  $16\sim24$  周
28. 以下哪项属于无分流型先天性心脏病的  
A. 房间隔缺损  
B. 二尖瓣狭窄  
C. 三尖瓣关闭不全  
D. 肺动脉狭窄  
E. 法洛四联症
29. 男, 3 岁。发现心脏杂音、全身发绀 3 年半, 活动后突然晕厥、抽搐。晕厥的主要原因是  
A. 癫痫发作  
B. 缺氧发作  
C. 脑积水  
D. 脑栓塞  
E. 病毒性脑膜炎
30. 以下哪项是引起病毒性心肌炎最常见的病毒  
A. 流感病毒  
B. 柯萨奇病毒  
C. 艾柯病毒  
D. 轮状病毒  
E. 合胞病毒
31. 以下哪项对急性肾小球肾炎描述是正确的  
A. 是细菌引起的感染性疾病  
B. 病变主要累及肾小管  
C. 水肿、少尿、血尿、高血压是主要症状  
D. 常见的致病菌是支原体  
E. 以蛋白尿、管型尿为主
32. 以下哪种致病菌与急性肾小球肾炎发病有关  
A. 葡萄球菌  
B. 乙型  $\beta$  溶血性链球菌  
C. 肺炎支原体  
D. 合胞病毒

E. 衣原体

33. 以下哪项不属于单纯性肾病综合征四大特征

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 高度水肿
- D. 高脂血症
- E. 高血压

34. 治疗肾病综合征首选

- A. 呋塞米（速尿）
- B. 利福平
- C. 青霉素
- D. 糖皮质激素
- E. 环磷酰胺

35. 关于儿童急性尿路感染的叙述正确的是

- A. 婴儿期以尿路刺激症状为主
- B. 年长儿下尿路感染时全身症状多明显
- C. 年长儿上尿路感染时可有腰痛及肾区叩击痛
- D. 新生儿多无局部症状
- E. 儿童期以局部症状和全身症状均较严重

36. 女，4岁。查血红蛋白 65g/L，其贫血程度是

- A. 正常
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

37. 新生儿贫血的诊断标准中血红蛋白

- A. <30g/L
- B. <90g/L
- C. <100g/L
- D. <125g/L
- E. <145g/L

38. 护士在给缺铁性贫血患儿口服铁剂时，哪项错误

- A. 可与水果同服，以利于铁剂吸收
- B. 应在两餐之间服药
- C. 使用吸管服药，可避免牙齿染黑
- D. 与牛奶同服可促进铁剂吸收
- E. 大便呈黑色属正常现象，不必停药

39. 缺铁性贫血患儿，其外周血涂片的改变是

- A. 大细胞正色素性
- B. 大细胞低色素性
- C. 小细胞正色素性
- D. 小细胞低色素性
- E. 正细胞正色素性

40. 巨幼细胞性贫血患儿最突出表现是

- A. 面色苍白
- B. 毛发干枯
- C. 消瘦
- D. 肝脾大
- E. 精神神经症状

41. 确诊儿童白血病的主要依据是

- A. 贫血、发热、出血症状明显
- B. 肝、脾、淋巴结肿大
- C. 外周血见原始细胞
- D. 外周血见幼稚粒细胞
- E. 骨髓象原始细胞增生>30%

42. 对血友病患儿进行止血治疗时首选输注

- A. 新鲜冰冻血浆
- B. 白蛋白
- C. 凝血因子Ⅷ浓缩剂
- D. 凝血酶原复合物
- E. 血小板

43. 下述哪种病原体感染，可能引起急性肾小球肾炎发病

- A. 大肠埃希菌
- B. 衣原体
- C. 链球菌
- D. 葡萄球菌

E. 原虫和寄生虫

44. 以下哪项是急性肾小球肾炎患儿恢复正常活动的标准

- A. 红细胞沉降率正常
- B. Addis 计数正常
- C. 水肿消退、血尿消失
- D. 血压正常、肉眼血尿消失
- E. 红细胞镜下每高倍视野 $<10$ 个

45. 肾病综合征治疗的首选药物是

- A. 免疫球蛋白
- B. 青霉素
- C. 利尿药
- D. 肾上腺糖皮质激素
- E. 抗生素

46. 以下哪项不属于单纯性肾病的临床表现

- A. 肉眼血尿
- B. 水肿
- C. 大量蛋白尿
- D. 低蛋白血症
- E. 高脂血症

47. 以下哪项是预防泌尿系感染的措施

- A. 婴儿勤换尿布，便后及时清洗
- B. 幼儿避免穿开裆裤
- C. 根治蛲虫、去除尿道异物
- D. 勤洗澡
- E. 每日大量饮水

48. 以下哪项不属于风湿热的主要临床表现

- A. 关节炎
- B. 舞蹈病
- C. 环形红斑
- D. 皮下小结
- E. 发热

49. 以下哪项不属于过敏性紫癜的临床表现

- A. 皮肤瘀斑
- B. 腹痛便血
- C. 关节疼痛及肿胀

D. 肉眼血尿

E. 血小板减少

50. 哪种反射小儿出生时存在，以后逐渐消失

- A. 跖反射
- B. 直接对光反射
- C. 咽反射
- D. 腹壁反射
- E. 握持反射

51. 以下哪项是化脓性脑膜炎最可靠的诊断依据

- A. 高热、头痛、呕吐
- B. 婴幼儿前囟饱满
- C. 脑脊液蛋白增高，糖降低
- D. 脑脊液中检出病原菌
- E. 脑脊液细胞数增多

52. 化脓性脑膜炎至少要治疗多久

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 4 周
- D. 5 周
- E. 6 周

53. 80%以上的病毒性脑炎的致病菌是

- A. 肠道病毒
- B. 合胞病毒
- C. 轮状病毒
- D. 腮腺炎病毒
- E. 疱疹病毒

54. 吉兰-巴雷综合征患儿最严重的并发症是

- A. 四肢瘫加重
- B. 休克
- C. 呼吸障碍
- D. 营养不良
- E. 压疮

55. 吉兰-巴雷综合征患儿，出现呼吸肌重度麻痹时，护士首先要采取的措施是

- A. 大量补液
- B. 静脉给呼吸兴奋药
- C. 高流量面罩给氧
- D. 雾化给药
- E. 迅速准备气管插管或行气管切开

56. 苯丙酮尿症患儿最突出的临床表现是

- A. 头发呈黄褐色
- B. 皮肤白皙
- C. 智力低下
- D. 尿有鼠臭味
- E. 皮肤湿疹

57. 以下哪种类型结核病在小儿中最常见

- A. 原发型肺结核
- B. 粟粒型肺结核
- C. 结核性脑膜炎
- D. 结核性胸膜炎
- E. 继发性肺结核

58. 结核性脑膜炎晚期最主要的临床表现是

- A. 谵妄烦躁
- B. 昏睡、昏迷
- C. 剧烈头痛、呕吐
- D. 频繁惊厥
- E. 脑膜刺激征阳性

59. 男，5岁。脑脊液压力增高，蛋白增高，白细胞数在  $(50 \sim 500) \times 10^6/L$ ，糖和氯化物同时下降时，多考虑为

- A. 结核性脑膜炎
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 脑积水
- D. 肠道病毒脑膜炎
- E. 脑肿瘤

60. 麻疹早期的特征性体征是

- A. 高热
- B. 上呼吸道感染
- C. 淡红色斑丘疹
- D. 皮肤瘀点

E. 麻疹黏膜斑

61. 麻疹常见的并发症不包括

- A. 肺炎
- B. 喉炎
- C. 脑膜炎
- D. 肺结核加重
- E. 维生素 A 缺乏

62. 麻疹合并肺炎时，有效隔离期是出疹后

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 8 天
- D. 10 天
- E. 15 天

63. 水痘的传染期包括

- A. 潜伏期至结痂
- B. 出疹至痂脱落为止
- C. 出疹前 1~2 天至皮疹全部结痂为止
- D. 前驱期至结痂脱落
- E. 出疹期至痂脱落为止

64. 以下哪种气味是有机磷中毒时呼出的气味

- A. 腐败臭味
- B. 氨臭味
- C. 蒜臭味
- D. 酒精味
- E. 烂苹果味

65. 口服毒物中毒后，最佳的洗胃时间是

- A. 12 小时
- B. 15 小时
- C. 4~6 小时
- D. 7~8 小时
- E. 9~10 小时

66. 以下哪项是引起婴幼儿心力衰竭最常见的原因

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管哮喘

- C. 先天性心脏病
- D. 心包积液
- E. 窒息

67. 患有颅内压增高症的婴儿, 其呕吐特点为

- A. 溢奶
- B. 恶心伴呕吐
- C. 间断性呛奶
- D. 持续性溢奶
- E. 喷射状吐奶

68. 以下哪项是急性呼吸衰竭的最突出表现

- A. 呼吸困难
- B. 口唇发绀
- C. 潮式呼吸
- D. 鼻扇
- E. 反复呼吸暂停

69. 以下哪项不属于呼吸衰竭的治疗原则

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 持续氧气吸入
- C. 记录 24 小时出入量
- D. 改善肺通气及肺循环
- E. 保持水电解质及酸碱平衡

70. 婴儿心脏复苏最佳给药途径是

- A. 静脉滴入
- B. 深静脉插管
- C. 雾化吸入
- D. 心内注射
- E. 舌下含服

二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(71~73 题共用题干)

早产儿, 女, 胎龄 32 周。生后 4 小时出现进行性呼吸困难, 伴呼气时呻吟, 发绀明

显。

71. 首先考虑的诊断是

- A. 新生儿肺炎
- B. 新生儿溶血
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 新生儿黄疸
- E. 新生儿颅内出血

72. 分析该患儿最可能的病因是

- A. 出生后受凉
- B. 吸入胎粪
- C. 早产营养缺乏
- D. 缺乏棕色脂肪
- E. 缺乏肺表面活性物质

73. 护士对该患儿采取最紧急的抢救措施是

- A. 保暖
- B. 纠正酸中毒
- C. 输白蛋白
- D. 持续正压供氧
- E. 使用激素

(74~76 题共用题干)

女, 1 岁。每天腹泻 10 余次, 间断呕吐, 伴口渴、烦躁、尿少。查体: 体温 37.8℃, 皮肤弹性差, 黏膜干燥, 手足稍凉。血生化: 血钠 142mmol/L。

74. 判断患儿脱水的程度及性质是

- A. 腹泻伴轻度高渗性脱水
- B. 腹泻伴中度低渗性脱水
- C. 腹泻伴轻型低渗性脱水
- D. 腹泻伴中度等渗性脱水
- E. 腹泻伴高度等渗性脱水

75. 该患儿体重 10kg, 如需补液, 其第 1 天输液总量为

- A. 800~1 200ml
- B. 1 200~1 500ml
- C. 1 500~1 800ml
- D. 1 800~2 000ml

E. 2500ml

76. 该患儿如需补液，其第 1 天输液选择应选用哪种液体

- A. 等张
- B. 2/3 张
- C. 1/2 张
- D. 1/3 张
- E. 1/5 张

（77～80 题共用题干）

女，11 个月。发热 3 天伴咳喘，有痰。查体：一般情况好，双肺闻及湿啰音，白细胞总数及中性粒细胞增多。X 线胸片示两下肺散在斑片影。

77. 首先考虑的诊断是

- A. 急性支气管炎
- B. 气管炎
- C. 大叶性肺炎
- D. 支气管肺炎
- E. 支气管哮喘

78. 治疗该患儿首选的药物是

- A. 青霉素
- B. 头孢曲松
- C. 头孢拉定
- D. 左氧氟沙星
- E. 氨茶碱

79. 如病情不能得到控制，最可能的并发症是

- A. 肺脓肿
- B. 肺气肿
- C. 心力衰竭
- D. 呼吸困难
- E. 中毒性脑病

80. 一旦出现最常见的并发症，首选的药物或治疗方法是

- A. 气管插管
- B. 糖皮质激素
- C. 洋地黄制剂

D. 血管扩张药

E. 呋塞米（速尿）

（81～86 题共用题干）

女，4 岁。生后半年即出现全身发绀，有蹲距现象和活动后晕厥、抽搐发作。听诊胸骨左缘第 3～4 肋间闻及 II 级收缩期杂音，肺动脉第 2 音减弱。

81. 首先考虑的临床诊断是

- A. 支气管哮喘发作
- B. 病毒性心肌炎
- C. 房间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

82. 为该患儿拍 X 线胸片，会出现的典型的 X 线征象是

- A. 双肺见散在点片状阴影
- B. 梨形心
- C. 右心房右心室大，肺纹理增多
- D. 左心房左心室增大
- E. 肺透明度增高，心影呈靴形

83. 以下哪项是本病最常见的并发症

- A. 心力衰竭
- B. 脑血栓、脑脓肿
- C. 感染性心内膜炎
- D. 心肌炎
- E. 病毒性脑病

84. 患儿出现晕厥发作，其发生机制是

- A. 颅内出血
- B. 直立性低血压
- C. 肺动脉漏斗部的痉挛
- D. 大脑供血不足
- E. 心力衰竭

85. 患儿有晕厥发作，护士应准备静脉注射的药物是

- A. 高渗葡萄糖
- B. 地西泮（安定）

- C. 洋地黄
- D. 普萘洛尔(心得安)
- E. 地高辛

86. 当晕厥发作时, 护士应立即置患儿的体位是

- A. 半卧位
- B. 端坐卧位
- C. 头低足高位
- D. 俯卧位
- E. 膝胸卧位

(87~90 题共用题干)

男, 9 个月, 突然高热、烦躁、频繁呕吐。查体: 体温 39℃, 意识模糊, 眼神呆滞, 颈有抵抗, 前囟隆起。

87. 推测该患儿可能的临床诊断是

- A. 高热惊厥
- B. 颅内感染
- C. 颅内出血
- D. 低钙惊厥
- E. 癫痫发作

88. 以下哪项是出现脑疝先兆的眼部特征

- A. 落日眼
- B. 视物模糊
- C. 对光反射迟钝
- D. 两侧瞳孔不等大
- E. 瞳孔散大

89. 如出现脑疝, 首要的治疗原则是

- A. 应用 20%甘露醇
- B. 应用敏感抗生素
- C. 应用止吐药
- D. 冰敷降温
- E. 补钙

90. 经处理病情平稳, 为明确诊断给予腰穿, 问腰穿后护士应将患儿去枕平卧

- A. 2 小时
- B. 3 小时

- C. 5 小时
- D. 6 小时
- E. 8 小时

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~94 题共用备选答案)

- A. 缓冲力大, 对胃酸中和作用大
- B. 含酪蛋白多
- C. 叶酸、维生素 B<sub>12</sub> 含量少
- D. 以糖为主, 蛋白质偏低
- E. 含各种抗体
- 91. 牛奶
- 92. 米粉
- 93. 人乳
- 94. 羊乳

(95~98 题共用备选答案)

- A. 糖皮质激素
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. X 线胸片右脑门增大
- E. X 线胸片呈“哑铃状”
- 95. 支原体肺炎多选用
- 96. 急性上呼吸道感染
- 97. 肺炎链球菌肺炎首选
- 98. 原发综合征

(99~100 题共用备选答案)

- A. 800~1 200ml
- B. 600~800ml
- C. 300~600ml
- D. 300ml
- E. 200ml
- 99. 婴幼儿少尿的标准是每日尿量 <
- 100. 学龄前儿童少尿的标准是每日尿量 <

## 专业实践能力

一、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 为达到控制传染病的流行的目的，医护人员需完成的预防接种率是

- A. 30%以上
- B. 40%以上
- C. 50%以上
- D. 70%以上
- E. 80%以上

2. 男婴，1 岁。出生时体重 3kg，发育正常，按公式其标准体重、身高应是

- A. 6kg，55cm
- B. 7kg，60cm
- C. 8kg，75cm
- D. 9kg，75cm
- E. 10kg，90cm

3. 婴幼儿禁用的镇静止惊药物是

- A. 吗啡
- B. 溴化钠
- C. 地西洋（安定）
- D. 苯巴比妥
- E. 水合氯醛

4. 小儿最常用的药物剂量计算方法是

- A. 按坐高计算
- B. 按体重计算
- C. 按年龄计算
- D. 成人剂量减半
- E. 按体表面积计算

5. 需要复种卡介苗的儿童，应做的特异试验是

- A. OT 试验

B. 链霉素皮试

C. PPD 试验

D. 卡介苗试验

E. TAT 试验

6. 需要复种卡介苗的儿童，应做的主要检查是

- A. 血红蛋白检查
- B. X 线检查
- C. OT 试验
- D. 痰液结核菌检查
- E. 白细胞数检查

7. 幼儿期小儿最常见的心理行为问题是

- A. 违拗
- B. 遗尿
- C. 依赖母亲
- D. 攻击性行为
- E. 吮手指

8. 以下哪项是婴儿每日每千克体重需水量

- A. 80ml
- B. 120ml
- C. 150ml
- D. 200ml
- E. 250ml

9. 新生儿窒息复苏的第一步是

- A. 复温
- B. 建立呼吸
- C. 药物治疗
- D. 建立有效循环
- E. 保持呼吸道通畅

10. 护士为肺炎患儿采取的体位是

- A. 去枕仰卧位
- B. 俯卧位

- C. 端坐卧位  
D. 左侧卧位  
E. 右侧卧位
11. 支气管哮喘发作时患儿的主要特征为  
A. 窒息  
B. 咳黄脓黏稠痰  
C. 痉挛性咳嗽  
D. 吸气性呼吸困难  
E. 呼气性呼吸困难
12. 年长儿链球菌感染所致的上感可诱发  
A. 肺炎  
B. 脑膜炎  
C. 肺脓肿  
D. 风湿热  
E. 心肌炎
13. 护理发绀型先心病患儿，要注意防止脱水，其目的是  
A. 防止休克  
B. 防止窒息  
C. 防止心力衰竭  
D. 防止血栓栓塞  
E. 防止尿毒症
14. 婴儿期患儿持续发绀最可能的病因是  
A. 房间隔缺损  
B. 室间隔缺损  
C. 二尖瓣狭窄  
D. 法洛四联症  
E. 三尖瓣狭窄
15. 以下哪项是 5 岁小儿正常的血压值  
A. 80/40mmHg  
B. 90/60mmHg  
C. 100/80mmHg  
D. 120/80mmHg  
E. 130/80mmHg
16. 将 2 份生理盐水和 1 份 1.4%碳酸氢钠混合，其张力为  
A. 等张  
B. 1/4 张  
C. 1/3 张  
D. 1/2 张  
E. 2/5 张
17. 母乳喂养的正常小儿粪便特点为  
A. 大便淡黄色、黏稠、无臭味  
B. 大便淡黄色、较稠、有臭味  
C. 大便墨绿色、黏液多、次频、便量少  
D. 大便黄绿色、较稀、每日 4~5 次  
E. 大便金黄色、均匀糊状、无明显臭味
18. 小儿出生后为预防佝偻病，开始服用维生素 D 的时间是  
A. 出生后 1 周起  
B. 出生后 2 周起  
C. 出生后 4 周起  
D. 出生后 3 个月起  
E. 出生后 10 个月起
19. 维生素 D 缺乏性佝偻病患儿初期的主要表现是  
A. 体重不增  
B. 肌肉紧张  
C. 骨骼畸形  
D. 手足搐搦  
E. 神经精神症状
20. 易能引起哮喘发作的食物是  
A. 面食  
B. 猪肉  
C. 鸡肉  
D. 鱼、虾  
E. 蔬菜
21. 以下哪项最可能导致法洛四联症患儿突然晕厥、抽搐  
A. 合并脑血栓  
B. 合并肺炎  
C. 合并脑膜炎

- D. 合并二尖瓣狭窄  
E. 肺动脉漏斗部肌肉痉挛
22. 小儿所特有的能量需要是  
A. 排泄所需  
B. 日常活动所需  
C. 基础代谢所需  
D. 生长发育所需  
E. 消化食物特殊动力所需
23. 婴儿发生心力衰竭时其心率、呼吸频率应大于  
A. 100 次/分, 24 次/分  
B. 120 次/分, 24 次/分  
C. 150 次/分, 30 次/分  
D. 160 次/分, 40 次/分  
E. 180 次/分, 60 次/分
24. 哪个时期维生素 D 缺乏性佝偻病患儿出现“O”形腿或“X”形腿  
A. 4 个月  
B. 6 个月  
C. 9 个月  
D. 10 个月  
E. 12 个月
25. 以下哪项经常导致小儿急性中毒  
A. 错用、过量应用药物  
B. 毒物经呼吸道进入体内  
C. 食物中毒  
D. 脂溶性毒物容易被皮肤黏膜吸收  
E. 以上都是
26. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿最严重的临床表现是  
A. 惊厥  
B. 喉痉挛  
C. 睡眠质量差  
D. 手足搐搦  
E. 面部改变
27. 什么时候新生儿生理性体重下降开始恢复  
A. 6 天左右  
B. 8 天左右  
C. 10 天左右  
D. 14 天左右  
E. 30 天左右
28. 血友病患儿关节积血, 护士最需要关注的关节是  
A. 腕关节  
B. 肘关节  
C. 髋关节  
D. 膝关节  
E. 指关节
29. 为血友病甲患儿首选的止血药物是  
A. 凝血因子 V 浓缩剂  
B. 氨甲环酸  
C. 冰冻血浆  
D. 凝血酶原复合物  
E. 凝血因子 VIII 浓缩剂
30. 缺铁性贫血患儿服用铁剂的最佳时间是  
A. 餐前半小时  
B. 餐后半小时  
C. 临睡前  
D. 晨起时  
E. 两餐之间
31. 用铁剂治疗缺铁性贫血, 显效时最早出现的实验室检查指标是  
A. 红细胞大小正常  
B. 红细胞数上升  
C. 血红蛋白量恢复  
D. 网织红细胞数上升  
E. 红细胞中心浅染恢复
32. 以下哪项急性肾衰竭患儿少尿期死亡的首要原因  
A. 高血钙  
B. 高血钠  
C. 高血钾

- D. 低血钠  
E. 低血钙
33. 以下哪项是新生儿泌尿系感染的特点  
A. 上行感染所致, 以全身症状为主  
B. 血行感染所致, 以全身症状为主  
C. 血行感染所致, 以膀胱刺激症状为主  
D. 上行感染所致, 以尿痛症状为主  
E. 直接扩散所致, 以全身症状为主
34. 急性肾小球肾炎患儿首选护理诊断是  
A. 营养缺乏  
B. 体液过多  
C. 活动无耐力  
D. 有感染的危险  
E. 疼痛
35. 抢救酮症酸中毒患儿要建立 2 条静脉通路, 1 条为纠正脱水酸中毒快速输液用, 另 1 条为滴入胰岛素用, 其滴入方法要求  
A. 小剂量, 均匀滴入  
B. 中等剂量, 快速滴入  
C. 小剂量, 均匀滴入  
D. 大剂量, 均匀滴入  
E. 大剂量, 缓慢滴入
36. 人体正常颈肢反射消失的时间是  
A. 1~2 个月  
B. 2~3 个月  
C. 5~6 个月  
D. 6~7 个月  
E. 10~12 个月
37. 化脓性脑膜炎患儿体温  $>38.5^{\circ}\text{C}$  时, 应用降温措施使体温降至正常的时间是  
A. 30 分钟内  
B. 40 分钟内  
C. 1 小时内  
D. 80 分钟内  
E. 2 小时内
38. 决定治疗先天性甲状腺功能减低症的疗效的因素是  
A. 药物剂量的大小  
B. 治疗开始的早晚  
C. 药物种类的选择  
D. 甲状腺组织的多少  
E. 甲状腺功能减低的程度
39. 严重风湿性心脏病伴心力衰竭的患儿恢复正常活动量所需时间是  
A. 1 个月  
B. 2.5 个月  
C. 4 个月  
D. 5 个月  
E. 6 个月
40. 过敏性紫癜患儿最常出现皮肤紫癜的部位是  
A. 前胸部  
B. 背部  
C. 面部颈部  
D. 下肢、臀部  
E. 下肢足部
41. 皮肤黏膜淋巴结综合征患儿的眼部护理需用  
A. 生理盐水  
B. 蒸馏水  
C. 利福平眼药水  
D. 色甘酸钠滴眼液  
E. 氧氟沙星滴眼液
42. 苯丙酮尿症患儿停用饮食疗法的时间一般为  
A. 1~2 岁  
B. 3~4 岁  
C. 5~6 岁  
D. 7~8 岁  
E. 8~10 岁
43. 诊断急性呼吸衰竭的主要化验检查方法是  
A. 病理切片

- B. 红细胞沉降率测定  
C. 胸部 X 线摄片  
D. 血气分析  
E. 凝血机制检查
44. 一 6 岁水痘患儿，无并发症，隔离期应至出疹后  
A. 1 天  
B. 2 天  
C. 4 天  
D. 6 天  
E. 7 天
45. 以下哪项为结核性脑膜炎中期最主要的体征  
A. 烦躁不安  
B. 睡眠紊乱  
C. 剧烈头痛  
D. 精神呆滞  
E. 脑膜刺激征阳性
46. 男，4 岁。患有疱疹性结膜炎，需做结核菌素试验，其 PPD 液的浓度应选择为  
A. 1U  
B. 1.5U  
C. 2U  
D. 2.5U  
E. 3U
47. 结核中毒典型症状是指  
A. 持续低热、消瘦、盗汗、乏力  
B. 消化不良、消瘦、盗汗、乏力  
C. 恶心、呕吐、消瘦、盗汗、乏力  
D. 不规则低热、消瘦、盗汗、乏力  
E. 食欲缺乏、盗汗、进行性消瘦
48. 患儿发生感染性休克时，抗休克的关键是  
A. 改用大量敏感抗生素  
B. 纠正肾衰竭  
C. 快速扩容纠正酸中毒  
D. 应用大量糖皮质激素  
E. 密切观察生命体征的变化
49. 解除亚硝酸盐中毒的特效解毒药是  
A. 阿托品  
B. 亚甲蓝  
C. 解磷定  
D. 维生素 E  
E. 碳酸氢钠
50. 抢救服用强碱中毒者，可口服的溶液是  
A. 蛋清  
B. 食醋  
C. 碳酸氢钠溶液  
D. 维生素 C 溶液  
E. 氢氧化铝凝胶
51. 急性呼吸衰竭患儿的最突出表现是  
A. 呼吸困难  
B. 口唇发绀  
C. 烦躁  
D. 休克  
E. 反复呼吸暂停
52. 若某个城市发生霍乱，规定上报疫情的时间是  
A. 2 小时内  
B. 3 小时内  
C. 6 小时内  
D. 12 小时内  
E. 24 小时内
53. 在家中早产的患儿出生后 7 天出现烦躁不安，张口困难，面肌痉挛，最可能的发生了  
A. 新生儿脑膜炎  
B. 新生儿败血症  
C. 新生儿溶血  
D. 新生儿破伤风  
E. 新生儿颅内出血
54. 女性，5 岁。临床诊断为“急性淋巴细

胞白血病”。提示中枢神经系统受累的临床表现是

- A. 关节疼痛明显
- B. 牙龈出血
- C. 头痛、呕吐、嗜睡
- D. 食欲缺乏
- E. 肝、脾、淋巴结肿大

55. 女性，3岁半。咳嗽，发热2天。体温37.3℃，呼吸困难，口唇发绀，听诊右肺下部有湿啰音。血气分析显示，动脉氧分压降低，诊断为支气管肺炎，该患儿首选的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 营养不良
- C. 疼痛
- D. 气体交换受损
- E. 潜在并发症：心力衰竭

56. 男，3岁。因腹泻诊断为等渗中度脱水，为其补液应选用的液体为

- A. 等张液
- B. 1/2张液
- C. 1/3张液
- D. 2/3张液
- E. 2/5张液

57. 男，6岁，体重32kg，其能量摄入应按理想体重所需能量减少

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 30%

58. 女婴儿，3个月。体重5kg，人工喂养，每日需8%糖牛奶的量是

- A. 400ml
- B. 550ml
- C. 650ml
- D. 750ml

E. 850ml

59. 女，7岁。以急性肾炎收入院，目前水肿消退，血压正常，肉眼血尿消失，护士指导患儿活动的程度是

- A. 应当绝对卧床
- B. 可恢复正常活动
- C. 可在室内做轻微活动
- D. 可在室内做短时间剧烈活动
- E. 可恢复正常活动，但要避免体育锻炼半年

60. 男，9岁。被诊断为“流行性腮腺炎”6天后，出现表情淡漠，呕吐，颈项强直等临床表现。该患儿最有可能发生的并发症是

- A. 病毒性脑炎
- B. 颅内出血
- C. 脑膜脑炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 中毒性脑病

61. 以下哪项物质在维生素D在代谢中具有抗佝偻病生物活性

- A. 胆固醇
- B. 二羟胆骨化醇
- C. 7-脱氢胆固醇
- D. 25-羟化胆骨化醇
- E. 1, 25-二羟胆骨化醇

62. 男，2岁半。因2天来发热、头痛、呕吐就诊，为明确诊断，需做脑脊液检查，行腰椎穿刺的部位是

- A. 第1—第2腰椎间隙
- B. 第2—第3腰椎间隙
- C. 第3—第4腰椎间隙
- D. 第4—第5腰椎间隙
- E. 第6—第7腰椎间隙

63. 女，5岁。因电击伤造成心跳、呼吸骤停。抢救时，为其做心脏按压的频率是

- A. 40次/分