

精校
東醫寶鑑

上海千頃堂書局印行
劉仲棋題

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

痲瘧

瘧病之源

內經曰夏傷於暑秋為痲瘧○夏暑汗不出者秋成風瘧(內經)○秋善病風瘧又曰晚汗未盡形弱而氣燄穴俞以開發為風瘧(內經)○風成為寒熱又曰困於露風乃生寒熱(內經)○風

氣盛於皮膚之內內不得通外不得泄腠理間則酒熱寒閉則熱而問名曰寒熱(內經)○夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而深痲瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄於外邪氣內行至秋而發為瘧也(保命)○瘧之為病以暑舍於營衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在於陰則發寒並則病作離則病止作止故有時在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日或在頭項或在背脊或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽則一也(東垣)○大法風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂開其汗而不泄故也(丹心)○病氣如痲瘧人之狀又曰瘧有痲瘧之狀在傷寒久則為壞證在內傷久則為勞瘵然則宜美疾哉(入門)

瘧疾形證

瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓顙腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷(內經)○夫陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓

顙巨陽虛則腰背痛項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲飲也(內經)○夫瘧之始發也陽氣並於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復並於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘧氣者並於陽則陽勝並於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱(內經)○衛虛則先寒慄虛則先熱而渴邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等(入門)○人之榮衛晝行於陽(陽則表也)夜行於陰(陰則裏也)榮衛行到病所不通乃作寒戰鼓振頭顙中外皆寒腰脊俱痛此邪氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷煩滿欲吐自汗此邪氣發於外也(丹心)

脈法

瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之弦遲者宜溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之(要畧)○瘧脈自弦微則為虛代散則死(脈經)○瘧脈自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷(脈訣)○瘧脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而

無力似手不強然而必於虛數之中見弦弦但不搏手耳細察可也(丹心)○弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力為久瘧(醫鑑)○瘧脈遲緩者病自愈(回春)

寒熱先後

瘧先寒而後熱者由夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒淒之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病

以時作名曰寒瘧(內經)○先熱而後寒者由先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧(內經)○其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘵瘵謂熱

也(內經)

寒熱往來

病有洒淅惡寒而復發寒者何也曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之何謂陽不足假令寸脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒何謂陰不足假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下

陷入陰中則發熱也(仲景)○陽微則惡寒陰微則發熱大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰氣上入陽中則惡寒(仲景)○陽不足則陰邪出表而與陽爭乃陰勝而為寒也陰

不足則陽邪入裏而與陰爭乃陽勝而為熱也若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏則寒熱相等往往來而問作也(入

門)瘧者少陽也少陽者東方之氣也逆行則發寒順行則發熱故分之氣異往來不定也(東垣)○身後為太陽太陽者膀胱水寒也身前為陽明陽明者大腸金燥也少陽之邪在其中近後膀胱水

則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也(東垣)○甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣(直指)

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外因秋遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日

作(內經)○衛氣與邪相並則病作與邪相離則病休其並於陰則寒並於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而並合則復病也(綱目)○其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原也

其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也(內經)○時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也曰其間日者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者

陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴(內經)○三日一發者受病一年間日一發者受病半年連日發者受病一月二日連發住一日者氣血俱受病也又曰三日一發陰經受病也最重(丹心)○陽

為府邪淺與榮衛並行一日一發○陰為藏邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積乃發或三四日一發久則必為瘧母(入門)

瘧發有晝夜早晏之異

帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一

理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日下至臍骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也(內經)○陽為晝發邪淺榮衛晝行背與脊故也○陰為夜發邪深榮衛夜行胸與腹故也○陽為子時

移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升散（入門）○從卯至午發者邪在外也從午至酉發者邪在內也從酉至子發或至寅發者知邪在血分也（保命）

六經瘧

證各殊在太陽經者謂之寒瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之風瘧

治多和之此三陽受病皆謂暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者則不分

三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前此乃傷之重者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧（保命）○傷寒餘熱未淨重感於寒而變瘧名曰溫瘧亦曰風瘧此為傷寒壞病其證先熱後寒（入門）

○瘧屬三陽宜汗宜吐瘧屬三陰宜下宜和宜溫（正傳）○太陽瘧宜桂枝湯○少陽瘧宜柴胡桂枝湯○陽明瘧宜白虎湯○太陰瘧宜桂枝湯○少陰瘧宜麻黃湯○厥陰瘧宜芍藥湯○瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧（保命）

明瘧宜人參白虎湯○瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧（保命）○瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧（保命）○瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧（保命）

石膏湯三陽合病宜桂枝黃芩湯以和之（保命）

桂枝羌活湯治太陽瘧自汗頭項痛腰脊強桂枝羌活防風甘草各一錢半右剉作一貼水煎服（綱目）

麻黃羌活湯治太陽瘧無汗即前方去桂枝加麻黃也剉法服法同上（綱目）

柴胡桂枝湯治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五分右剉一貼入薑三棗二水煎服（入門）

柴胡加桂湯治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右剉作一貼入薑三棗二水煎服（入門）

白虎桂枝湯溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解此藥主之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一合右剉作一貼水煎服（正傳）○一名加減桂枝湯

麻黃白朮湯治風瘧麻黃桂枝青皮陳皮川芎白芷半夏夏竈紫蘇葉赤茯苓白朮桔梗細辛檳榔甘草各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服（直指）

柴胡四物湯治三陰溫瘧或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當歸赤芍藥各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服

桂枝芍藥湯治瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各二錢

右挫作一貼水煎服（保命）

煎服（保命）

桂枝石膏湯 治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石膏知母各三錢

桂枝黃芩湯 服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽陽明少陽合病也宜用此和之柴胡二錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服（保命）

瘧晝發夜發宜分治 氣虛晝發宜六君子湯（方見痰門）補中益氣湯（方見內傷）加半夏黃芩○血虛夜發宜柴胡四物湯（方見上）桃仁承氣湯（方見寒門）麻黃黃芩湯柴胡芍歸湯（諸

方）

麻黃黃芩湯 治夜發瘧麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢半桂心一錢桃仁十五枚右剉作一貼水煎服

血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也（綱目）

柴胡芍歸湯 治夜發陰瘧引出陽分而散後服人參截瘧飲止之柴胡乾葛川芎各一錢桔梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎

服（回春）

諸瘧證治 瘧有風瘧寒瘧熱瘧濕瘧痰瘧食瘧勞瘧鬼瘧疫瘧瘧瘵瘧癰瘧老瘧（諸方）

風瘧 自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯無汗則宜散邪湯有汗則宜正氣湯（入門）

寒瘧 自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯（方見寒門）交解飲果附湯草果飲柴胡桂薑湯○一名北瘧（入門）

熱瘧 因暑勝熱多得之一名瘧瘵亦曰暑瘧宜人參白虎湯柴胡湯（二方見寒門）柴胡知母湯爭功散龍虎湯（入門）

濕瘧 因冒暑雨濕汗出淋漓得之寒熱相半小便不利宜五苓散（方見寒門）加蒼朮川芎羌活（入門）

痰瘧 因外感內傷鬱聚成痰頭痛胸悶吐食嘔沫甚則昏迷卒倒宜柴陳湯加草果或四散飲冷附湯久不止以露薑飲截之（入門）○有人忽得瘧疾嘔吐異常以二陳湯（方見痰門）加人參縮砂倍用白

豆蔻進一二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能清能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也（直指）

食瘧 一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱熱已復寒寒熱交併苦飢而不能食食則吐痰經曰寒熱善飢而不能食食已支滿腹脹病以日作名曰胃瘧是也宜平陳湯加枳實白朮山查子神麴青

皮或清脾飲小清脾湯又二陳湯加青皮檳榔縮砂白豆蔻亦佳(諸方)

勞瘧

即久瘧也寒熱微熾寒中有熱熱中有寒最難調治由表裏俱虛真氣未復疾雖暫止小勞復來經年不差宜芎歸龍甲散常山飲五勞丸六和湯烏頭七裏湯露薑養胃湯十將軍丸一補一發丹辰砂丸養胃丹(諸方)○久瘧屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷寒戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯(方見內傷)諸證悉愈若投清脾散瘧多致不起(醫鑒)

鬼瘧

因感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖宜辟邪丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻中(入門)

疫瘧

一方長幼相似或染時行變成寒熱須參運氣用藥宜不換金正氣散(方見寒門)如意丹五瘟丹瘧疽丸(三方見瘟疫)

瘴瘧

挾山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷困發狂或啞作寒作熱作有作無南方多此宜雙解飲子地龍飲羌活蒼朮湯瘴疽丸(方見疽門)觀音丸(諸方)

瘧瘧

蓋老瘧也以其隔三日一發纏綿不去也(綱目)○三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經瘧也作於寅申巳亥者厥陰經瘧也作於辰戌丑未日者太陰經瘧也瘧得於暑當以汗解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆(丹心)○老瘧係風暑之邪入在陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻劑思非所宜(丹心)○若病感極深雖得大汗所感之邪必自藏傳傳出至府其發無時必亂而失期若發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸趨早亦是佳兆故治此病春夏為易秋冬為難非有他也以汗之難易為優劣也(丹心)○凡瘧經年不差謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛乃瘧母也雖內虛非常山檳榔決不能除但須製熱則不損胃老瘧丸是也血虛者宜藍甲丸有水癖者暫用消癖丸以補脾化痰湯藥輔之且量虛實用老瘧飲(入門)○老瘧宜七裏湯藍甲飲子參歸藍甲散秘方清脾丸經效瘧丹黃甲丸

散邪湯

治風瘧初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荆芥紫蘇葉羌活各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三葱白三莖煎露一宿早晨溫服(醫鑒)

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘草各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服(醫鑒)

交解湯

治寒瘧即雙解飲子也(方見下)

果附湯

治脾寒瘧疾面青振寒草果附子炮各二錢半右剉作一貼入薑七棗二水煎服(入門)

草果飲 治寒瘧草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉
甘草各一錢右剉作一貼水煎服(直指)

柴胡桂薑湯 治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天
花粉黃芩各一錢乾薑甘草各八分右剉作一貼水煎服(入門)

柴胡知母湯 治熱瘧及瘰癧柴胡知母各一錢半蒼朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘草炙
七分右剉作一貼入薑三梅二水煎清晨服午前又一服久瘧加人參當歸(節齋)

爭功散 治熱瘧多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔地骨皮甘草各一錢蟬退二七個
右剉作一貼入桃柳枝各五寸煎服未效加過路黃藤五寸同煎服(得效)

龍虎湯 治熱瘧火盛舌卷唇焦鼻如煙熏六脉洪緊石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母
黃柏各一錢梔子八分半夏七分粳米百粒右剉作一貼入薑三棗二水煎服(醫鑒)

柴陳湯 治瘧瘧柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤茯苓各一
錢甘草五分右剉作一貼薑三棗二水煎服(入門)

四獸飲 治七情瘧疾五藏氣虛瘧久不已人參白朮白茯苓陳皮半夏草果甘草烏梅生薑大棗各一錢
右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包裏水浸濕慢火烘香熟取出水煎服未發前連進數服

(即效)

冷附湯 瘧疾無過是痰實而脾胃弱停於胸膈所以五更冷服使藥下達壯脾胃去痰實也大附子
一個炮去皮臍右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一宿五更初冷服(得效)

露薑飲 治瘧瘧生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約明日當發隔夜安排將
紗片蓋露一宿五更初澄者一上飲之或有痰吐任之即安(得效)

平陳湯 治食瘧蒼朮半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓各一錢三
分半甘草七分右剉一貼薑三棗二水煎服(入門)

清脾飲 治食瘧柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚朴青皮各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二
水煎服○此方乃小柴胡平胃二陳合而為一也一方加常山二錢煎之露服五更截瘧令人不

吐為妙○一名
清脾湯(入門)

小清脾湯 治胃瘧厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑各一錢草
果甘草各五分右剉作一貼薑三棗二煎服(得效)

芎歸鱉甲散 治勞瘧鱉甲二錢川芎當歸赤茯苓赤芍藥半夏陳皮青皮
各一錢烏梅一個右剉作一貼入薑五棗二水煎服(入門)

常山飲 治勞瘧常山知母草果各一錢半良薑一錢烏梅肉廿
分右剉作一貼入薑五棗二水煎服(入門)

五勞丸

治瘰癧久不愈常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅檳榔柴胡各一錢

六和湯

治瘰癧久不愈常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅檳榔柴胡各一錢

烏頭七葉湯

治瘰癧久不愈常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅檳榔柴胡各一錢

露薑養胃湯

治久瘰癧三五日一發者先以生薑四兩搗取自然汁露一宿次早將人參養

十將軍丸

治久瘰癧及瘰癧母續砂檳榔常山草果各二兩三錢蓬朮青皮陳皮烏梅半夏各一兩右先將常

白湯下三四十九丸日二服

一補一發丹

治久瘰癧內傷挾外感間發內治瘰癧外發汗赤伏苓一兩半夏陳皮柴胡黃芩蒼

辰砂丸

治久瘰癧不損元氣辰砂阿膠真者各一兩右研勻稀米

養胃丹

兩甘草炙五錢烏梅四十九個取肉右為末淡薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五十七丸

辟邪丹

治瘰癧瘰癧菜豆雄黑豆各四十九粒信硫半錢另研黃丹一錢朱砂二錢右為末滴水勻分

雄朱丹

再研勻麝糊和勻作丸少壯人梧子大老人黃豆大小兒菜豆大雄黃朱砂為衣晒乾收貯臨發

五更面東井水下一丸(入門二名瘰癧丹(醫鑒))

雙解飲子

治瘰癧瘰癧及寒瘰癧神效肉豆蔻草豆蔻各二個一個煨一個生厚朴二寸一寸薑汁浸炙一寸生

心溫服(局方)〇一名交

地龍飲

治瘰癧瘰癧大熱煩躁生地龍大者三條研細入薑汁薄荷

羌活蒼朮湯

治感冒風瘰癧成寒熱瘰癧羌活一錢半蒼朮柴胡黃芩枳實橘紅

觀音丸 治瘰癧半夏生烏梅肉母丁香巴豆肉各十枚晒右為末薑汁糊丸麻子大每五丸臨卧冷水下有人於海角遇白衣人授之因名焉(直指)

老瘡丸 治瘡久不差腹痛有母與上十將軍丸同而常山草果各二兩餘八味各一兩制法服法並同上(入門)

驚甲丸 治瘡瘰癧有瘰癧久不差驚甲醋煮一兩三稜蓬朮香附子青皮桃仁紅花神麴麥芽海粉各五錢右為末醋糊作丸梧子大白湯下五十七丸(入門)○一名瘰癧母丸(丹心)○加芎歸赤芍藥治

夜發瘰癧名陰瘰癧丸(入門)

消癖丸 治瘰癧滿年經汗吐下禁衛虧損邪氣伏藏脇間結為瘰癧腹脇堅痛名曰瘰母○花炒朱砂各等分右為末蜜丸小豆大每十丸粟湯下去癖須用芫花大戟破水之劑(得效)○一名芫花丸

(入門)

老瘡飲 治老瘡結成癰癖在腹脇諸藥不愈蒼朮草果桔梗青皮陳皮良薑各七分白芷赤茯苓半夏枳殼桂心乾薑甘草各五分紫蘇葉川芎各四分右剉作一貼入鹽少許水煎空心服(入門)○一名瘰癧飲

(醫鑒)

七棗湯 治五藏氣虛陰陽相勝作為瘰癧不開遠近悉主之附子一個炮製以鹽水浸再炮如此七次去皮臍右剉作一貼入薑七棗七水一椀煎至半空心溫服仍吃棗三五枚(得效)

驚甲飲子 治老瘰癧腹中結癰瘰癧名曰瘰癧母薑甲二錢白朮黃芩草果檳榔川芎陳皮厚朴白芍藥各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服(綱目)

復歸驚甲飲 治老瘰癧腹脇有塊成瘰癧母薑甲醋煮一錢三分黃芪蜜水炒青皮當歸白茯苓白朮厚朴川芎香附子各八分人參縮砂山檀子枳實各五分甘草三分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服(綱目)

水煎空心服(回春)

祕方清脾飲 治瘰癧三日一發或十日一發白朮一兩半半夏青皮黃芩各一兩人參檳榔草果蓬朮厚朴各五錢薑黃甘草各三錢右為末飯丸梧子大白湯下六七十丸(丹心)

經效瘰癧丹 治瘰癧結癖寒熱無已真阿魏雄黃各二錢半朱砂一錢半右沸湯泡阿魏研雄朱為末和勻麝香和丸梧子大每一丸人參湯冷服空心瘰癧桃仁煎湯冷服臨發磨一丸付口鼻畔(直指)

(指)

黃甲丸 治瘰癧母成塊久不愈朱砂阿魏穿山甲酥炙獨柳各五錢雄黃木香各二錢

瘧寒熱不歇有根
瘧之寒熱不歇者有根在也根者何曰飲曰水曰腹脹而痛者為之攻下其水去其病根則寒熱自解所以瘧劑多用常山蓋水在上則吐之水中下則亦能破其癖而

敗血著毒隨證而疏利之則寒熱自除矣○凡瘧皆因停蓋黃水或於腸間結癖惟癖為能生寒熱若取下毒水去其病根則寒熱自解所以瘧劑多用常山蓋水在上則吐之水中下則亦能破其癖而

寒熱似瘧
帝曰大熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有

多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄成其之節瘧亦同法(內經)○感冒之人忽覺毛寒股慄百骸鼓撼嘔不能食未幾轉而發熱皆似瘧證不必脉弦但隨證施治熱多小柴胡湯寒多人參養胃湯和解之內傷虛者補中益氣湯(方見內傷)加山查麥芽白豆蔻扶脾

自止矣(入門)
瘧疾治法
內經主於暑風局方主於傷食丹溪主於痰雖三因雜至錯亂氣血然捷徑以祛暑消痰為要通

用二陳湯(方見痰門)○無汗加葛根柴胡氣虛加參術熱甚加芩連寒多加草果口渴加烏梅(入門)○寒瘧非草果厚朴不能溫散熱瘧非柴胡黃芩不能清解陽瘧無汗須用柴胡蒼朮乾葛陰瘧無汗須用柴胡升麻川芎汗多須用白朮烏梅以斂之(入門)○先熱後寒宜小柴胡湯先寒後熱宜

柴胡加桂湯多熱但熱宜白虎桂枝湯多寒但寒宜柴胡桂枝湯(綱目)○瘧瘧熱多者投以半冷半熱解散分陰陽藏寒熱之劑次以抵截之藥則瘧瘧去而疾愈矣須令慎飲食謹起居則無復攻之患矣(得效)○桂枝湯治太陽白虎湯治陽明小柴胡湯治少陽意甚明顯揀疾合二陳湯食積合平胃散

尿澀合五苓散便閉合大柴胡湯無汗加乾葛蒼朮有汗加黃耆白朮夜發加桃仁赤芍藥日久加常山檳榔吐之治瘧之法盡矣(入門)

柴平湯
治諸瘧柴胡蒼朮各二錢厚朴陳皮半夏黃芩各一錢人參甘草各五分右剉入薑三棗二梅一煎服○一名平胡飲子(入門)

草果平胃散
治脾虛作瘧不問寒熱先後宜服蒼朮二錢厚朴陳皮青皮大腹皮檳榔草果各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服(得效)

加減清脾湯
治諸瘧即小柴胡湯與人參養胃湯合和也寒多熱少多用養胃湯熱多寒少多用小柴胡湯(一方並見寒門)寒熱白則平用每貼入薑五棗二桃柳枝各二寸水煎空(得效)

四將軍飲
治瘧作時仆厥微厥不省是中心抑鬱陰陽交戰所致宜服此附子一兩炮訶子四個煨去核陳皮四個全者甘草四分炙右剉分作二貼每貼入薑棗各七水煎漸漸灌下四服頓甦(得效)

效一

驅瘧湯

治諸瘧久瘧草果青皮陳皮人參赤茯苓半夏厚朴蒼朮白朮檳榔各一錢良薑甘草各五分右剉作一貼入薑五棗二枚一水煎服(直指)

驅邪湯

治諸瘧柴胡二錢白朮一錢半乾薑一錢三分蒼朮一錢陳皮七分甘草五分右剉作一貼水煎服空心(必用)○一名柴胡二木湯(俗方)

人侵竹瀝飲

治虛瘧昏倦汗多痰盛舌大語澀脈虛無力白伏苓人參白朮當歸生地黃酸棗仁炒麥門冬知母陳皮白芍藥各一錢甘草三分右剉作一貼入棗二枚一水煎調竹瀝薑汁服(回春)

春一

治瘧須用分陰陽之藥

瘧疾者陰陽交爭寒熱互作用藥須半生半熟半冷半熱乃收十全之功○該云無瘧不成瘧蓋半生半熟所以分陰陽解寒熱也(得效)

知瘧將差

少陽證可知解者寒熱日不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之於晏晏移之於早氣移之於血血移之於氣是邪無可容之地知可解也(海藏)○若移時或早或晚是邪無容地

瘧將差也

(醫鑒)

截瘧法

凡瘧數發之後便宜截而除之久則中氣虛弱病邪已深而難治世有砒丹等截藥大毒不可輕用(正傳)○若用截藥吐出血膠水者瘧自愈也不可一二日早截早則邪氣閉塞而成壞證又不可

遲截遲則元氣衰憊而成虛怯當在三四日就截為好須待熱退身涼方可飲食也切不可帶熱飲食恐不消而成痞瘕散成鼓者有之矣(回春)○凡瘧須分利陰陽柴苓湯(方見寒門)最效甚者截而

除之不二飲勝金丸之類截之不愈乃氣大虛要扶胃氣為本當薑養胃湯養胃丹之類(方見上)又有經歲久瘧汗吐下不愈榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為癥瘕謂之瘧母瘵瘵飲黃甲丸之類(方見

上○醫鑒)○在陰分者用藥截起陽分方可用截方(丹心)○截瘧宜截瘧常山飲截瘧七寶飲截瘧飲子人參截瘧飲鬼哭丹勝金丹參歸養榮湯(諸方)

截瘧常山飲

常山草果檳榔知母烏梅穿山甲炮甘草炙各一錢右剉作一貼酒水相半煎露一宿臨發日早晨溫服得吐為順(正傳)

截瘧七寶飲

常山陳皮青皮檳榔草果厚朴甘草各一錢右剉作一貼酒水相半八釐五梅二同煎露一宿早晨溫服必煩吐而愈(正傳)○一名七寶湯(易簡)

截瘧飲子

治久瘧不愈一服便差永不發如神常山一錢半檳榔一錢丁香半錢烏梅一個右剉作一貼好酒一盞浸一宿臨發日清晨溫服○即正傳截瘧方也(正傳)

夏夜瘧火虛人截瘧宜用一切瘧並可截人參白朮白茯苓當歸青皮厚朴柴胡黃芩知母常山酒浸

烏梅下藥切忌雞魚豆腐食熱物(回春)

鬼哭丹

治疫癘常山一斤劉醋浸春五夏三秋七冬十日曬乾檳榔各四兩半夏貝母各二兩右為末雞子清和麪入藥末拌勻作丸梧子大每三十丸隔夜臨睡冷酒吞下次日早再服(丹心)

勝金丹

治諸癘久不愈可截之常山四兩酒蒸曬乾檳榔一兩為末醋和糊丸菜豆大於隔夜臨睡時取三十丸冷酒吞下至次日早晨取十五丸冷酒吞下忌食一切熱羹湯粥(局方)

不二飲

治諸癘疾一劑截住神效雞心檳榔要一雌一雄若重二錢則餘藥各二錢常山知母貝母各等分右對作一貼酒一鐘煎至八分不可過熟熱則不效露一宿曉發日五更溫服勿令婦人煎藥

(醫鑒) 〇一名止癘散(十三方)

勝金丸

治一切癘能截去常山四兩酒浸一宿曬乾蒼朮泔浸曬檳榔草果各二兩右為末將浸常山餘酒煮糊和丸梧子大每服五十九丸前一日臨臥時溫酒送下便臥至當發日雞鳴時服七十九丸忌

生冷熱物(醫鑒)

復歸養榮湯

瘡疾截住後以此調養氣血人參白朮白茯苓當歸陳皮縮砂厚朴山藥蓮肉白芍藥熟地黃甘草各八分右對作一貼入棗二水煎服(回春)

穰法

宜用神仙碧霞丹斷癘如聖丸治一切癘(諸方)

神仙碧霞丹

東方巴豆去皮油別研〇南方官桂別末〇中央雄黃別研〇西方白礬別研〇北方青黛別研〇右各三錢五月五日早朝修治各盛鹽依方排定勿令貓犬婦人見之至其日午時

取五家糶夫和勻丸如榛子大令患者綿裹一丸當發日早朝塞於男左女右鼻中仍清靜將息勿雜飲食(類聚)

斷癘如聖丸

信砒二錢大蜘蛛三個雄黑豆四十九粒右為末滴水丸如芡實大如來日發今夜北斗下先獻過次早以綿裹一丸於男左女右耳內塞之立愈如神一丸可救二人(河間)

禁忌法

凡癘大忌飽食遇發日食飽病愈加重(正傳)〇凡癘發時切不可帶熱飲食恐不消而成痞塊也(回春)〇凡癘方來與正發不可服藥服藥在於未發兩時之先否則病交爭轉為深害〇服藥

當於未發以前兩時之先或遇發日凌晨空心與服(直指)〇仍節飲食避風寒遠酒色慎起居無不愈(丹心)〇患癘人切忌食猪肉牛肉必再發(本草)

難治不治證

大凡陽癘易治陰癘難治(入門)〇久癘而復作虛浮不食者未之有瘳(得效)〇癘病久腰脊強急瘕瘕者不可治(醫鑒)〇寒熱脫形而脉堅搏是為逆死不治(靈樞)

單方

凡十九種有脾寒丹

牛膝 治老瘡久不愈取肥大牛膝一握對酒水相半煎服三劑差(本草)

茵陳 治瘴瘧煎湯服之又煮養作羹並可食之(本草)

葛根 瘧瘧取一兩煎湯服之(本草)

麻黃 治溫瘧無汗煎湯服發汗差(本草)

知母 主熱瘧煎湯服之良(本草)

半夏 治瘧瘧取一兩煎湯和薑汁服之(本草)

松蘿 瘧瘧煎湯服可為吐痰(本草)

蛇蛻 主瘧瘧發日取皮塞兩耳又手持少許良(本草)

鱉甲 主溫瘧老瘧取甲炙為末每二錢溫酒調下連三服無不瘳(本草)

蜈蚣 主溫瘧瘧瘧灸為末調溫酒服半錢(本草)

鍼灸法 瘧之旦發也陰陽之旦移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時豎求其處審候見之在經絡

者先刺之○久瘧不愈大顛先針後灸三七壯或云第三骨節○諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之○凡瘧取間使為妙○瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用針(綱目)

瘟疫

瘟疫之因 內經曰冬傷於寒春必溫病○冬不藏精者春必病溫(內經)○斯疾之召或溝渠不泄穢惡不修熏蒸而成者或地多死氣鬱發而成者或官吏任抑怨譴而成之者世謂獄溫場溫墓溫廟溫

社溫山溫海溫家溫窻溫殿溫天溫地溫等不可不究(三因)○疫氣之發大則流行天下次則一方

次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發有勝有復還正退位之所致也(正傳)○凡時行病者春應暖而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無長幼

鼠婦 主寒熱瘧取三枚研和溫酒服小兒尤良(本草)

白葵花 主瘧瘧取花陰乾搗為末酒調服一錢(本草)

烏梅 主熱瘧煩渴煮湯飲(本草)

虎頭骨 治溫瘧瘧瘧黃為末溫酒下二錢又取肉煮食之又取皮覆身上(本草)

狸糞 主鬼瘧瘧瘧和酒服又煮肉食之又頭骨亦主瘧瘧用如虎骨法(本草)

狐肉 主寒熱瘧瘧取五藏及腸治如食法和五味煮食之良(本草)

燕屎 治瘧瘧取尿二錢和酒一升盛枕中令病人於發日朝兩手捧枕當鼻下熏氣妙(本草)

夜明砂 主瘧瘧瘧瘧也治五瘧瘧瘧為末每取一錢冷茶調下立效(本草)

小蒜 治瘧瘧取蒜研極爛和黃丹作丸梧子大每七丸桃柳枝煎湯吞下名脾寒丹(類聚)

也(類)乃為厲爾若天地有不正之氣鬼厲依而為祟楊元操云謂離其鬼厲之氣不知何經之動也亦具義

瘟疫形證

冬令寒反暖春發溫疫其證發熱腰痛強急脚縮不伸肝中欲折目中生花或瀉瀉增寒復熱○春令暖反涼夏發燥疫其證身體戰掉不能自禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶○夏令熱反寒秋發寒疫其證頭重頸直皮肉強痺或逆而結核起於咽喉頸項之側布熱毒於皮膚分肉之中○秋令涼反陰兩冬發溼疫其證乍寒乍熱損傷肺氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣(三因)○感四時不正之氣使人痰涎壅盛煩熱頭疼身痛增寒壯熱項強睛疼或飲食如常起居依舊甚至聲啞或赤眼口瘡大小腮腫喉痺咳嗽稠粘噴嚏(醫鑒)

脉法

尺膚熱甚脉盛躁者病溫也(靈樞)○時疫之脉無定據隨時審思乃得未可輕議(得效)○陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沉之散溼惟有溫病脉散諸經各隨所在不可指名(脉訣)○陽脉濡弱陰脉弦緊更遇溫氣變為溫疫○溫病二三日體熱腹滿頭痛飲食如故脉直而疾八日死○溫病四五日頭痛腹滿而吐脉來細而強十二日死○溫病八九日頭身不痛目不赤色不變而反利脉來澀按之不足舉時大心下堅十七日死○溫病汗不出出不至足者死○厥逆汗自出脉堅強急者生虛軟者死(脉法)○溫病癰瘰大熱脉細小者死○溫病下利腹中痛甚者死(醫鑒)○熱病得汗脉安靜者生躁急者死及大熱不去者亦死○熱病七八日當汗反不得汗脉絕者死(醫鑒)○熱病脉靜汗已出脉盈一逆也死不治(靈樞)

瘟疫治法

丹心○溫熱病者夏至前發為溫病夏至後發為熱病謂之伏氣傷寒所謂冬傷於寒春必病溫是也(丹心)○寒暄不時人多疾疫(得效)○衆人病一般者是天行時疫治有三法宜補宜散宜降

湯陽明升麻葛根湯(一方並見寒門)○加減治之(正傳)○春發溫疫宜葛根解肌湯夏發燥疫宜調中湯秋發寒疫宜蒼朮白虎湯(方見暑門)○冬發溼疫宜甘桔湯(方見咽喉)○表證用荊防敗毒散半表裏證用小柴胡湯裏證用大柴胡湯(方見寒門)○宜補宜散宜降用人中黃丸(入門)○溫病初證未端的先以敗毒散治之看歸在何經隨經施治(正傳)○九味羌活湯治瘟疫初感一二日間服之取效如神(方見寒門)○正傳○又有大頭瘟蝦蟇瘟鶴瘟別有條在下○瘟疫宜用聖散子十神

湯柴胡升麻湯解肌湯香蘇散芍芷香蘇散(方見寒門)○十味羌蘇散雙解散(方見寒門)○清熱解毒散加味敗毒散神授太乙散五瘟丹茵陳丸人中黃丸如意丹黑奴丸(諸方)

葛根解肌湯

治春疫發熱而渴葛根三錢麻黃黃芩各二錢芍藥一錢半桂枝一錢甘草八分右剉作一貼入薑三棗二水煎服(入門)

調中湯

治夏發燥疫口乾咽塞大黃一錢半黃芩芍藥葛根桔梗赤茯苓紫本白朮甘草各一錢右剉作一貼水煎服(活人)

伏苓藥本白朮甘草

各一錢右剉作一貼水煎服(活人)

荆防敗毒散

治瘟疫及大頭瘟羌活獨活柴胡前胡赤茯苓人參枳殼桔梗
川芎荆芥防風各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服(得效)

聖散子

治疫癘流行不問陰陽表裏連服取差又治風溫溼溫等證草豆蔻煨猪苓石菖蒲赤茯苓良薑
獨活赤芍藥附子麻黃厚朴桑本枳殼柴胡澤瀉細辛防風白木藿香半夏吳茱萸蒼朮甘草各

五分到作一貼薑三棗二水煎服(活人)○平
朝煮一釜老幼各飲一盃則時氣不入(活人)

十神湯

治時令不正瘟疫妄行葛根二錢赤芍約升麻白芷川芎陳皮麻黃紫蘇葉香附子甘草各一錢
右剉作一貼入薑五葱白二煎服(正傳)○此方乃升麻葛根湯合芍芷香蘇散加麻黃發汗之

劑也(入門)

柴胡升麻湯

治時行瘟疫頭痛壯熱柴胡前胡葛根赤芍藥荆芥石膏各一錢桑白皮
黃芩各七分升麻五分右剉作一貼入薑三豆豉十粒水煎服(入門)

清熱解肌湯

治天行瘟疫頭痛壯熱葛根三錢黃芩赤芍藥各一錢半甘
草一錢右剉作一貼水煎服(丹心)一名解肌湯(得效)

香蘇散

治四時瘟疫香附子三錢紫蘇葉二錢半陳皮一錢半蒼朮甘草各一錢右剉作一貼入薑三葱
白二水煎服(得效)○昔有白髮老人授此方與一富人家令其合施城中大疫病者服此皆愈

疫鬼問富人富人以實告鬼曰此
老教三人矣稽顙而退(局方)

十味芍蘇散

治溫熱瘟疫病川芎一錢半半夏一錢一分赤茯苓紫蘇葉柴胡乾葛各一錢陳
皮枳殼甘草各七分桔梗五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(丹心)

清熱解毒散

溫暑之月民病天行瘟疫熱病宜清熱解毒氣羌活二錢白芍藥入參石膏各一錢二分半
黃芩知母並酒炒升麻乾葛各一錢甘草七分黃連酒炒生地黃酒洗各五分右剉作一貼

薑三水煎
服(節齋)

加味敗毒散

治瘟疫及發斑羌活獨活前胡柴胡川芎枳殼桔梗赤茯苓人參防風荆芥蒼朮白朮赤
芍藥當歸生地黃各六分薄荷甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二水煎服(正傳)

神授太乙散

治瘟疫流行不問陰陽兩感頭痛寒熱赤芍藥羌活藿香細辛青皮川芎白芷桔梗枳殼柴
胡陳皮香附子蒼朮防風桑本甘草各七分乾葛升麻紫蘇葉各三分右剉作一貼入薑七

藥七葱七水
煎服(類聚)

五瘟丹

治流行瘟疫及傷寒熱病熱瘧○黃連屬火戊癸年為君○黃柏屬水丙辛年為君○芍藥屬金
庚辰年為君○紫蘇葉各一兩為君者倍入

右皆生用冬至日製為末用錦紋大黃三兩濃煎湯去渣熬成膏和丸彈子大朱砂確黃末為衣再貼金箔每一丸并華水磨服(回春)

茵陳丸

治時行瘟疫及癰癤黃疸溫熱病即黃疸

人中黃丸

治四時疫癘大黃黃連黃芩人參桔梗蒼朮防風滑石香附子人中黃各等分右為末神麝糊和丸梧子大每七十丸氣虛四君子湯血虛四物湯痰多二陳湯作湯送下如無人中黃用真

紅岸代之或以朱砂雄黃為衣亦好(入門)

如意丹

專治瘟疫及一切鬼祟伏尸勞瘵顛狂失志山嵐瘴氣陰陽二毒五癰五疔八痢誤吞銅鐵金石毒不伏水土等證川烏炮八錢檳榔人參柴胡吳茱萸川椒白伏苓白薑黃連紫苑厚朴肉桂

當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆霜二錢半右擇吉日於不聞雞犬處淨室修合為末煉蜜和丸梧子大朱砂為衣每五丸或七丸溫水下(入門)○此方乃溫白丸加檳榔當歸也

黑奴丸

治瘟疫熱病脈洪數大熱狂走渴甚藥為死人斡開口灌藥下咽即活(方見寒門)

大頭瘟證

大頭病者感天地四時非節瘟疫之氣所著以成此疾至於潰裂膿出而又染他人所以謂之疫癘大抵足陽明邪熱太甚實少陽相火為蟻溼熱為腫木盛為痛多在少陽或在陽明陽明為

邪首大腫少陽為邪出於耳前後(海藏)○大頭病者頭痛腫大如斗是也大率多是天行時疫病也(綱目)○天行一種名曰大頭病俗呼為狸頭瘟從耳前後腫起名曰蝦蟆瘟從額頸腫起名曰鰐鰓

瘟甚為凶惡染此者十死八九宜推運氣治之(正傳)○大頭瘟亦謂之時毒初發狀如傷寒五七日之間乃咽喉堵塞害人最速冬溫後多有此病(入門)○大頭瘟初發狀如傷寒五七日之間乃

能殺人其候發於鼻面耳項咽喉亦腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛肢體痛甚者恍惚不甯咽喉閉塞(精義)

大頭瘟治法

兩目鼻面腫者陽明也耳前後並頸角腫者少陽也腦後項下腫起者太陽也表證多者剉防

俱仰臥使藥氣上行(入門)○東垣普濟消毒飲子最妙人中黃丸亦妙(入門)○治法當先緩而後急先緩者邪見於無形之處至高之分當用緩緩徐徐服之寒藥則酒浸酒炒皆是也後急者邪氣入

於中有形質之所此為客邪當急去之(海藏)○大頭病此熱氣在窩藏之上切勿用降藥宜美活酒

芩酒大黃(丹心)○大頭瘟俗謂之時毒常於鼻內搗通氣散散取十餘噴作效若搗藥不噴者不可治也如噴出膿血者治之必愈每日用噴藥三五次以泄毒氣此是良法左右看病之人日用噴藥噴

之必不傳染(精義)○經三四日不解者宜刺防敗毒散至七八日大小便通利頭面腫起高赤者宜托裏消毒散(方見癰疽)兼針破出血泄其毒氣十日外不治自愈若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面大腫食不知味者必死(精義)○大頭瘟宜用既濟解毒湯芩連消毒飲牛芩連湯

漏蘆散 二黃湯消毒丸 燭黃丸 二聖救苦丸
加味燭黃丸 清涼救苦散 通氣散 (諸方)

普濟消毒飲子

治天行大黃蘆黃芩黃連並酒炒各五錢人參三錢陳皮桔梗元參柴胡甘草各二錢
調和時時之留一半蜜丸彈子大每丸一丸細嚼熱水送下或加防風薄荷川芎當歸到取一兩水煎

分二三次服之腫甚宜破刺出血 (東垣) ○泰和二年四月民多疫癘初覺增寒體重次傳頭面腫甚

目不能開上喘咽噤不利舌乾口燥俗云大頭天行染之多死東垣曰身半以上天之氣也身半以下

地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭面而為腫甚速製一方名曰普濟消毒飲子服之皆愈人謂

之仙方謂天仙所製也遂刻諸石以傳永久 (東垣)

既濟解毒湯

治天行大頭瘟頭面赤腫而痛大黃酒煨黃芩黃連並酒炒桔梗甘草
各一錢升麻柴胡連翹當歸身各五分右剉作一貼水煎服 (丹心)

冬連消毒飲

治天行大頭瘟咽喉腫痛黃連黃芩柴胡桔梗川芎荆芥防風羌活枳殼連翹射干白芷甘
草各七分右剉作一貼入薑三片水煎又入牛蒡子一撮再煎入竹瀝薑汁調服 (入門)

牛蒡芩連湯

治大頭瘟兼治咽喉腫痛黃芩酒洗三錢黃連薑汁炒桔梗大黃酒蒸石膏各一錢連翹烏實
元參甘草各一錢荆芥防風羌活各五分右剉作一貼入薑三片水煎徐徐服之 (回春)

漏蘆散

治時毒疔瘡頭面洪腫咽喉堵塞水約不下藍葉元參各二兩漏
蘆升麻大黃黃芩各一兩右為粗末每三錢水煎徐徐服 (綱目)

二黃湯

治大頭瘟初起黃芩黃連並酒炒甘草生各一錢水煎小兒服再
用酒浸大黃散結子炒煎成湯入芒硝等分亦時時細呷之 (正傳)

消毒丸

治時毒疔瘡惡毒大黃牡蠣煨白礬各一兩
右為末蜜丸彈子大每一丸新井水化下 (綱目)

燭黃丸

治大頭病及喉痹歌曰人間治疫有仙方一兩燭黃二大黃薑汁和丸彈子大并華調蜜便
清涼 (易老) ○乃白礬每入兩大黃二兩為末薑汁和丸彈子大并水研服一丸也 (易老)

二聖救苦丸

大黃四兩酒蒸猪牙皂角二兩右為末麝香和丸黍豆大每五七丸以葉豆湯送下汗出
為效 ○萬歷丙戌余寓大梁屬瘟疫大作士民多斃甚至滅門其證增寒壯熱頭面頸項赤

腫咽喉腫痛昏憤名曰大頭瘟余發一秘方名二聖救苦丸用牙皂以開關竅而發其表用大黃以瀉

諸火而通其裏一服即汗一汗即愈真仙方也稟壯者百發百中虛弱者先服劑防敗毒散若未愈用
牛蒡芩連湯亦效 (回春)

加味燭黃丸

治大頭瘟及蝦蟇鷄驚等瘟大黃酒蒸四兩白礬薑汁和丸黍豆大每五七丸以葉豆湯送下汗出
為效 ○萬歷丙戌余寓大梁屬瘟疫大作士民多斃甚至滅門其證增寒壯熱頭面頸項赤