

医学专业学生考试复习题

# 儿 科 学

分 册



上海第一医学院 山东医学院 北京医学院

## 编写说明

“医学专业学生考试复习题”——儿科学分册的汇编目的是为使学生对儿科学的各学科领域做一次全面的自我考核，了解自己对基本理论的掌握程度和解决临床实际问题的能力。本复习题可作为全国统考备考时的参考资料，同时也可供儿科、卫生、口腔医学等各专业学习临床科时参考。

本复习题中的试题是以卫生部1981年长春会议上规定的统考出题范围，即1979年儿科学教学大纲中掌握和熟悉的内容为基本内容。在基本内容的基础上增加了医学生必须掌握的重点内容，此部份题量约为总题量的19.6%，并在题号右上角做了“\*”号标记。

本复习题的内容次序基本按试用教材编排。试题分A、B、C、K四类，应用题另列。全书题后附有正确答案及部份题解，附图十七幅及附图说明。有题解的试题均在正确答案的右上角做了“△”号记号，约占总题的30.2%。

试题所用术语、专业名词、计量单位、正常值范围、药物剂量等均以试用教材为准。

本复习题由上海第一医学院、山东医学院及北京医学院合编，由于时间仓促，水平有限，难免有不妥甚至错误之处，欢迎读者批评指正。

编 者

1984年1月

## 答 题 说 明

### A型题：

每一道题下面都提供了A、B、C、D、E五个备选答案。回答时必须从中选择一个最合适答案。

### B型题：

A、B、C、D、E是备选答案，用数字标明的叙述是试题。回答时应在五个备选答案中，给每道试题选择一个能与之配伍的答案。每一备选答案可以选一次，几次或者不选。

### C型题：

A、B、C、D、是备选答案，用数字标明的叙述是试题。回答时应从备选答案中为每道试题选配一个正确答案。

### K型题：

每一道试题下面都提供了四个用数字标明的备选答案，回答时必须按照下列五种不同的组合来回答：

如果这道题与备选答案①②③有关，答案为A。

如果这道题与备选答案①③有关，答案为B。

如果这道题与备选答案②④有关，答案为C。

如果这道题只与备选答案④有关。  
答案为D。

如果这道题与备选答案①②③④均有关，答案为E。

# 《医学专业学生考试复习题》儿科学分册目录

## 一、多选题

1. 绪论	1
2. 小儿生长发育	3
3. 健康小儿的营养	7
4. 小儿保健	11
5. 新生儿与新生儿疾病	13
6. 营养缺乏性疾病	20
7. 消化系统疾病	26
8. 呼吸系统疾病	33
9. 循环系统疾病	40
10. 泌尿系统疾病	47
11. 造血系统疾病	54
12. 神经系统疾病	60
13. 结缔组织病	66
14. 急性传染病	69
15. 小儿结核病	75
16. 其他(呆小病、先天愚型、苯丙酮酸尿症)	79

## 二、正确答案

## 三、题解

1. 绪论	86
2. 小儿生长发育	86
3. 健康小儿的营养	87
4. 小儿保健	88
5. 新生儿与新生儿疾病	89
6. 营养缺乏性疾病	92
7. 消化系统疾病	95
8. 呼吸系统疾病	99
9. 循环系统疾病	102
10. 泌尿系统疾病	106
11. 造血系统疾病	109
12. 神经系统疾病	112
13. 结缔组织病	115
14. 急性传染病	115
15. 小儿结核病	117
16. 其他	118

## 四、附图及附图说明

# 一、多选题

## 绪论

### A型题

1—1 胎儿期是指：

- A. 受孕后的40周
- B. 受孕后的38周
- C. 受孕后的280天
- D. 从受孕到分娩，约40周
- E. 受孕后的28周

1—2 围产期一般是指：

- A. 从受孕到生后10天
- B. 孕期10周到生后30天
- C. 孕期20周到生后10天
- D. 孕期24周到生后30天
- E. 孕期28周到生后1周

1—3 新生儿期是指：

- A. 从脐带结扎到整28天前的一瞬间
- B. 从脐带结扎到整30天前的一瞬间
- C. 从脐带结扎到整1个月前的一瞬间
- D. 从胎盘娩出到整28天前的一瞬间
- E. 从胎盘娩出到整1个月前的一瞬间

1—4 下列年龄分期中哪一个是错误的？

- A. 婴儿期是指出生到12个月
- B. 幼儿期是指1~3岁
- C. 学龄前期是指3~7岁
- D. 学龄期是指7~14岁
- E. 青春期女童约自12岁，男童约自13岁开始

1—5 在妊娠的哪一期，对母亲的不利因素最容易影响胎儿的正常生长发育？

- A. 前3个月
- B. 4~5个月
- C. 5~6个月

D. 6~7个月

E. 6~9个月

1—6 学龄前期儿童的特点中哪一点是错误的？

- A. 体格发育较前减慢
- B. 脑发育完全成熟
- C. 智力发育增快，求知欲强，可塑性大
- D. 能用较复杂的语言表达思维和感情
- E. 共济运动发育良好

### C型题

A. 婴儿期

B. 幼儿期

C. 二者均有

D. 二者均无

1—7 易患营养及消化紊乱疾病

1—8 对疾病免疫力低，易发生各种传染病

### K型题

1—9 影响胎儿生长发育的因素有：

- ①母亲的健康状况
- ②孕母的生活工作条件
- ③孕母的营养和卫生环境
- ④孕期母亲药物使用

1—10 新生儿期的特点是：

- ①产伤多见
- ②对外界环境的适应能力差
- ③免疫功能差，感染性疾病多见
- ④死亡率高

1—11 学龄期的特点有：

- ①各系统器官都发育到接近成人水平

- ②智力发育较学龄前期更强
- ③青春期开始后可出现心理及精神行为方面的变化
- ④有时可有甲状腺肿大并可伴有某些精神症状

1—12 下列各年龄小儿每分钟呼吸、脉搏次数及血压数值(毫米汞柱)中，哪些是正确的?

呼吸 脉搏 血压

①新生儿	40~45	120~140	收缩压为 46~80
②1岁	25~30	110~130	70/46
③5岁	20~25	80~100	90/60
④10岁	16~18	70~90	100/66

1—13 小儿比成人较易患感染性疾病，其原因为：

- ①新生儿的细胞免疫及体液免疫功能均比成人低
- ②生后1~3个月为免疫球蛋白最低阶段
- ③免疫球蛋白至10岁才接近成人水平
- ④其他体液因子如补体、趋化因子、调理素也均较低

1—14\* 小儿受病因刺激时所出现的病理改变往往与成人不同，可表现在：

- ①婴儿肺炎多为小叶性，年长儿与成人大多为大叶性
- ②因维生素D及钙、磷代谢的障碍，在小儿表现为佝偻病，而成人表现为软

### 骨病

- ③小儿肺结核的病变多为渗出、浸润性，成人肺结核的病变多为坏死、液化、空洞
- ④小儿肺结核以吸收或钙化为结局，成人肺结核以纤维化为结局

1—15\* 小儿各种惊厥与年龄的关系中，哪一条是不正确的?

- ①新生儿期应考虑产伤、窒息、颅内出血或先天性异常
- ②中枢神经系统感染多见于1岁以内小儿
- ③高热惊厥多见于6个月~3岁小儿
- ④6个月以内应首先考虑癫痫

1—16\* 小儿疾病的治疗中，必须注意：

- ①同时治疗并存的营养缺乏症
- ②有先天性缺陷因素存在而影响疗效
- ③药物的代谢特点
- ④药物的剂量及给药方法

1—17\* 小儿保健工作的成就充分体现了很多儿科疾病具有可预防性的特点，下列哪些是正确的?

- ①小儿体格发育的各项指标与解放前及解放初比都有了明显的提高
- ②麻疹在过去为常见病，目前发病率已明显下降
- ③肺炎、婴儿腹泻的发病率和死亡率已大大降低
- ④牛痘已不需接种

# 小儿生长发育

## A型题

2—1 小儿身长的标准中，哪一点是不符合一般正常发育的？

- A. 初生平均为50厘米
- B. 1岁内前半年每月平均长2.5厘米
- C. 1岁内后半年每月平均长1.5厘米
- ✓D. 2岁时身长平均为80厘米
- E. 2岁至12岁身长(厘米) = 年龄 ×  
5 + 75

2—2 正常小儿体重的粗略推算方法中哪一条是错误的？

- A. 1岁内前半年体重(公斤) = 出生体重(公斤) + 月龄 × 0.6
- B. 1岁内后半年体重(公斤) = 出生体重(公斤) + 月龄 × 0.5
- C. 1岁时体重为初生体重的3倍(9公斤)
- D. 2岁时体重为初生体重的4倍(12公斤)
- ✓E. 3岁至15岁体重(公斤) = 年龄 ×  
2 + 8

2—3 身长异常的标准是：

- A. 比平均身长低10%
- B. 比平均身长低15%
- C. 比平均身长低20%
- D. 比平均身长低25%
- ✓E. 比平均身长低30%以上

2—4 \* 影响身长最明显的因素为：

- A. 遗传
- B. 种族
- ✓C. 内分泌
- D. 营养
- E. 锻炼

2—5 下部量特短见于：

A. 营养不良

B. 垂体侏儒症

C. 生殖腺功能不全

✓D. 呆小病

E. 佝偻病

2—6 出生时头的长度大约等于身长的：

- ✓A.  $\frac{1}{3}$
- ✓B.  $\frac{1}{4}$
- C.  $\frac{1}{5}$
- D.  $\frac{1}{6}$
- E.  $\frac{1}{8}$

2—7 下列头围与胸围情况中，哪一条适合小儿发育的平均水平？

- ✓A. 初生时头围34厘米，胸围32厘米
- B. 初生时头围32厘米，胸围34厘米
- C. 6月时头围46厘米，胸围等于头围
- D. 1岁时头围50厘米，胸围大于头围
- E. 2岁时头围52厘米，胸围大于头围

2—8 头围测量方法：

- A. 枕后到额部中央绕头一周
- B. 枕后沿二耳到眉间绕头一周
- C. 枕后结节到眉弓上2厘米绕头一周
- D. 枕后结节到眉间绕头一周
- ✓E. 枕后结节到眉弓上方最突出处绕头一周

2—9 前囟的正确测量方法应是：

- A. 对角顶连线
- ✓B. 对边中点连线
- C. 邻边中点连线
- D. 邻角顶连线
- E. 周径长度

2—10 下列小儿骨骼发育中哪一点是正确的？

- A. 前囱最晚闭合的年龄为10个月
- B. 后囱一般闭合的年龄在生后2周
- C. 颅缝一般闭合的年龄为2个月
- D. 腕部骨化中心开始出现的年龄为1岁半

✓E. 上下部量相等的年龄为12岁

2—11 下列哪一条是符合于牙齿的一般正常发育的?

- A. 乳牙共24只
- B. 最晚于8个月时开始出乳牙
- C. 乳牙最晚于1岁半出齐
- ✓D. 乳牙数=月龄-(4~6)
- ✓E. 6岁开始换牙

2—12 下述生长发育中,哪项是正常的?

- A. 开始会抬头的月龄一般是1个月
- B. 会独立坐稳的月龄一般是5个月
- ✓C. 会爬的月龄一般是7个月
- D. 会独立站稳的月龄一般是8个月
- E. 开始会独立行走的月龄一般是10个月

2—13 小儿腮扁桃腺增大较快年龄为:

- A. 5~6个月
- B. 6~12个月
- C. 1~1岁半
- D. 1岁半~2岁
- ✓E. 2岁以后

2—14 淋巴系统发育最快的年龄是:

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- ✓C. 幼儿期
- D. 6岁以后
- E. 12~13岁

2—15 下列哪一种情况是错的?

- A. 睾丸在出生时大都已降至阴囊
- B. 早产儿出生时发生隐睾者相对较多
- ✓C. 2岁以后隐睾下降机会仍很多
- D. 12~15岁睾丸增长很快
- E. 新生儿至学龄前期小儿包皮一般包围龟头,包皮口狭窄

### B型题

- A. 2个月
- B. 4个月
- C. 6个月
- D. 7个月
- E. 9个月

2—16 开始大声发笑的月龄是

2—17 能认识生人和熟人的月龄是

- A. 3个月
- B. 5个月
- C. 7个月
- D. 9个月
- E. 10个月

2—18 能听懂自己名字

2—19 能伸手取物

2—20 开始能随所视物品或声音转动头部

### C型题

- A. 拥抱反射阳性
- B. 吸吮反射阳性
- C. 二者均有
- D. 二者均无

2—21 足月新生儿

2—22 5个月婴儿

- A. 巴彬斯基征阳性
- B. 克匿格征阳性
- C. 二者均有
- D. 二者均无

2—23 1岁小儿

2—24 3~4个月小儿

2—25 3岁小儿

### K型题

2—26 体重的个体差异较大,以下哪几点是对的?

- ✓①10岁以前男重女轻
- ✓②12~14岁女孩体重超过男孩
- ✓③14~16岁男孩体重超过女孩
- ④个体差异的波动可在±15%范围内

2—27 生理性体重下降须符合下列条件:

- ✓①大约减少出生体重的3~9%

②必须为顺产婴儿

③出生后7~10天内恢复至出生体重

④均为人乳喂养者

2—28 体重的测量应注意：

①在晨起空腹，排尿后进行

②校正磅称的零点

③要求较正确地减去衣服等重量

④小婴儿最好能用盆式秤测量，准确读数至10克

2—29 测量身长时注意下列哪几点是对的

①背靠身长计或墙壁

②两足跟、臀部及两肩在一平面上，足跟靠拢，足尖分开

③视线向前

④两侧耳孔与眼眶的连接线构成水平面

2—30 脊柱的发育中下列哪几点是正确的？

①3个月能抬头时出现颈椎前凸

②6个月会坐时出现胸椎后凸

③1岁开始行走时出现腰椎前凸

④正常发育受骨质因素和姿势的影响

2—31 恒牙发育的一般规律是：

①6岁左右开始出现第一磨牙

②7~8岁开始换牙

③12岁左右开始出现第二磨牙

④18岁以后开始出现第三磨牙

2—32 出牙延迟见于：

①佝偻病

②维生素C缺乏

③营养不良

④牙胚形成时服用四环素

2—33 关于小儿神经系统发育，下面哪些说法是正确的？

①由于髓鞘在出生时尚未发育完善，所以生后2个月内不能形成条件反射

②婴儿期由于神经髓鞘形成不全，所以对刺激的反应较慢

③新生儿由于皮层发育尚未成熟，容易出现高热惊厥

④婴儿对外来刺激的反应容易泛化

2—34 运动发育的规律是：

①由上而下

②由不协调到协调

③由粗糙到精细

④由远到近

2—35 足月新生儿（男）出生后的反射活动：

①即有觅食反射

②提睾反射不易引出

③即有握持反射

④腹壁反射不易引出

#### 应用题

2—36 体重4.8公斤，身长58厘米，后囟已闭，最可能的月龄是：

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 4个月

E. 5个月

2—37 体重6.5公斤，身长65厘米，头围42厘米，最可能的月龄是：

A. 5个月

B. 6个月

C. 7个月

D. 8个月

E. 9个月

2—38 体重9.2公斤，身长75厘米，头围46厘米，胸围46厘米，牙齿8只，最可能的月龄是：

A. 10个月

B. 12个月

C. 15个月

D. 16个月

E. 18个月

2—39 体重10.5公斤，身长80厘米，出牙12只，前囟已闭，胸围大于头围，估计其年龄为：

A. 9个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

E. 30个月

2—40 牙16只，会用勺子吃饭，会说2～3个字构成的句子，最可能的年龄是：

A. 1岁

B. 2岁

C. 2½岁

D. 3岁

E. 3½岁

2—41 婴儿2个月时其生长发育一般达到：

①体重4.2公斤

②俯卧时能抬头

③能注视物体

④能大声发笑

2—42 一个6个月婴儿能完成下列哪几种要求？

①会翻身

②会扶着栏杆站起来

③能辨别熟人和陌生人

④会招手再见

2—43 1岁小儿的发育能达到的要求为：

①能弯腰拾地上的东西

②能模仿成人的动作

③能指出自己的手、脚

④能说2～3个字的短句

2—44 两岁小儿体格发育的标准是：

①体重12公斤

②身长85厘米

③头围48厘米

④胸围48厘米

2—45 小儿6岁时其生长发育一般可达到：

①体重20公斤

②身长105厘米

③牙齿22只

④上下部量已相等

# 健康小儿的营养

## A型题

3—1 小儿与成人的物质代谢及需要量主要不同点为：

- A. 小儿基础代谢所需能量较少，活动所需能量较多
- B. 小儿基础代谢所需能量较少，生长需要能量
- C. 小儿基础代谢所需能量较多，生长需要能量
- D. 小儿排泄损失能量较多，生长需要能量
- E. 小儿排泄损失能量较少，活动所需能量较多

3—2 婴儿对蛋白质需要量比成人相对高  
的原因：

- A. 婴儿以乳类食品为主要食品
- B. 氨基酸在体内并非全部吸收
- C. 由于生长发育需要正氮平衡
- D. 婴儿对蛋白质消化吸收功能差
- E. 婴儿利用蛋白质的能力差

3—3 正常小儿每日每公斤所需热卡的简  
单计算法为：

- A. 1岁以内110卡，以后每增加3岁  
减去10卡
- B. 1岁以内110卡，以后每增加2岁  
减去10卡
- C. 1岁以内100卡，以后每增加3岁  
减去10卡
- D. 1岁以内100卡，以后每增加2岁  
减去10卡
- E. 1岁以内110卡，以后每增加4岁  
减去25卡

3—4 1~3岁小儿每天每公斤需要热卡

和水量应为：

- | 热卡      | 水量    |
|---------|-------|
| A. 80卡  | 100毫升 |
| B. 90卡  | 100毫升 |
| C. 90卡  | 120毫升 |
| D. 100卡 | 125毫升 |
| E. 120卡 | 150毫升 |

3—5 哪种食物成分是机体供热能的主要  
来源：

- A. 蛋白质
- B. 脂肪
- C. 糖类
- D. 维生素
- E. 矿物质

3—6 婴儿饮食中蛋白质、脂肪、糖类所  
供给的热量应占总热量的百分比为

- | 蛋白质    | 脂肪  | 糖类  |
|--------|-----|-----|
| A. 15% | 50% | 35% |
| B. 35% | 15% | 50% |
| C. 50% | 35% | 15% |
| D. 35% | 50% | 15% |
| E. 15% | 35% | 50% |

3—7\* 足月新生儿的胃容量是：

- A. 10~20毫升
- B. 30~60毫升
- C. 70~80毫升
- D. 90~100毫升
- E. 110~150毫升

3—8\* 母乳喂养儿粪便中主要的细菌有：

- A. 大肠杆菌
- B. 肠链球菌
- C. 乳酸杆菌
- D. 副大肠杆菌

E. 变形杆菌

3—9 母乳喂养儿胃肠道感染较少，下列哪一个原因是错误的？

- A. 初乳中含有大量的分泌型 IgA 抗体
- B. 母乳中含乳铁蛋白较高
- C. 母乳中含双歧因子(bifidus factor)
- D. 母乳的缓冲力大，对胃酸中和作用大
- E. 母乳不易被污染

3—10 母乳中的钙磷比例为：

- A. 1:2
- B. 1.5:1
- C. 2:1
- D. 1.2:1
- E. 1.5:2

3—11 人乳和牛乳蛋白质含量(克%)为：

人乳	牛乳
A. 1.2	2.5
B. 2.5	2.5
C. 2.5	3.5
D. 1.2	3.5
E. 2.0	4.0

3—12 全脂奶粉稀释成全乳时标准配制方法应为：

按容量	按重量
A. 1:4	1:6
B. 1:4	1:8
C. 1:8	1:4
D. 1:8	1:6
E. 1:6	1:8

3—13 正常婴儿开始添加辅食及完全断奶时间：

开始添加辅食时间	完全断奶时间
A. 1~2个月	2岁
B. 3~4个月	1岁
C. 3~4个月	2岁
D. 1~2个月	10~12个月
E. 6个月	1½岁

3—14 下列辅食添加的年龄哪项是错误的？

- A. 鱼肝油 1~3个月
- B. 蛋黄 2~3个月
- C. 水果汁 1~3个月
- D. 稀粥 4~6个月
- E. 肉末 7~9个月

3—15 正常2岁小儿的膳食安排，下列哪项是正确的？

- A. 随成人同吃普通饮食
- B. 三餐以外，加点心3次
- C. 日三餐，加点心2次，维生素D每月15万单位
- D. 日三餐，加点心1~2次
- E. 日三餐，饭菜应细、软、烂、碎

### B型题

婴儿饮食中，每日每公斤所需蛋白质量为：

- A. 1~1.5克
- B. 2~2.5克
- C. 3克
- D. 3.5~4克
- E. 4.5克

3—16 混合喂养

3—17 母乳喂养

婴儿胃排空时间为：

- A. 1小时
- B. 1~1.5小时
- C. 2~3小时
- D. 3~4小时
- E. 4~5小时

3—18\* 水

3—19\* 牛乳

3—20\* 母乳

### C型题

母乳与牛乳比较：

- A. 母乳

- B. 牛乳
- C. 二者均有
- D. 二者均无

3—21 蛋白质、脂肪、糖比例合适

3—22 蛋白质中酪蛋白较多

3—23 乳糖含量较高

3—24 含铁量低

### K型题

3—25\* 婴幼儿易引起溢奶和呕吐的原因是：

- ①胃呈水平位
- ②贲门括约肌发育未完善，贲门较松弛
- ③植物神经调节功能不成熟，易引起幽门痉挛
- ④胃收缩功能差

3—26\* 新生儿期不宜过早喂淀粉类食物其原因为：

- ①新生儿唾液腺分化不全，唾液分泌量较少，淀粉酶含量不足
- ②胃淀粉酶含量低
- ③胰淀粉酶活性低
- ④肠管相对较短，对消化淀粉类食物不利

3—27 母亲患何种疾病时禁忌哺乳？

- ①上呼吸道感染
- ②活动性结核病
- ③泌尿道感染
- ④心肌炎伴心力衰竭

3—28 以下哪几点是对的？

- ①羊乳缺乏叶酸。
- ②母乳钙磷含量少，吸收少
- ③牛乳钙磷含量多，但比例不适宜，不利于吸收
- ④炼乳中含糖量多，适宜于婴儿作主食

3—29 通过何种调配方法可矫正牛乳的缺点：

- ①稀释可使酪蛋白浓度减低，凝块变小，易于消化
- ②加糖可提高牛乳的含糖量和热量

- ②煮沸可减少污染菌
- ④煮沸又可使凝块变小

3—30 奶糕和糕干粉的缺点为：

- ①蛋白质的量和质都不足
- ②脂肪含量较少
- ③含维生素D少
- ④含糖丰富，不宜单独用于喂养

3—31 辅食添加的原则中哪项是错误的？

- ①由少到多
- ②由稀到稠
- ③由细到粗
- ④需要时可几种一起添加

3—32 幼儿膳食应注意下列哪些？

- ①1~2岁小儿总热量应达到100卡/公斤/日
- ②需供给蛋白质2~2.5克/公斤/日
- ③菜饭可多样化，但应细、软、烂、碎
- ④除三餐主食外，应给点心1~2次

3—33 下列哪项是错误的？

- ①牛乳100毫升(不加糖)供热量66卡
- ②2:1牛乳100毫升(加5%糖)供热量42卡
- ③1:1牛乳100毫升(加5%糖)供热量53卡
- ④牛乳100毫升(加8%糖)供热量86卡

### 应用题

3—34\* 10天新生儿，体重3公斤，用3:1含5%糖牛乳喂养，每天应给予：

- A. 350毫升
- B. 400毫升
- C. 430毫升
- D. 470毫升
- E. 510毫升

3—35 3个月婴儿，体重5公斤，用牛乳喂养每天应给予：

- |          |       |
|----------|-------|
| 8%糖牛乳    | 另给水   |
| A. 550毫升 | 200毫升 |
| B. 450毫升 | 200毫升 |
| C. 600毫升 | 100毫升 |

D. 500毫升 300毫升

E. 650毫升 200毫升

3—36 一个2个月婴儿，体重4.2公斤，每日给8%糖牛乳460毫升喂哺，如以奶粉代替，每月约需奶粉几斤？

A. 1.5斤

B. 2.5斤

C. 3.5斤

D. 4.5斤

E. 5.5斤

3—37 8个月早产儿，冬季出生，现年1个月，母乳喂养，首先应添加的辅食及添加的目的为：

A. 米汤，补充热量

B. 菜水，补充矿物质

C. 米汤，补充维生素B

D. 鱼肝油，补充维生素A

E. 鱼肝油，补充维生素D

3—38 2个月小儿，冬季出生，牛乳喂养，请指导1个月内可添加的辅食是：

①鱼肝油

②稀粥

③水果汁

④蛋黄

3—39 6个月小儿，生后以牛乳和奶糕喂养，准备添加辅食，请指导可于半月内逐渐添加：

①蛋黄粥

②肉末粥

③菜泥

④馒头

3—40 12个月小儿，母乳喂养，已添加鸡蛋及粥食，请指导还可逐渐添加哪一种辅食：

①豆制品

②碎肉

③软饭

④碎菜

3—41 1个月小儿，生后母乳喂养，母乳充足，但喂奶无定时，易溢奶，有时吐。请指导合理哺养方法：

①每次哺乳时间一般以15~20分钟为宜

②两次哺喂间隔时间约3小时

③哺乳后应将婴儿抱起轻拍其背

④减少每次哺乳量

# 小儿保健

## A型题

4—1 下列各种预防接种属何性质，哪组排列是正确的？

类毒素 灭活菌 减毒活菌  
(疫)苗 (疫)苗

- A. 白喉 破伤风 麻疹  
B. 破伤风 麻疹 脊髓灰质炎  
C. 白喉 百日咳 卡介苗

- D. 破伤风 流行性脑 乙型脑炎  
脊髓膜炎  
E. 百日咳 麻疹 流行性脑  
脊髓膜炎

4—2 灭活菌(疫)苗或类毒素接种的原则中，哪项是正确的？

- A. 初次免疫只需接种1次，3~5年后加强1次  
B. 初次免疫只需接种1次，1~2年后加强1次  
C. 初次免疫需连续接种2~3次，以后要加强，加强年龄各不相同  
D. 初次免疫需连续接种2~3次，不需加强  
E. 以上都不是

4—3 减毒活菌(疫)苗的接种原则中，哪项是正确的？

- A. 初次免疫只需接种1次，以后不需复种  
B. 初次免疫只需接种1次，因免疫持久性长，可于5年以后复种  
C. 初次免疫只需接种1次，因各菌(疫)苗免疫持久性不同，复种年龄不同  
D. 初次免疫需接种2~3次，以后不需复种

E. 初次免疫需接种2~3次，各菌(疫)苗复种年龄不同

4—4 白喉、百日咳、破伤风的混合疫苗初次免疫时需：

- A. 注射1次  
B. 每月1次 注射3次  
C. 每周1次 注射3次  
D. 每周1次 注射2次  
E. 每月1次 注射2次

## B型题

- A. 卡介苗  
B. 白、百、破混合疫苗  
C. 脊髓灰质炎疫苗  
D. 乙型脑炎疫苗  
E. 麻疹疫苗

4—5 初生时应接种 A

4—6 2个月小儿应接种 C

4—7 3~6个月小儿应接种 D

## K型题

4—8\* 固定期保健原则中哪项是正确的？

- ①做好孕妇保健  
②必要时进行羊水检查，筛选疾病  
③提高接生技术  
④加强生后1周内新生儿护理、喂养和疾病的预防

4—9\* 小儿各年龄期的保健重点主要为：

- ①新生儿期以保温、喂养及预防感染为主  
②婴儿期以喂养和预防感染为主  
③幼儿期以保证营养和防止意外、预防感染、教养为主  
④学龄期以加强教育、健全学校卫生管理、增强体格锻炼为主

4—10\* 学龄前期的保健原则有哪些？

- ~①教养
- ②每年一次健康检查
- ③清除体内感染病灶
- ④按期预防接种

4—11\* 各预防接种的初种年龄、初种次数、

复种必须性及年龄由下列因素决定：

- ①小儿机体免疫学特点

- ②当地传染病流行情况
- ③菌(疫)苗的性质
- ④各菌(疫)苗的免疫持久性

4—12\* 1岁小儿应完成的预防接种有：

- ①卡介苗
- ②脊髓灰质炎疫苗
- ③白喉、百日咳、破伤风混合疫苗
- ④麻疹疫苗

# 新生儿与新生儿疾病

## A型题

5—1\* 小于胎龄儿的定义是：

- A. 体重小于2,500克
- B. 体重小于同胎龄正常体重的50百分位以下
- C. 体重小于同胎龄正常体重的10百分位以下
- D. 体重小于同胎龄正常体重的90百分位以下
- E. 足月儿但体重小于3,000克

5—2\* 过期产儿的定义是：

- A. 出生体重 $\geq 4,000$ 克的新生儿
- B. 出生体重在该胎龄体重第90百分位以上者
- C. 胎龄满42周(294天)及其后之新生儿
- D. 胎龄满37周至不满42足周(260~293天)的新生儿
- E. 胎龄满42周(294天)且体重大于4,000克者

5—3\* 新生儿出生时血象特点为：

- A. 出现生理性溶血
- B. 出现生理性贫血
- C. 红细胞大于500万/立方毫米  
血红蛋白大于15克/分升
- D. 红细胞平均400~450万/立方毫米  
血红蛋白12克/分升
- E. 红细胞平均500万/立方毫米  
血红蛋白14克/分升

5—4\* 新生儿出生10天以后，每天需热量为：

- A. 60~80卡/公斤
- B. 80~100卡/公斤

- C. 100~120卡/公斤
- D. 120~140卡/公斤
- E. 大于140卡/公斤

5—5\* 母体的免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿的是：

- A. IgM
- B. IgA
- C. IgG
- D. IgD
- E. IgE

5—6\* 下列哪一项与新生儿肺透明膜病的病理生理无关？

- A. 肺内淋巴管和静脉运转液体功能不完善
- B. 肺泡表面活性物质缺乏，表面张力增加，呼气时肺泡萎陷
- C. 气体交换减少产生缺氧、酸中毒、肺血管痉挛使青紫加重
- D. 肺组织缺氧，毛细血管和肺泡壁渗透性增高，液体外漏
- E. 血浆纤维蛋白渗入肺泡，形成嗜伊红透明膜，更阻碍了换气

5—7\* 出生前为预防新生儿肺透明膜病的发生，可测羊水中卵磷脂与鞘磷脂的比例，如小于下列值时有助于本病的诊断：

- A. 1.5:1
- B. 2:1
- C. 2.5:1
- D. 3:1
- E. 3.5:1

5—8\* 羊水吸入性肺炎主要由于：

- A. 宫内或生产过程中，胎儿因缺氧而出现呼吸运动加强引起