

雜病廣要

丹波元堅 編

人民衛生出版社

# 雜 病 廣 要

丹 波 元 堅 編

人 民 衛 生 出 版 社

一九五八年·北京

## 內 容 簡 介

本書為日本人丹波元堅所編。全書是以中醫所稱的雜病(包括中風、中暑、癲疾、瘧病、脚氣、虛勞、黃疸等)為論述範圍，作者搜集清代以前有關中醫文献，名家學說，分別列入各種病候內；而對每種病候又分出定義、症狀、脈候、治療、方藥等。由於資料整理較為系統，所以閱讀此書既可以知道中醫對各種雜病的認識，又可以明白中醫對雜病的治療方法。故可供研究中醫內科學者參考之用。

## 雜 痘 廣 要

開本：850×1168/32 印張：21 1/2 檢頁：4 字數：593千字

丹波元堅 編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區孩子胡同三十六號。

人民衛生出版社印刷·新华書店發行  
長春印刷

統一書號：14048·1577  
定 價：(9) 8.40 元

1958年8月第1版—第1次印刷  
(長春版) 印數：1—3,000

## 目 錄

外因類.....	1	吐血.....	380
中風.....	1	唾血.....	384
中暑.....	22	咳血.....	384
中濕.....	32	血衄.....	397
中寒.....	37	鼻大衄、九竅四支出血.....	402
瘧.....	41	眼衄.....	403
瘻.....	65	舌上出血.....	404
〔附〕破傷風.....	73	齒間出血.....	404
歷節.....	81	肌膚出血.....	406
脚氣.....	89	小便血.....	408
內因類.....	109	大便血.....	411
虛勞.....	109	瘀血.....	421
骨蒸.....	135	臟腑類.....	426
水飲.....	157	臟腑總證.....	426
痰涎.....	168	癲狂.....	440
水氣.....	191	驚悸.....	460
脹滿.....	214	健忘.....	467
積聚.....	233	不眠.....	469
寒疝.....	261	嗜眠.....	473
〔附〕癰病.....	279	霍亂.....	474
奔豚氣.....	286	關格.....	488
黃疸.....	288	脾胃病.....	493
〔附〕黃胖.....	303	傷食.....	507
消渴.....	306	傷酒.....	519
〔附〕強中.....	324	嘔吐.....	524
痼冷積熱.....	325	胃反.....	543
惡寒發熱.....	332	噦.....	551
汗證.....	342	惡心.....	558
諸氣病.....	351	噫醋.....	560
諸血病.....	371	嘈雜.....	564

痞滿	566	咳嗽	628
膈噎	570	喘	649
蛻蟲	589	〔附〕短氣少氣	665
胃脘癰	606	瘡	667
泄瀉	608	肺癰	672

## 外因類

### 中風

中風之病。內經有仆擊偏枯之名。而迨至張夫子。其證始瞭。金元以降。其說紛挾。張會卿別立非風一門。然就今考之。實無外於長沙之旨。此集一以定證對方爲要。如諸家真類之辨。僅存其梗概而已。

**源因總說** 中風者。風氣中於人也。風是四時之氣。分布八方。主長養萬物。從其鄉來者人中少死病。不從鄉來者人中多死病。其爲病者。藏於皮膚之間。內不得通。外不得泄。其入經脈。行於五藏者。各隨藏府而生病焉。(病源論)

男子則氣引其風。女子則風隨其血。未有不因風而損命。(聖惠方)蓋風性緊暴。善行數變。其中人也卒。其眩人也暈。激人涎浮。昏人神亂。故推爲百病長。(三因方)

夫中風者。皆因陰陽不調。藏府氣偏。榮衛失度。氣血錯亂。喜怒過傷。飲啖無節。恣情嗜慾。致於經道或虛或塞。體虛而腠理不密。風邪之氣。乘虛而中人也。(管見大全良方)

夫人似乎無恙。而卒然中風者。豈一朝一夕之故哉。其受病久矣。蓋肉必先腐也。而後蟲生之。土必先漬也。而後水決之。木必先枯也。而後風摧之。夫物且然。而況於人乎。經曰。邪之所湊。其氣必虛。風豈能以自中乎人。亦人之自受乎風耳。使其內氣充足。精神完固。則榮衛調和。腠理緻密。雖有風。將安入乎。惟其不戒暴怒。不節淫慾。或飢不暇於食。或寒不暇於衣。或嗜酒而好色。或勤勞而忘身。或當風而沐浴。或大汗而行房。或畏熱而露臥。或冒雨而奔馳。以致真元耗亡。氣血消盡。大經細絡。積虛彌年。平時無甚痛苦。而不知榮衛皆空。徒存軀殼。正猶無心之木。將折未折。無基之牆。欲頽未頽。其勢已不可支。而方且自謂無恙。遂昧而不知戒。一旦爲賊風所襲。如劇寇操刃。直入無人之境。勢如破竹。不移時而皆潰。則盜酒談笑之間。舉步轉移之隙。卒然顛仆。頓爲廢人。不亦重可歎

哉。由是觀之。雖由外風之中。實因內氣之虛也。然人之一身。表裏上下。未必皆虛。惟積虛之處。氣多不貫。而勢有偏重。故一爲風所入。而肢體於是乎廢矣。(丹台玉案)

**風有內外** 人之爲病。有外感之風。亦有內生之風。而天人之氣。恒相感召。真邪之動。往往相因。故無論賊風邪氣從外來者。必先有肝風爲之內應。即痰火食氣。從內發者。亦必有肝風之始基。設無肝風。亦祇爲他病已耳。寧有卒倒偏枯歪僻牽引等症哉。

夫邪氣所觸者。邪風暴至。真氣反陷。經絡府藏。卒然不得貫通。不相維繫。內經所謂邪風之至。疾如風雨是也。藏邪所發者。藏氣內虛。肝風獨勝。卒然上攻九竅。旁溢四肢。如火之發。如泉之達。而不可驟止。肝象木而應風。而其氣又暴故也。又邪氣所觸者。風自外來。其氣多實。肝病所發者。風從內出。其氣多虛。病虛者氣多脫。病實者氣多閉。脫者欲其收。不收則死。閉者欲其通。不通亦死。(金匱翼)(按風犯肝經爲多。戴原禮有說。見於後五臟諸證條。宜參閱。)

**論眞中類中** 人有卒暴僵仆。或偏枯。或四肢不舉。或不知人。或死或不死者。世以中風呼之。而方書亦以中風治之。余嘗考諸內經。則曰風者百病之始也。又曰。風者百病之長也。至其變化。乃爲他病。無常方。又曰。風者善行而數變。又曰。風之傷人也。或爲寒熱。或爲熱中。或爲寒中。或爲溼風。或爲偏枯。或爲風也。其卒暴僵仆不知人。四肢不舉者。并無所論。止有偏枯一語而已。及觀千金方(引岐伯)金匱要略中風篇。知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證。固爲因風而致者矣。故用大小續命、西州續命、排風、八風等諸湯散治之。及近代劉河間、李東垣、朱彥修三子者出。所論始與昔人異矣。三子之論。河間主乎火。東垣主乎氣。彥修主乎濕。反以風爲虛象。殊不知因於風者。眞中風也。因於火、因於氣、因於濕者。類中風而非中風也。三子所論者。自是因火、因氣、因濕。而爲暴病暴死之證。與風何相干哉。(醫經溯洄集)

古人論中風者。言其證也。三先生論中風者。言其因也。知乎此。則中風之候。可得而詳論矣。其所謂眞中風邪者。未必不由氣體虛弱。榮衛失調。然後感於外邪也。若非體虛所致。則西北二方。風寒大盛之地。而中風者比比皆是。何暇爲他證哉。其所謂因火、因

氣、因濕者。亦未必絕無外邪侵侮而作也。若無外邪侵侮。則因氣、因火、因濕。各自爲他證。豈有歪僻難摸暴仆暴瘡之候乎。經曰。邪之所湊。其氣必虛是也。豈可以一中風之證。歧爲二途哉。(醫學正傳)

**脈候** 診其脈虛弱者亦風也。緩大者亦風也。浮虛者亦風也。滑散者亦風也。(病源論)

診人被風不仁痿痪。其脈虛者生。堅急疾者死。(脈經)

中風之病。口噤筋急。脈遲者生。脈急而數者死。(中藏經)

凡人中風。脈無不大者。非熱也。是風脈也。(醫說引醫餘)

風邪中人。六脈多沉伏。(按此丹溪說)亦有脈隨氣奔指下洪盛者。(證治準繩)

凡脈浮弦無力爲風。浮滑不清爲痰。浮數有力爲火。沉弦有力爲氣。沉實有力爲便結。沉澀而數爲血凝。凡下元無根。則兩腎脈不應。或沉滑微細。若尺浮而無力。腎氣不足。尺洪而弦數。腎陰大虧。若痰塞氣滿。併逆於上。有升無降。則虛弦搏急。一如沸釜。或精神元氣一時暴絕。則虛散而欲絕。脈來緩滑。或浮滑。或滑數有神者易治。或弦滑。或浮數。或洪大者難治。若兩尺絕無。下元已絕。寸關虛豁而空大。真氣已散。或舉之搏大。按之絕無。孤陽無依者死。(錦囊秘錄)

**先兆**(宜參灸法) 人有患頭目眩。或遊或風。口眼瞤動。非痰。乃風之漸也。(魏氏家藏方)中風者。俱有先兆之證。凡人如覺大拇指及次指。麻木不仁。或手足不用。或肌肉蠕動者。三年內必有大風之至。經曰。肌肉蠕動。名曰微風。(保命集)(汪石山醫按。舉此證曰。手大指次指。是手太陰陽明經。風酒肉動痰起火。入房傷陰血。水弱火盛。竟枯竭而然耳。更遠色戒酒。自得虛無恬憺。而後用十全大補湯。年餘間服八味丸。遂復康。是亦預防中風之術也。)

中風者。人本氣血兩虛。或有形盛氣衰。或指節不時麻木。或手足間痠疼。或頭眩眼吊或虛跳。渾於半身或周身。有如蟲行。此中風之兆也。人未之覺。不謹調護者多。(諸證辨疑)

大凡見眩暈之漸。勞即耳鳴目眩。背膊酸疼。有時腰痛者。此中風之履霜也。此是病之緩也。(醫經會元)

**證狀總說** 嚇伯曰。中風大法有四。一曰偏枯。二曰風瘡。三曰

風慾。四曰風痺。夫諸急卒病多是風。初得輕微。人所不悟。宜速與續命湯。依腧穴灸之。夫風者。百病之長。岐伯所言四者。說其最重也。(千金方)

風者百病之長。岐伯所謂大法有四。一曰偏枯。半身不遂。二曰風癥。於身無痛。四肢不收。三曰風慾者。奄忽不知人也。四曰風痺者。諸痺類風狀。此特言其大概。而又有卒然而中者。(醫方大成)  
(按此說據病源論風慾彼作風癥)

中風之證。卒然暈倒。昏不知人。或痰涎壅盛。咽喉作聲。或口眼喎斜。手足癱瘓。或半身不遂。或舌強不語。風邪既盛。氣必上逆。痰隨氣上。停留壅塞。昏亂暈倒。皆痰爲之也。(證治要訣)

其狀涎潮昏塞。不省人事。舌強不能言。此等疾證。鮮有不斃者。然亦有輕重。經云。風中藏則性命危。且以簡易言之。先察口眼開闔。以別重輕。如眼閉口噤。無汗搐搦。涎不作聲。六脈遲浮者易治。若眼閉口開。手足不收。自汗如珠如油。髮直吐沫。面赤如粧。魚口氣粗。咽中涎響。似水鷄聲。或如拽鋸。聲如鼾睡。或時長噓。搖頭上竄。噴藥悶亂。目瞪直視。頭面青黑。六脈急疾大數。脈遲緩。儻有一證。皆不可治也。(按婦人良方曰。當察口眼開闔。以別重輕。涎沫有無。以明證治。如眼閉口閉。手足不開。涎不作聲者可治。如眼閉口開。聲如鼾睡。遺尿者死。此較之本文更覺明約。蓋陳氏說。實爲辨閉脫者之嚆矢。)若是中之輕者。涎潮昏塞。不省人事。語言蹇澀。半身不遂。緩縱蟬曳。左癱右瘓。偏枯風慾。痿痺不仁。口眼喎斜。頭痛頭眩。如坐舟船之上。角弓反張。搖頭馬鳴。白虎歷節。走注疼痛。蟲行瘡瘍。恍惚驚悸。爲癲爲癇。暗風倒地。難可枚舉。已上之證。皆可施治。(管見人全良方)

又有中之輕者。在皮膚之間。言語微蹇。眉角牽引。遍身瘡瘍。狀如蟲行。目旋耳鳴。又當隨證治之。(醫方大成)

**五藏證候** 心中風。但得偃臥。不得傾側。汗出。若唇赤汗流者可治。急灸心俞百壯。若唇或青或黑。或白或黃。此是心壞。爲水。面目亭亭。時悚動者。皆不可復治。五六日而死。肝中風。但踞坐不得低頭。若繞兩目連額。色微有青。唇青血黃者可治。急灸肝俞百壯。若大青黑。面一黃一白者。是肝已傷。不可復治。數日而死。脾中風。

踞而腹滿。身通黃。吐鹹汁出者可治。急灸脾俞百壯。若手足青者。不可復治。腎中風。踞而腰痛。視脅左右末。有黃色如餅棗大者可治。急灸腎俞百壯。若齒黃赤。鬢髮直。頭面土色者。不可復治。肺中風。偃臥而胸滿短氣。冒悶汗出。視目下。鼻上下兩邊。下行至口。色白可治。急灸肺俞百壯。若色黃爲肺已傷。化爲血。不可復治。其人當妄墮空指地。或自拈衣尋縫。如此數日而死。(病源論)

心脾俱中風。則舌強不能言也。肝腎俱中風。則手足不遂也。  
(中藏經)

五臟雖皆有風。而犯肝經爲多。蓋肝主筋屬木。風易入之。各從其類。肝受風則筋緩不榮。或緩或急。所以有喝斜癱緩不遂。舌強語澀等證。(證治要訣)

**藏府血脈經絡之別** 中風雖能言。口不喝斜而手足顛曳。脈虛浮而數。風中府也。蓋風中脈。則口眼喝斜。風中府。則肢體廢。風中藏。則性命危。凡風中府。宜汗而解。(本事方)

范子默曰。凡覺手足痺。或麻或痛。良久乃已。此將中府之候。凡覺心中憒亂。神思不怡。或手足麻。此中藏之候。(方氏家藏方)

中府者。面加五色。有表證脈浮而惡寒。拘急不仁。或中身之後。或中身之前。或中身之側。皆曰中府也。其治多易。中藏者。唇吻不收。舌不轉而失音。鼻不聞香臭。耳聾而眼瞽。大小便秘結。皆曰中藏也。其治多難。大抵中府者。多著四肢。中藏者多滯九竅。雖中府者多兼中藏之證。至於舌強失音。久服大藥。能自愈也。(保命集)

若以藏府言之。則又各有形證焉。中藏者多滯九竅。故有癱緩失音。鼻塞耳聾。目瞽便秘之症。中府者。多著四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓之形。又有中血脈者。則外無六經之形症。內無便溺之阻澀。惟口眼歪斜。或左或右而已。而手足動靜。起居食息。故無恙也。其或股不能舉。口不能言。更無別症。乃中經也。比中藏府則爲輕。比之中血脈。猶爲重耳。然因其病而藥之。則中藏者宜下。中府者宜汗。中經者。宜補血以養筋。中血脈者。宜養血以通氣。此皆可治之症也。而又有難易於其間。中藏爲難而中腑次之。中經又次之。其或初中於血脈。藥之而愈。苟不守禁忌必復中。而中必在於藏。中一次則虛一次。虛一次則重一次。故中府難可治也。由先中

血脉與經。而後及於府。則難治矣。中藏本難治也。由先中府而後及於藏。則不治矣。若中府而兼中藏。與傷寒兩感者何異。其又可生耶。(丹台玉案)

中風一證。分中血脉中府中藏。始自李東垣。中血脉者大秦艽湯。中府者小續命湯。中藏者三化湯。然從未見有三化湯中藏之證。惟金匱書中分爲四證。曰絡、曰經、曰府、曰藏。其說最爲的當。可爲後世法。蓋口眼喎斜肌膚不仁。邪在絡也。左右不遂。筋骨不用。邪在經也。昏不識人。便溺阻隔。邪在府也。神昏不語。脣緩涎出。邪在藏也。學者細閱諸家之論。自知不謬云爾。(醫宗金鑒)

其爲病則有藏府經絡淺深之異。口眼歪斜絡病也。其邪淺而易治。手足不遂。身體重痛經病也。邪差深矣。故多從倒仆後見之。中昏厥語言錯亂府病也。其邪爲尤深矣。大抵倒仆之候。經府皆能有之。其倒後神清識人者在經。神昏不識人者在府耳。至於脣緩失音。耳聾目瞀。遺尿聲鼾等症。則爲中藏病之最深者也。然其間經病兼府者有之。藏病連經者有之。府藏經絡齊病者有之。要在臨病詳察也。(金匱翼)

**閉脫**(宜參後固脫方法) 設或口不能言者爲心絕。唇吻(此非訛則脫)手撒者爲脾絕。眼合直視者爲肝絕。遺尿而黑者爲腎絕。鼾睡自汗者爲肺絕。此名脫證。如止牙關緊閉。兩手握固。則爲閉證。閉證則可以蘇合香丸、牛黃、至寶之類灌之。如見脫證。惟宜以大劑理中湯灌之。及灸臍下。雖曰不治。亦可望救十中之一。若誤投蘇合、牛黃等藥。即終難活矣。蓋斬關奪門之將。原爲閉證設也。若施之脫證。如人既入井。又下之石矣。世人陷此弊而死者。不可勝數。(醫林繩墨)(周京曰。凡遇脫症。法在不治。惟大進參附。或可冀其萬一。按醫學綱目曰。五藏氣絕。速宜大料參芪。煎濃湯灌之。及臍下大艾灸之。亦可轉死迴生也。女科準繩辨閉脫證治。湊合繩墨、綱目二書。但牛黃、至寶之類。改作三生飲之類却誤。醫宗必讀全取繩墨。)

按卒仆暴厥之證。不論男子婦人。風寒氣食痰濕。但要分得閉與脫二證明白。(女科準繩)

閉者邪氣閉塞於外。元氣猶然在內。但與開闢利氣。則邪自散。

故治易。脫者元氣泄於外。邪氣混於內。雖與峻補。而藏已傷殘。故治難。諸證皆然。不獨中風也。(證治彙補)

**冷熱虛實** 六脈沉伏或指下浮盛二脈。正有陰中陽中之分。正經謂之寒中熱中是也。若脈見沉急。顏青臉白。如懈如意。此爲寒中。治法則有天雄附子例。三建湯、星附湯之類是也。脈見浮洪而急。顴赤臉赭。如醉如怒。此爲熱中。治法則有防風獨活例。大小省風湯、紫豆湯之類是也。(續易簡方復集)(按永類鈐方稍同。熱中更有牙關緊急上視強直掉眩。)

外台秘要云。凡初中風。四肢不收。揚手擲足。心神昏憊。眼不識人。言不出口。煩悶惡衣。噴藥悶亂。此等疾證。多由熱起。王叔和云。熱積生風是也。(按此所引當考出典)故先聖用至寶丹、紅雪通中散、龍腦芎犀丸、薄荷煎、牛黃清心丸以對之。亦有單飲竹瀝及大小竹瀝湯、敗毒散加防風荆芥煎服亦效。若不審是。熱積生風。例以三生飲、三建湯、養正丹投之。則禍不旋踵。(管見良方)

中風手足軟弱。不能舉動。外證自汗者。虛中風也。若手足強急。口眼喎斜。伸縮痛者。實中也。(壽世保元)

**中風中氣之別**(宜參氣病門) 中氣與中風相似。所以別者。風中身溫。氣中身冷。(證治要訣)

又有中氣與中風相類。語言蹇澀。涎潮昏塞。不知人事。牙關緊急。但手足不偏廢爲異耳。(奇效良方)

氣中即俗謂之氣厥也。脈必沉。若浮則風脈也。中風與類中風。身溫且多痰涎。中氣身冷。且無痰涎。(丹溪纂要)

**風中脈浮洪。氣中脈沉澀。**(醫約)

中風與中氣。形同而病異。中風因人元氣衰弱。腠理空疏。風邪所襲。卒然中倒。其形身強而熱。中氣乃七情所傷。氣厥而暈。必身寒氣冷。而無強攣之苦。既甦之後。氣逆不已。(原病集)

**相類證**(更有痰厥食厥等見厥。及痰涎傷食中。) 手足沉重。狀若風者。此證其源起於脾胃虛。榮衛不足。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。水穀之精。化爲榮衛。以養四肢。若起居失節。飲食不時。則致脾胃之氣不足。既榮衛之氣。潤養不周。風邪乘虛而干之。蓋脾胃主四肢。其脈連舌本而終於唇口。故四肢與唇口俱痺。語言蹇澀也。治

法宜多用脾胃藥。少服去風藥。則可取安矣。若久久不治。則變爲痿疾。經所謂治痿獨取陽明是也。陽明者胃之經也。(鷄峰)

有無故口眼喎斜。投以中風藥劑不效。蓋緣骨虛中受風所致。當於此求之。不可例作尋常中風治之。川烏一味。決不可少。宜炮熟用。(證治要訣)

有元氣素弱。或過於勞役。或傷於嗜欲。而卒然厥仆。狀類中風者。手必散。口必閉。非大劑參芪用至斤許。豈能回元氣於無何有之鄉哉。亦有不仆而但舌強語澀痰壅。口眼喎斜。肢體不遂者。作中風治必殆。(證治準繩)

丹溪治王從一四十二歲。十指盡麻木併面麻。乃氣虛症。補中益氣湯加木香附子各五分愈。(名醫類案)

祝橘泉治英國公病左癱不語。氣上壅。醫以爲中風。用順氣祛風之劑弗效。祝曰。此痰火濕熱所致。與之清燥化痰。前後飲竹瀝數升愈。(同上)

**死證** 中風之病。鼻下赤黑相兼。吐沫而身直者。七日死也。(中藏經)

病風人脈緊數浮沉。有汗出不止。呼吸有聲者死。不然則生。(同上)

若搖頭直視。心腎脫絕。蓋諸陽獨留。諸陰悉盡。故直視搖頭。心藏絕。真藏病也。鮮有再生。(朱氏集驗方)

王穎曰。但口開手散。眼合遺尿。聲如鼾睡者。並難治療。若此立說。則五證中。凡見一證。遽皆不治。此豈可哉。按經言之。身虛急卒中。至五藏閉絕。脈道不通。氣不往來。譬如墮溺。不可與期。何則。口開者心氣閉絕也。手撒者脾氣閉絕也。眼合者肝氣閉絕也。遺尿者腎氣閉絕也。鼻鼾者肺氣閉絕也。備此五者。始不可治。若見其一。猶當審餘證。詳餘脈。以施救療。蓋以初中眼合者多。痰上鼻鼾者亦多。惟遺尿口開二證俱見爲惡。心爲五藏之君主。腎爲一身之根本。誠不可閉絕也。(續易簡方後集)

諸中或未甦。或已甦。或初病。或久病。忽吐出紫紅色者死。(證治要訣)

**攢陽法(宜參前先兆條)** 寶鑑云。凡人初覺大指次指。麻木不

仁或不用者。三年內有中風之疾也。宜先服愈風湯、天麻丸各一料。此治未病之法也。(按此本出保命集)薛己云。預防之理。當養氣血。節飲食。戒七情。遠幃幕可也。若服前方以預防。適所以招風取中也。(準繩)

若風病既愈。而根株未能悉拔。隔一二年或數年。必再發。發則必加重。或至喪命。故平時宜預防之。第一防房勞暴怒鬱結。調氣血。養精神。又常服藥以維持之。庶乎可安。(沈氏尊生書)

**治法概略** 按中風之候。當先辨其真中類中。及在經絡藏府之別。更察其陰陽左右寒熱氣血之偏虛。濕痰之症據。然後立法施治。其治之大略。不外攻風逐痰。收氣灸脫。開關通閉。涌吐活絡。清火養血。潤燥培元。補氣回陽等法。(醫級)

昏沉不省人事。口噤不可進藥。急以生半夏爲末。吹入鼻中。或用細辛皂角爲末吹入喉。噴嚏則甦。(按此法本出易簡方)此可以驗其受病深淺。則知其可治不可治。若稍得甦省者。八味順氣散便服治風藥。然未遽絕治氣藥。小續命湯煎熟去滓。調蘇合香丸一粒。或五積散。加麝香少許。或星香散。或醒風湯。加木香一錢。如服前藥不效。其人頑涎愈盛。或前證不解。或增困重。宜星附湯。或三生飲。加全蝎三個。間磨沉香湯。下養正丹。(要訣)(按五積散加麝香本出百一選方)

**治當調氣活血** 治療之法。當推其所自。若內因七情而得之者。法當調氣。不當治風。外因六淫而得之者。亦先當調氣。然後依所感六氣。隨證治之。此良法也。(濟生方)

治之之法。調氣爲先。經云。善治風者。以氣理風。氣順則痰消。徐理其風。庶可收效。先用麻油調蘇合香丸。或用薑汁。或用白湯調。如口噤。抉開灌之。稍甦則進八味順氣散。(要訣)

治風之法。初得之。即當順氣。及其久也。即當活血。此萬古不易之理。久患風疾。四物湯吞活絡丹愈者。正是此義。若先不順氣。遽用烏附。又不活血。徒用防風天麻羌活輩。吾未見其能治也。(同上)(準繩又曰。然順氣之藥則可。破氣瀉氣之藥則不可。)

此症予歷治歷效者。良由先爲疏通經絡。活血調氣。然後以補劑收功。惟經絡疏通。宿痰磨去。新痰不生。何疾不瘳。(赤水玄珠)

**大劑久服** 凡中風。用續命、排風、風引、竹瀝諸湯。及神精丹茵芋酒之類。更加以灸。無不愈者。然此疾積習之久。非一日所能攻。皆大劑久而取效。唐書載王太后中風。啞默不語。醫者蒸黃耆數斛以薰之得差。蓋此類也。今人服三五盞。便求效責醫也。亦速矣。孟子曰。七年之病。三年之艾。久而後知爾。(本事方)

**開關方法** 卒然口噤目張兩手握固。痰壅氣塞。無門下藥。此爲閉證。閉則宜開。不開則死。搐鼻揩齒探吐。皆開法也。(金匱翼)

經驗方治急中風。目瞑牙噤。無門下藥者。以中指點散子揩齒三二十。揩大牙左右。其口自開。始得下藥。龍腦天南星等分爲末。乳鉢內研。自五月五日午時合出者。(聖濟出作患)只用一字至半錢。名開關散。(本草)

簡要濟衆如牙關不開。用白梅揩齒。口開即灌藥。(同上皂莢條)

聖濟名白神散(又有白礬散。用白礬鹽花二味。)

#### 治中風牙關緊急方

甘草比中指節。截作五截。於生油內浸過。炭火上炙。候油入甘草用。

右一味以物幹開牙關。令咬定甘草。可如人行一里時候。又換甘草一截。後灌藥極效。(聖濟)

男子婦人中風。涎潮於心。卒然中倒。當即時扶入煖室中。扶策正坐。當面作好醋炭熏之。令醋氣衝入口鼻內。良久其涎潮聚於心者。自收歸舊。輕者即時甦省。重者亦省人事。惟不可吃一滴水湯入喉也。如吃湯水。則其涎永繫於心絡不能去。必成廢人。今只以醋炭熏之。既得涎離於心。漸漸甦省。當以生料五積散加麝香煎服之。(澹寮集驗方引傳心方)

初病卒倒。危急不醒。但察其有無死證。如無死證。而形氣不脫。又無痰氣。但扶定摺其人中。自當漸醒。或以白湯薑湯。徐徐灌之亦可。待其甦醒。然後察證治之。(景岳全書)

**通竅方法** 風邪中人。與痰氣相搏。閉其經隧。神暴昏。脈暴絕者。急與蘇合至寶之屬以通之。蓋惟香藥。爲能達經隧通神明也。(金匱翼)

蘇合香丸。

蘇合香 白朮 珠砂 沉香 詞子肉 丁香 木香 香附子 白檀香 烏犀角 乳香 藿撥 安息香各一兩 麝香 龍腦各半兩

右爲末。煉蜜丸。如鷄頭實大。每服一丸。溫酒嚼下。人參湯亦得。此方大家皆有。恐未知其神驗耳。本出廣濟方。謂之白朮丸。後人編入外台。(按此出外台鬼魅精魅及古今諸家丸方中)和劑局方蘇合香油(入安息香膏內)薰陸香(別研)龍腦(研各一兩)青木香白朮白檀香丁香硃砂(研水飛)沉香香附子(炒去毛)烏犀(镑屑)藿撥安息香(別爲末用無灰酒一升熬膏)麝香(研)訶黎勒(煨取皮各二兩)右爲細末。入研藥勻。用安息香膏并煉白蜜和劑。每服旋丸。如梧桐子大。早朝取井花水。溫冷任意化服四丸。老人小兒可服一丸。溫酒化服亦得。并空心服之。去龍腦名麝香蘇合香丸。蘇合香丸。古方多以酒調服。是以往往服者不能奏功。若以人參湯佐之。其功倍於常也。凡中風不省人事。牙關緊急者。用此丸旋加麝香一二分。以真麻油調灌之。無不吐痰而甦者。蓋麻油最能化痰。試滴痰上。須臾痰化爲水。若口開脈絕者不救。(續醫說)(按麝香麻油本出是齋)

治中風不計緩急。潮涎脅悶。不知人事。七寶丸。

硃砂 牛黃 水銀 龍腦 脂粉 麝香各一分 金箔二十一大片

右件藥一處同研水銀星盡。用棗肉爲丸。如綠豆大。病輕者分作四服。患重者只作一服。溫水或化破服之。利下涎後平氣丸散漸服慢治風藥。(傳家秘寶)(按此方似宜入寧神中。然據其主證。姑列於斯。)

治痰方法 人之胃中。必有涎液爲養。風內動而氣上逆。則涎隨氣上。而爲痰嘶。風中雖屬挾虛。半是痰邪爲患。虛痰實痰。治有分別。若窒碍不通。必先治標爲急。所以涌吐開通豁降之治。在所必需也。(醫說)

或因風而動痰。或因痰而致風。或邪風多附頑痰。或痰病有如風病。是以掉搖眩暈倒仆昏迷等證。風固有之。痰亦能然。要在有表無表。脈浮脈滑爲辨耳。風病兼治痰則可。痰病兼治風則不可。(金匱翼)

必用方論中風無吐法。引金虎碧霞爲戒。且如卒暴涎生。聲如引鋸。牙關緊急。氣閉不行。湯藥不能入。命在須臾者。孰以無吐法可乎。但不當用銀粉藥。恐損脾壞人四肢爾。(本事方)

治痰之法。凡非風初病而痰氣不甚者。必不可猜其爲痰。而妄用痰藥。此大戒也。若果痰涎壅盛。填塞胸膈。湯液俱不能入。則不得不先開其痰。以通藥食之道。而開痰之法。惟吐爲捷。如古方之獨聖散、茶調散、稀涎散之屬。皆吐痰之劑也。但恐元氣太虛。不能當此峻利之物。或但用新方之吐法爲妥。或用牛黃丸、抱龍丸之類。但使咽喉氣通。能進湯飲即止。不可盡攻其痰。致命危困。則最所當慎。以故治痰之法。又必察其可攻與否。然後用之。斯無誤也。(按新方吐法係於蘿蔔子及鹽湯二方)

若其眼直咬牙。肢體拘急。面赤強勁有力者。雖見昏沉。亦爲可治。先用粗筋之類。挖開其口。隨以堅實筆榦。攪住牙關。乃用淡淡薑鹽湯。徐徐灌之。然後以中食二指。探入喉中。徐引其吐。若指不能入。則以鵝翎蘸湯。代指探吐亦可。如是數次。得吐氣通。必漸甦矣。然後酌宜可以進藥。此治實痰壅滯之法也。若死證已具。而痰聲漉漉於喉間者。吐亦無益。不必吐也。若痰氣盛極而不能吐者。亦不治之證也。又凡形氣大虛者。忌用吐法。是皆不可攻者也。(景岳全書)

治卒中風。昏昏如醉。形體(聖濟作心神)瞀悶。四肢不收。或倒或不倒。或口角似邪。微有涎出。斯須不治。便爲大病。故傷人也。此證風涎潮於上鬲。渾氣不通。宜用救急方(證類引無方字聖濟同)稀涎散。

猪牙皂角四挺須是肥實不幹者。削去黑皮用。 普鑿一兩光明通瑩者。

(聖濟四兩)

右二味同擣。羅爲細末。再研極細爲散。如有患者。可服半錢。重者三字匕。溫水調灌下。不大嘔吐。只是微微涎稀冷而出。(證類引無冷字)或一升二升。當時惺。(證類惺字複聖濟作省覺)次緩而調治。不可便大攻之。(證類大攻之作大段吐之)恐過傷人命。經效不能盡述。(傳家秘寶)

治初中風失音不語。昏冒不知人。先宜吐風痰。令省覺。次可服諸湯散。吐痰白鑿散方。