


噪



2

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闕格

噎氣

痰熱門

瘧

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

大門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癩

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門 上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門 下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風

胃風

痛風

脈節痛

肩背痛

痺

癘風

血風瘡

身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿

肺癰

霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

咳氣

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

痰熱

哮喘

喘

惡心

嘔吐

咳逆

翻胃

嘈雜

關格

癰氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癢

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘵

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之八

休甯東山古庵方廣約之類集

溼熱門

○廣按溼熱痰熱風熱所因不同為病亦異溼熱者因溼而生熱也痰熱者因痰而生熱也風熱者因火而生風風則兼乎熱也火性炎上凡頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾才宣才齒腫之類皆風熱之所為也水性潤下凡泄瀉下痢水腫鼓脹遺精白濁疝痛腰痛腳氣之類皆溼熱之所為也痰生於脾土居中央凡咽痛喉閉膈噎胸痞痞癰顛狂驚悸怔忡健忘恍惚之類皆痰熱之所為也經曰治病必先求其本此風熱痰熱溼熱乃病之根本也

吞酸 二十二 附 噯氣

丹溪心法

○吞酸者溼熱鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用糲食蔬菜自養 宜用炒吳茱萸順其性而折之此反佐之法必以炒黃連為君 二陳湯加茱萸黃連各炒隨時令迭其位使蒼朮茯苓為輔佐冬月倍茱萸夏月倍黃連湯浸炊餅丸如小豆吞之仍教以糲食蔬菜自養并戒忿怒即安

戴云溼熱在胃口止飲食入胃被溼熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易為酸也

八方 茱萸一兩去枝梗煮少時浸半日曬乾 陳皮兩 蒼朮米泔浸一兩 黃連炒去土一兩 黃芩上土炒一兩 或加桔梗一兩茯苓一兩

右為末神麴糊丸茱萸大每服二三十九時時津液下食後服

黃連清化丸 黃連兩 茱萸一錢炒 桃仁二十四個研 陳皮兩半 夏半一兩

右為末神麴糊丸茱萸大每服百丸姜湯下

參芩丸 治溼而帶氣者溼熱甚者用之為向導上可治吞酸下可治自利

六一散一兩 吳茱萸一兩 右為末飯丸 六一散見溫熱

回令丸 瀉肝火行溼為之反佐開痞結治肝邪可助補脾藥 黃連六兩 吳茱萸一兩

右為末粥丸 一方名左金丸治肝火茱萸或半兩水丸白湯下

附諸賢論

或問丹溪曰吐酸素問明以為熱東垣又以為寒何也答曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久滯中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間略不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也

附諸方

麴朮丸 治中脘宿食留飲酸蜚心痛或口吐清水 神麴炒三兩 蒼朮泔浸炒一兩半 陳皮一兩

右為末生薑汁煮神麴為丸每七十丸姜湯下

加味平胃散 治吞酸或宿食不化 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 神麴炒 麥芽炒

右咬咀每服五錢生薑三片水煎服

透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香 白豆蔻 縮砂仁 枳榔 枳殼 厚朴 半夏 青皮 陳皮 甘草 大黃 朴硝

右各等分每服一兩水二盞生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓通口服食後

丹溪心法

噯氣 胃中有火有痰

八方 南星 半夏 軟石膏 香附 一本有炒梔子

右作丸或作湯服之蓋胃中有鬱火膈上有稠痰故也○軟石膏丸亦可服 本方痰條下云噯氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

丹溪心法

○疸不用分其五同是溼熱如蠶麴相似 輕者小溫中丸 重者大溫中丸熱多加苓連 溼多者茵陳五苓散加食積藥 溼熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪加山梔茵陳甘草
○戴云五疸者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量人虛實下其食積其餘但利小便為先小便利白其黃則自退矣

入方

小溫中丸 治疸又能去食積 蒼朮 川芎 香附 神麴 針砂

醋炒紅

春加芎夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾姜

大溫中丸 治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾虛者以參朮芍藥陳皮甘草作湯下

陳皮 蒼朮 厚朴 三稜 蓬朮 青皮 各五兩 香附 斤一 甘草 兩二 針砂 兩二 醋炒紅

右為末醋糊丸空心姜鹽湯下午後飯食可酒下忌犬肉菓菜

附脉理

脉訣舉要曰五疸寔熱脉必洪數其或微濇證屬虛弱

附諸方

茵陳五苓散

右用五苓散五分茵陳蒿末十分和勻先食飯後服方寸匕日三服 五苓散 見溼熱

當歸白朮湯 三因方 治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脉弦濇

後苓 三兩 當歸 一兩 白朮 三兩 黃芩 一兩 半夏 二兩 湯泡七次 茵陳 一兩 甘草 炙 枳實 去白 杏仁 去皮 前胡 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服

加減五苓散 濟生方 治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳 赤茯苓去皮 猪苓去皮 白朮 澤瀉各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

黃耆散濟生方 治黃疸

黃耆去蘆 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩 麥門冬去心 豆豉各一兩 甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分溫服不拘時

茵陳散濟生方 治黃疸

瓜蒌一兩 石膏一兩 甘草炙半兩 茵陳 木通 梔子仁各一兩 大黃炒半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服

葛根湯濟生方 治酒疸 枳實去白 梔子仁 豆豉各一兩 甘草炙半兩 葛根二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

秦光飲子濟生方 治五疸涉虛口淡咽乾發熱微寒

秦光去蘆 當歸去蘆 芍藥 白朮 官桂去皮 陳皮 茯苓去皮 熟地黃酒蒸 半夏湯泡七次 小蓀條遠志 川芎各一兩

甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

茵陳湯濟生方 治時行癰熱在裏鬱蒸不散通身發黃 茵陳二兩 大黃一兩 梔子仁三錢

右吹咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

搐鼻永蒂散拔萃方 治黃疸遍身如金色累效 永蒂二錢 母丁香一錢 黍米九粒 赤小豆半錢

右先將永蒂為末次入三味再碾至夜令病人先含水一口次將藥半字搐入鼻內待下或吐去水使睡至

半夜或次日取下黃水直候利水止即服黃連散或茵陳五苓散病輕者五日病重者半月見效

黃連散拔萃方 治黃疸大小便秘澀藏府壅熱 黃連二兩 川大黃二兩 醋二兩 炒黃芩去黑心 炙甘草各一兩

右為細末每服二錢食後溫水調下日三服

必效散 直指方 黃疸通用 葦薤 隔飲 龍胆草 山梔子 茵陳 黃芩

右等分每服一兩水二盞煎至一盞溫服不拘時

一清飲 危氏方 治疸證發熱諸熱通用 柴胡 三兩 赤茯苓 二兩 桑白皮 炒 川芎 各一兩 甘草 炙半兩

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎至一盞食前服

山茵陳散 直指方 梔子 茵陳 各一兩 枳實 七箇 茯苓 葦薤 甘草 各一錢半

每服一兩水二盞姜三片煎至一盞食前通口服

茯苓滲瀝湯 治黃疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱黃小便不利

白茯苓 五分 茵陳 六分 猪苓 澤瀉 黃連 黃芩 梔子 漢防己 白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳實 三分

右每服水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

一方 治黃腫及積滯浮腫 皂莖 半斤 醋 膠棗 二斤 煮 平胃散 四兩

右用棗搗爛入菴丸如梧桐子大以平胃散為衣每服三五十丸臨卧溫酒送下

一方 治遍身黃不浮腫手足急倦

針砂 水橘淨 陳皮 去白 蒼朮 去粗皮 青皮 去白 炒 百草霜 炒 三稜 煨 義朮 煨 各二兩

右為末麴糊丸如梧桐子大每服三四十九丸米湯溫酒下

一方 用絲瓜全者燒灰為末如病因麴傷麴湯下因酒傷酒調下數服

水腫 二十四

丹溪心法

○水腫因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾使脾氣得定則自健運自能升降運動其樞機則水自行

非五苓神佑之行水也宜補中行溼利小便切不可下用二陳湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬炒
梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴 氣不運加木香木通 氣若陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中
行溼二陳治溼加升提之藥能使大便潤而小便長 產後必須大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用
大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之 有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬 一方用山梔子去皮取
仁炒槌碎米湯送下一抄若胃熱病在上者帶皮用 治熱水腫山梔子錢五木香半錢白朮二錢 哎咀取急流
順水煎服 水腫用大戟香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水 大戟為末棗肉丸十九泄小水却快寔者
戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣寔者可下

附脉理

脉訣舉要曰水腫之證有陰有陽察脉觀色問證須詳陰脉沉遲其色青白不渴而瀉小便清澁脉或沉數色
赤而黃燥翼赤溺兼渴為陽

附諸方

麻黃甘草湯濟生方 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗 麻黃去根節四兩 甘草二兩

右哎咀每服三錢水一盞煮麻黃再滯後入甘草煎七分取汁慎冒風寒老人虛人不可輕用

五苓散方見溫熱 加木香茵陳 治水腫從腰以下俱腫以此湯利小便仲景曰腰以下腫宜利小便腰以上

腫宜發汗也

五皮散和劑方 治風溼客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮

右哎咀每服二錢水一盞煎至八分熱服不拘時忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑

白皮

葶藶木香散御藥院方 治暑溼傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶二錢半 木香五錢半 肉桂二錢半 滑石三錢半 猪苓二錢半 澤瀉二錢半 木通二錢半 甘草各半 白朮一兩

右為末每服二錢白湯下不拘時候

三茵當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝心火心火不能養脾土脾土不能制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透

經絡發為浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香煨 赤茯苓 當歸洗 桂心 木通 赤芍藥 牡丹皮 檳榔 陳皮 白朮各等

右咬咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

加味腎氣丸濟生方 治脾腎虛損腰重脚重小便不利

白茯苓去皮 附子炮 澤瀉 官桂不見火 川牛膝酒浸 車前子酒蒸 山藥炒 山茱萸取肉 牡丹皮去木

熟地黄半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

寔脾散濟生方 治陰水發腫用此先寔脾土

厚朴去皮 白朮 木瓜去 木香不見火 乾姜炮 各半 草果仁 大腹子 白茯苓去皮 甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

白朮木香散宣明方 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不能食小便閉者

白朮 猪苓去皮 甘草 澤瀉各半 官桂二錢 赤茯苓半兩 木香 檳榔各三錢 陳皮去白 滑石三兩

右咬咀每服一兩半生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服

聖靈丹拔粹方 治脾肺有溼喘滿風盛小便赤澀

苦葶藶四兩 防己二錢 赤茯苓二錢 木香 檳榔 木通 人參各二錢半

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下

導氣通經湯拔粹方 治脾氣有餘及氣不宣通面目手足浮腫

足本丹溪心法附餘

卷八 水腫

四 滄江海左書局印行

陳皮去白桑白皮 白朮 木香 茯苓去皮各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時霖雨時加澤瀉二錢

沉香海金砂丸拔粹方治一切積聚脾淫腫脹肚大青筋羸瘦惡證

沉香錢二海金砂半錢輕粉錢一黑丑末兩一

右用獨蒜泥丸每服三十九煎燈心通草湯下空心量大小虛寔

續隨子丸拔粹方治通身虛腫喘悶不快

人參 防己 赤茯苓炒木香 枳榔 續隨子 海金砂另炒各五錢 苦草慙四兩

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九桑皮湯下

退腫塌氣散聖惠方治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢腫而身熱宜用藥內消其腫自退

赤小豆 陳皮 蘿蔔子 甘草炙各五錢 木香炮二錢半

右咬咀每服一兩生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞食前服

○以上數方治陰水浮腫之劑

十棗丸 治水氣浮腫上氣喘急大小便不通 甘遂 大戟 芫花各等分

右為末棗煮熟去皮核杵爛為丸如梧桐子大每服四十丸清晨熱湯下以利去黃水為度不利次日再服

順氣丸又名氣寶丸聖惠方治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如鼓脚腫不能伸屈自頭至臍中瘦脊露

骨胸膈痞滿四肢無力

木香 茵香炒羌活 木瓜 川芎 當歸酒浸各一兩 黑牽牛兩二 地骨皮 枳榔 陳皮炒各一兩 大黃半兩

皂角四兩

右為細末熬皂角膏丸如梧桐子大每服五六十丸溫湯下食前一方無木瓜用生姜燈心煎湯下治一切

氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或大便秘脚氣入腹滿悶寒熱往來狀如傷寒並宜服之