

儒門事親卷之十五

戴人張子和著

新安吳勉學校

瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良薑 白芨 瀝青 已上各等分

右爲細末嚼芝蔴水同熬爲膏入冷水共定用緋
絹片火熨斗作膏藥貼瘡上

又方千年石灰 茜根燒灰

右爲細末用水調雞翎塗上

水沉金絲膏 貼一切惡瘡

瀝青 白膠 已上各一兩 春秋宜用油

夏宜油臍二錢半 冬宜用油蠟四錢

右件鎔開油蠟下瀝青白膠用槐枝攪勻綿子濾過入冷水中扯一千餘遍如瘡透了喫數丸作劑於瘡口填者亦妙攤紙上貼勿令火炙

乳香散 治下疳

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏魚骨

黃連 黃芩 銅碌 已上各等分 麝香少許

右爲細末先以溫漿水洗過貼疳瘡上

治蛇傷方

右用蒲公英科根作泥貼于傷處用白麵膏藥
之大効

紫金丹 治疔瘡

白礬 四兩

黃丹 二兩

右用銀石器內鎔礬作汁下丹使銀釵子攪之令
紫色成也用文武火無令太過不及如有瘡先以
週圍挑破上藥用唾津塗上數度着無令瘡乾其
瘡潰動取疔出也兼瘡顏色紅赤爲効如藥末成
就再杵碎炒令紫色

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡週迴用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤之用緋絹蓋覆如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之

千金托裏散 治一切發背疔瘡

連翹

乙兩二錢

黃耆

乙兩半

厚朴

乙兩二

川芎

乙兩

防風

一兩

桔梗

一兩

白芷

乙兩

芍藥

乙兩

官桂

乙兩

木香

三錢

乳香

三錢半

當歸

半兩

沒藥

二錢

甘草

乙兩

人參

半兩

右爲細末每服三錢用酒一椀盛煎三沸和滓
服膏子貼之

二聖散 治諸瘡腫

黃丹 二兩

白礬 一兩 飛

右爲細末每服乾摻瘡口上後用保生錠子捏作
餅子貼之

保生錠子

巴豆 四十九箇另研
文武火燒熟

金脚信 二錢 雄黃 三錢

輕粉 半匣 硃砂 二錢

麝香 二錢

右件爲末用黃蠟一兩半化開藥將和成錠子冷

水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖膏貼之神聖膏藥 貼治一切惡瘡

當歸

兩半

沒藥

錢三

白芨

半二錢

乳香

三錢

藁本

兩半

琥珀

半二錢

黃丹

兩四

木鱉子

五箇去皮

膽礬

錢乙

粉霜

乙錢

黃蠟

兩二

白膠

三兩

巴豆

二十五箇去皮

槐柳枝

一百二十條各長一把

清油

乙斤

右件一處先將槐柳枝下油內者焦取出次後下其餘藥物煮得極焦亦撈出却將油澄清再熬

膏子用緋絹上攤貼之

破棺丹

大黃

乙兩半

甘草

二兩

荆三稜

七兩半

山梔子

二兩半

牽牛末

二兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服半丸食後酒

半盞研化服之忌冷水

三聖散

治臙瘡疔瘡搭手背疽等瘡

葱白一斤

馬莧一斤

石灰一斤

右三味濕搗爲團陰乾爲細末貼瘡如有死肉者

宜先用潰死肉藥

潰死肉藥方

炊飯尖

半兩各三等

一等半兩入巴豆二箇

一等半兩

入巴豆三箇

一等半兩入巴豆五箇

各熬

作白錠子

右先用二巴豆納瘡如不潰再用納三巴豆又不潰用五巴豆者更用丹砂炒紅色摻瘡口追出清水其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖散貼之用膏藥傳之

治臙瘡久不愈者

用川烏頭黃蘗各等分爲末用唾津調塗紙上貼

之大有効矣

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之或爲細末貼之亦妙

又方 用臘月人中白燒灰油調塗瘡疥上

又方 以瓦松不拘多少陰乾爲末先用槐枝葱白

湯洗之過摻之立効灸瘡久不斂者更妙

又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺

替鍼尤 治一切惡瘡

川烏 二錢

草烏 二錢

五靈脂 二錢

輕粉 一分

粉霜 一分

又方 加班猫二十箇去足翅用

巴豆二十箇去皮用

右將三件爲末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入班猫巴豆以水調糊爲錠子如作散是謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡

懸蔓一箇 大黃乙兩 金銀花乙兩 當歸半兩

皂角刺乙兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者

加黍粘子

治附骨癰及一切惡瘡

當歸半兩 甘草乙兩 山梔子十二箇 木鱉子乙兩

右爲細末每服三五錢冷酒調服之

治諸惡瘡

白疆蚕

直者

大黃二味各等分

右爲細末生薑自然汁與蜜同和爲劑丸如彈子
大每服一丸細嚼

治惡瘡死肉銚子

巴豆

乙錢去
皮油

五靈脂

半兩

黃丹

二錢
飛

加枯白礬

乙錢

右爲細末以糊和丸銚子入瘡內用之

當歸活血散

治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人

產前後腹痛

當歸

二錢

沒藥

乙錢半

乳香

半錢

白芍藥

三錢

瘡瘍者加人參木香婦人如赤芍藥

右為細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服日二服婦人酒煎瘡既發不須用

董惡瘡方

紫花地丁

一名米布袋收

右取根曬乾用四箇半頭埽壘成爐子燒着地丁
用絲連埽一枚蓋了使令埽眼內煙出薰惡瘡出

黃水自愈

治蛇瘡

用蒲公英科根作泥貼于傷處用白膏藥封之

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣

乙箇

金色自然銅

半兩燒紅醋碎研為細末用之

乳香

二錢為細末用之

銅錢

重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細

金絲水蛭

乙錢半每箇作三截瓦上煨去氣道為度

沒藥

三錢研細

病為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得

出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入

少半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀

釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明

一宿自破便効如打折骨頭并損傷可用前項接
骨散半錢加馬兜苓末半錢同好酒一大盞熱調
連滓溫服如骨折損立接定不疼如不折了喫了
藥立便止住疼痛此方屢經効驗不可具述服藥
覷可以食前服食後服又外用接骨藥

陳爛麻根

兩把羊耳
朶乙對

亂絲

一握多者更妙

右取肥松節劈碎約量多少先熬三兩根於新瓦
上都於上外三味在上燒着存性就研爲末如生
再燒研爲度後入五靈脂或半兩如疼入好乳香
少許和藥如茶褐色爲度用布條子約纏一遭先

攤小黃米粥勻上撒上藥末勻纏定折處上又用軟帛三五重上又竹簞子纏勒得緊慢得中初三日換上一次再後五日換一次又七日再換上一次無有不接者

赤龍散 消散一切腫毒

用野葛桃根紅者去粗皮爲末新水調塗腫上頻掃新水

便癰方 本名血疔

牡礪 大黃 甘草 已上各半兩 懸菟 乙箇

右酒浸露一宿服之以利爲度

又方 冬葵子爲末酒調下三兩服

又方 皂角不蛀者燒過陰乾爲末酒調服立効皂
角子七箇水調服之亦効

又方 胡桃七箇燒過陰乾研爲末酒調服之不過
三服大効

又方 生蜜米粉調服休喫飯利小便爲度
治瘡無頭者

蛇退皮於腫處貼之

又方 皂角刺燒灰陰乾

右爲末每服三錢酒調嚼葵菜子三五箇煎藥

下大効

生肌歛瘡藥

白歛

定粉

各等分

黃丹

少許

右同爲細末洗淨瘡口乾貼之

治諸瘡水度腫者

生白礬末水調塗之自消

接骨藥

銅錢

半兩醋浸淬焦燒研爲末

木香

乙錢

自然銅

乙錢

射香

少許

右爲極細末如在上食後每服三匙頭嚼丁香一