


醫學入門

(下)



65431

編註醫學入門內集之首

目錄

首卷

集例

先天圖

天地人物氣候相應圖

明堂仰伏臟腑圖

用藥檢方總目釋方

音字

歷代醫學姓氏

原道統

陰陽

保養附導引

運氣

一卷

經絡

臟腑

觀形察色問症

脈訣

針道

灸法附煉臍

二卷 三卷

本草風類 寒類

熱類 瘡毒類

濕類 食治類

燥類 食治方

四卷

外感

溫暑

傷寒

六經正病 傷寒初症

表裏陰陽汗吐下 傷寒雜症

正傷寒 傷寒變症

類傷寒 瘧症

死症

危症

婦女傷寒

傷寒用藥賦

傷寒總方

內傷

內外傷辨

內傷辨

脾胃勝衰論

內傷總方

五卷

雜病

外感風類

濕類

內傷脾胃類

痰類

諸虛類

養老

寒類

燥類

氣類

鬱類

沉寒

瘡冷

暑類

火類

血類

積熱類

六卷

婦人經候

臨產

小兒形色脈法

胎毒類

外感類

外科癰疽總論

手部

背腰部

足膝部

產後

五臟虛實症

乳子調護法

內傷類

痘疹

條分腦頭部

胸腹部

臂腿部

遍身部

七卷

雜病用藥賦

八卷

婦人小兒外科用藥賦

雜病總方

通用方詩括

急救諸方

恆病

治法

習醫規格

湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者逍遙散加脫血入房
黃芩無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大槩肥人多氣弱有濕痰瘦人多血怯有火脫血入房

胞氣竭○少年大脫血或醉後入房氣或多或少產育過勞墮胎及多產育傷血或誤服汗下劑戕之不通天

概只如此○紅花當歸散紫葳散通經丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津

液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是求千金不調前後色何如○以期言之對期者性和血足

乞巧必死而後已○以上言經水不通以下言經水不調不調前後色何如○以期言之對期者性和血足

為害以色言之心主血陰從陽故以後期來少血不足○後期三五日者為血虛四物湯加參芪白朮陳皮

色紅為正雖不對期而色正者易調後期來少血不足○後期三五日者為血虛四物湯加參芪白朮陳皮

花肥人多痰二陳湯加南星蒼朮滑石芎歸香附○來少色和者四物湯點滴欲開潮煩脉數者四物湯

去芎地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香附丸內寒血溢來少或曰少五六日以上者四物湯加桃仁紅

花牡丹先期來多血有餘○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮丸加黃連白朮○來多或曰多五六

皮葵花先期來多血有餘○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮丸加黃連白朮○來多或曰多五六

日以上者內熱血散也○四物湯加蒼朮瘦人或前或後氣血亂○或前或後氣血亂○一月再至當歸散調經散散單丹參散淋瀝

有火者固經丸肥人多痰者清海蒼朮丸或前或後氣血亂○或前或後氣血亂○一月再至當歸散調經散散單丹參散淋瀝

不斷邪未疎○時行時止淋瀝下逆腹中作疼乃寒熱邪氣客於胞中留滯血海外寒也○如有積下利不定

腹痛者牛膝散○或行或止心痛者失笑散○經水適來過斷往來寒熱者先服小柴胡湯○加地黃後以四物

湯和之○有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芪有經行不止者四物湯加地榆阿膠荊芥熱者倍黃芩或

不通天

經丸風熱色紫甚則黑○淡因疫滯濕糲糊○色紫者風也黑者熱甚也○或淡白者虛也○或淡黃混濁糲糊者濕痰也○或成塊

生片色不變者氣滯也○或風冷乘之也○色變紫黑者血熱也○大槩紫者四物湯加防風白芷荊芥黑者

四物湯加蒼朮連香附淡白者古歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦

芩防風蒼朮如豆汁者四物湯加芎歸成塊者四物湯加香附玄胡外症潮熱內腹痛○月水循環繼病不

索枳壳陳皮隨症選用○通用琥珀調經丸百子附歸丸黑附丸外症潮熱內腹痛○月水循環繼病不

疼重則加之○咳血汗喘或瀉有潮汗則血愈消耗有咳嗽則氣往上行瀉則津偏於後疼則積結於中是

以必先治病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積寒

於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百病則骨熱於外溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者

外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為實虛者大溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者

滋血湯骨蒸者大胡連丸○大烏雞丸○五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者後發補心湯有汗者逍遙

散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加

生地便炒黃芩此乃能加減退熱聖藥有咳加桑白皮貝母結梗知母麥門冬咳血如生地山梔牡丹皮
嘔血如陳皮半夏旋覆花噎膈加薑炒黃連或芩連二陳湯尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料四錢加玄
便炒黃芩各一兩四

製香附一斤蜜丸服痛滯經前虛後呼此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯料四錢加玄
氣滯烏藥丸氣滯血瘀者大玄胡索散或四物湯加桃仁紅花莪朮玄胡索香附木香發熱加柴芩經水
將來陣痛陣止者為血寔四物湯加玄胡索木香黃連香附腿腹痛者內補當歸丸經水將行被風冷相
搏繞臍痛者乃寒氣客於血室大溫經湯桂枝桃仁湯經水日來時痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹
皮甘草○經後痛者為血虛八物湯小烏雞丸歷年血寒積結胞門嘔吐涎唾臍脇痛陰冷微引腰脊
而痛者酒煮當歸丸大溫經湯○通用水腫經前血腫後經水斷而後腫名曰血分乃瘀血化水閉塞胞
交加地黃丸滋陰百補丸之製香附丸

經散萆薢丸先浮腫而後經水不通名曰水分乃脾不能制水與水并浮肌肉為之虛腫紅瘡丸
通用腎氣丸水分若澤瀉加防已萆薢木通血分君壯丹皮如牛膝紅花有經閉脚腫者桑皮散血風身
痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或通達散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或慕夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長當抑肝
之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思昏惰怕見
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃

痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或通達散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或慕夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長當抑肝
之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思昏惰怕見
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃

痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或通達散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或慕夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長當抑肝
之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思昏惰怕見
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃

痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或通達散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或慕夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長當抑肝
之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思昏惰怕見
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃

痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

女扶陰抑寡居女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或通達散加山梔
連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰柏子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚
者抱胆丸經絕不通者五松散○寡婦鬱悶百端或慕夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心
火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗肝脈弦長當抑肝
之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸越鞠丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思昏惰怕見
明處惡聞人語至午後方可及頭昏腹痛驚惕勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
清神養榮四物湯加人參茯苓陳皮柴胡羌活甘草香附有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉
遲伏或如雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃

痛痺皮膚風濕熱甚也四物湯加蒼朮陳皮牛膝甘草水煎頭服服用蒼朮丸或蒼耳丸經閉身痛溺澀
蒼朮丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者通達散皮膚搔癢者四物湯加荊芥或蒼耳丸經閉身痛溺澀
麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症入
參荊芥散素虛者女金丹同養胃通心直要法胞內為經絡之海與手太陽小腸手少陰心為表裡起於
國公浸酒方胎前產後皆同

為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞傷損其中氣以血少不
行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也室

芩甘草
水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱。熱則流通虛溜。血熱則流。虛則溜。凡非時血行淋瀝不已。謂之漏下。虛多房勞挾火。

邪。經行犯房及勞役過度。損傷衝任。氣血俱虛。不能制約。經血忽然暴下。宜大補氣血。大溫經湯。氣虛者。

肝散。一切虛症。內火散虛火。涼血地黃湯。生地。黃芩湯。補陰丸。久者當歸。部骨丸。大小烏雞丸。熱則飲食不調。節。有因膏梁厚味。以致脾濕下流。於腎與。

真宜解毒。四物湯。涼血地黃湯。膠艾。四物湯。加黃芩。或單芩心丸。四物。坎離丸。固經丸。有因飲食失節。

火乘脾胃。下陷。顏容似無病者。外見脾困倦。煩熱不卧。等症。經水不時暴至。或適來通斷。只宜舉養脾胃。

加以鎮墜。心火之藥。補陰。瀉陽。或四氣香相侵。子宮為四氣相搏。則血亦難停。大舉風冷。搏動者。五積。

自止。升陽調經湯。升陽舉經湯。或因四氣香相侵。散去麻黃入醋煎服。或為不換金正氣散。加川芎。官桂。或。

四物湯。加荊芥。寒冷所乘。及年老久崩者。伏龍肝散。加附子。鹿茸。阿膠。蒲。

黃糯米糊丸服。暑月單芩心丸。或益元散。加百草霜。濕者。升陽除濕湯。或為悲憂心痛切。悲哀甚。則。

絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數泄血也。宜備金散。四製香附丸。烏藥湯。或橘歸丸。憂鬱因先富後貧。

先順後逆。心事不足。鬱火旺於血脈之中。宜四物湯。加香附。白朮。各一錢。地榆。黃芪。人參。各五分。升麻。二。

分。甚者。加棕櫚。反酒調服。心痛甚者。名殺血心痛小產。勢急須宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱。

後。道過多。心痛者。亦同用烏賊魚墨炒。為末。醋湯調服。勢急須宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱。

故道。道過多。心痛者。亦同用烏賊魚墨炒。為末。醋湯調服。勢急須宜止且行。經曰。陰搏陽謂之崩。言屬熱。

帶下

帶下赤白皆濕熱。臍腹痛甚濕熱結。經曰。小腹寬熱。泄出白液。寬者濕熱。屈曲凝滯。結於小腹。自脫上而。

頭昏目眩。口苦舌乾。咽嗝。大便或閉。或溇。小便便瀝。皆熱症也。如赤白病漏。一服。但不痛耳。問有病者。濕熱。

之繼以淡劑滲之或苦練丸大玄胡索散調之如臍腹病者
暫以辛溫開導如天溫經湯補經固真湯龜栢羌活丸是也熱多瘦婦必潮煩瘦人多熱脈數外症潮煩

兼痛風者二陳湯加蒼栢南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者蒼栢辛芎散兼七情者側柏栢皮丸白帶濕勝肥

黃痰作孽二陳湯加二朮升麻柴胡或蒼栢栢皮丸如結痰白帶淋瀝不已者先以小胃丹半飢半飽津

液下數丸候鬱積開服苓朮芍藥丸○通用五苓散合四物湯或單栢白皮炒為末酒糊丸血間有虛寒

虛加四物湯氣虛加參朮陳皮火動加黃栢滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹痛加乾薑間有虛寒

帶臌脰陰中冷痛何曾歇經因月水淋瀝不已或崩中暴下或經後去血過多以致陰虧陽竭榮氣不升

建中湯去桂加當歸水煎吞苦練丸久不止臍腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者補經固真湯大

烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯有火加黃栢有寒加桂附○寒始因亡血復亡其陽亡氣虛極

帶下腥臭多悲不樂附桂湯腹痛陰冷者四物湯加桂外感風邪傳各經臍脇若傷肝經青如泥色心經

附常用酒者當歸丸小烏雞丸益斯九琥珀調經丸一種白淫思慮切思無窮所願不得意淫於外

赤如紅津肺經白形如涕脾經黃如爛底腎經黑如血一種白淫思慮切思無窮所願不得意淫於外

血宜胃風湯或五積散去麻黃主之通用單地榆散一種白淫思慮切思無窮所願不得意淫於外

謂白物淫如白精之狀不可誤治白帶過服熱藥又有日夜流津如清米泔或如綿膠者謂之白崩與白

淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補鎖心丹因思傷脾胃者四七湯下白丸子或歸脾湯病久少

食者沉香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者室女胎產法相同室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或

金鎖正元丹小兒絲子丸威喜丸硫苓丸室女胎產法相同室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或

癥瘕與男子積聚條參看

癥瘕冷熱都是癥或因食積或鬱癥者堅而不走癥者堅而能移七癥八瘕經亦不詳雖有蛇咬蠶肉
以異於男子者皆因疾發及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生痰皆以挾痰
血而後成形要知癥瘕症瘕有瘕瘕食瘕血瘕食瘕血瘕瘕種不一盡皆痞塊之異名耳○經云大腸

移熱於小腸。小腸移熱於大腸。兩熱相搏。則血溢而為伏瘕。月事不和。以此推之。瘕瘕皆有熱者。若瘕血亦有熱。燥逼成。況陽氣怒火。蘊聚飲食。濕熱沸鬱。結成未可。專以寒冷論也。大藥虛冷者。內火散。琥珀丸。溫白丸。熱者消塊丸。連羅丸。外貼三聖膏。神仙阿魏散。久不愈者。猪肝丸。辰砂一粒。丹神聖代針散。血四物湯。加桃仁。並汁。甚者。如蜀血根。入玄胡粉。下之。故桂枝桃仁湯。外以韭菜搗餅。熨痛處。或煎痛丸。此散。散。食積。三後。煎得和丸。紅丸子。虛者。白木膏。補中益氣湯。熱者。天承氣湯。加黃連。芍藥。川芎。乾薑。甘草。或單黃連丸。小調中湯。加貝母。薑汁。糊丸。服。鬱氣。白葱散。蟬散。七製香附丸。當歸龍養丸。○痰飲。潤下丸。或二陳湯。加香附。枳殼。桔梗。痰食積者。白芥丸。海石丸。腹痛經閉。如懷胎。面黃寒熱。夢無數。瘕瘕得冷。則發。腹痛支滿。胸膈。腰胎之狀。邪氣甚。盛。令人恍惚。夜多異夢。寒熱往來。四肢不舉。陰中生瘡。甚者。小便淋瀝。或兼帶下。小腹重痛。面色黃黑。入於子臟。則絕產。入於胞絡。則經閉。宜入參。荊芥。散。不溫。經湯。道遙散。通經丸。古班丸。近用。○血與氣併。心腹痛。連腰脇。背脊甚。則搖搖。經候不調。謂之血瘀。玄。胡索。散。手拈散。失笑散。單乾膝丸。數症。因痰瘀氣積者。與上諸方通用。瘕瘕病治頗相同。瘕瘕在腹內。近條筋脈。急痛。如臂如指。如弦之狀。名曰瘕瘕。相搏。而成。或得冷。則發。腹脹不食。亦可懼。紅丸子。猪肝丸。小。時而痛。名曰瘕。皆陰陽不和。飲食停滯。冷氣相搏。而或得冷。則發。腹脹不食。亦可懼。烏雞丸。葱白散。腸覃可按血自通。腸覃乃寒氣客於大腸。與胃相搏。大腸為肺傳送。肺主氣。氣得熱。則行。得冷。則凝。凝則移。月事時下。或多或少。或氣病。而血未病。石症。塞胞經無路。女子瘕瘕。疝氣。發則腹痛。逆氣上衝。乃胞中傷也。宜二陳湯。加香附。以開之。或香粉丸。石症。塞胞經無路。損瘀血。結成。久則堅硬。如石。塞於子門。大如懷胎。月事不下。乃先感寒氣。而後血壅。不流所致。血瘕。石瘕。氣血瘕。散。聚湯。疝瘕。麝香丹。古硝黃膏。石瘕。見。丹主之。或通經丸。如紅花。尤妙。氣瘕。血瘕。堅如石。水瘕。腫滿。俱難治。蟲者。三虫聚。而食血之象。即瘕瘕之甚者。肚腹急硬。如石。腫滿。如水。乃瘀結。胞門。或產後。為水與血搏。通用四香散。千金桃仁煎。內消散。蝦蟇養者。肚法。抱聖丸。黃米丸。單腹蟲服者。大腹皮。散。救之。詳男科。腫。脹。調氣破血。漸消除。虛者。還宜補脾胃。善治瘕瘕者。調其氣。而破其血。消其食。而豁其痰。衷其大半。而止之。由名也。愈後。宜大小烏雞丸。八珍湯。交加。散。交加。地黃丸。調之。凡攻擊之。約病。重病。受病。輕。胃氣受之。而傷矣。或云。待塊消盡。而後補養。則胃氣之存也。幾希。

胎前

胎前清熱與養血。婦人無病。月事時下。乃能受孕。氣血充寔。則可保十月。保婉于母。無虛。若銜任不充。偶後受孕。或孕後。挾熱。及七情勞役。動火。輕則胎動不安。重則過三五七。月必墮。火能消物。故也。月分依宜。安胎丸。常服。以清其熱。熱清。則血循經。而不妄行。所以養胎也。諸云。胎前不宜熱。良有以哉。

經善調變 各經氣血多少虛實不調則胎孕不安 **一足厥陰二少陽** 夫人之有生也母之血室方開父之精血乘中氣自然旋轉不息如蠅螂之滾滾吞啖含受成一團圓瑛瑛九日一息不停然後陰陽大定玄黃相色外似繆絲瑪瑙其中自然虛成一家空洞虛圓與雞子黃中一火相似而團圓之外氣自凝結為胞衣初薄漸厚如彼米飲豆漿面上自結一皮中數日生從無入有精血日化從有入無九日之後次九又九月二十七日即成一月之數藏自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水謂之胚足履陰胎所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥○又三九二十七日期二月數此靈珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生火謂之胎足少陽胎所主也此月腹中或動或止不動猶可孤疑若逆吐思酸各曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一臟之虛如愛酸物乃肝臟三四胞絡止能養胎而虛也二三月月間忽心腹痛不安者用當歸三錢阿膠甘草各二錢蔥四莖煎服

三焦訣 又三九二十七日期三月數百日間變或男女形影如清鼻涕中有白絨絨相似以成人形鼻與肺所主胎最易動古苓水湯或為丸頓服最妙如無惡阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎為末一錢五更艾湯調服服後腹中不覺動者則為經病如覺微動者則為有孕或因驚恐墮胎氣不和轉動不能

膈腹疼痛者溫酒調下二錢如當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者古桂續丸○四月男女已分始受水精以成血脈形像具六腑順成手少陽胎所主多心腹膨脹飲食難消甚者用平胃散換白朮如香

附烏為大腹皮如因驚恐動胎下墜小腹脹引腰痛小便便赤痛下血者當歸湯四五 **五脾六胃七肺金** 月

始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生足太陰胎所主○六月始受金精以成筋骨口目皆成足陽明胎所主五六月胎不安者要胎飲固胎飲選用○七月始受木精以成皮膚形骸漸長九數皆成游其

左手手太陰胎所主如胎氣不安 **八手陽明成數穴** 八月始受土精以成皮膚形骸漸長九數皆成游其

常處者亦名阻病宜旋覆花散 **九手陽明成數穴** 八月始受土精以成皮膚形骸漸長九數皆成游其

炒為末米飲下止痛如胎肥大者索胎丸 **九腎十膀神氣完** 九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其

妙為末米飲下止痛如胎肥大者索胎丸 **九腎十膀神氣完** 九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其

胎內不可多服如胎肥大者索胎丸 **九腎十膀神氣完** 九月胎受石精以成皮毛百節畢備三轉其

須防三七月 服養氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於兩個月半後即服清熱安胎藥散貼以

防三月之墮至四個月半後再服八九貼防過五月又至六 **間有傷感并雜症** 常感風寒咳嗽頭痛發熱參

蘇飲去半夏熱服令肌體微潤而已風熱甚者雙解散去硝黃麻黃石膏○感寒胸滿咳嗽苦腹滿痛犬

便清者大正氣散去半夏加吳萸阿膠○感暑肚胃煩渴尿赤驚惕嘔吐臍下苦急者香茹散合古苓木

煩燥不宜人。或有積痰積飲滯於胸膈之間亦令煩燥胎動不安者用茯苓防風麥門冬黃芩等分竹葉減半水煎入竹瀝調服

子懸心腹脹滿痛胎氣湊心相火關。妊婦四五個月以來相火養胎以致胎熱氣逆湊心胸膈脹滿疼痛者古本湯倍甚則悶絕欲傷人而火感極一時心氣悶絕誤墮子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

白木加芍藥。甚則悶絕欲傷人而火感極一時心氣悶絕誤墮子死不能動此症兩尺脈絕者有誤服動

唇爪俱青全以舌為胎水遍身虛腫。妊婦經血閉以養胎胎中挾水濕與血相搏濕氣流溢挾冷面目症驗古考歸湯救之

引飲太過或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水血化為水所制宜五皮散倍加枳木。腹大異常亦堪憂

為君氣喘小便不利者防已散濕熱感者單山梔炒為末水所制宜五皮散倍加枳木。腹大異常亦堪憂

個月腹大異常高過心胸氣逆不安胎中蓄水所致若不早治必然其子手足軟短形。又有脚腫或出水

胞漿大盛故下流。妊婦七八個月以來兩脚浮腫頭面不腫乃胞漿水濕下流微腫者易產名曰微脚腫水出者謂之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者腎著湯手

脚腫者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸。

妊孕中風名子癇口因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有時昏暈胎難安。每遇風寒相搏發則口噤背強

痰涎壅塞昏暈不識人時醒時作謂之鬼暈又曰子癇又曰症甚則角弓反張。小續命湯如重者異羊角湯輕者四物湯加葛根牡丹皮秦艽細辛防風竹瀝痰加貝母陳皮茯苓甘草或古苔活散如中風寒犯

觸身體盡疼乍寒乍熱胎不安常苦頭疼痛遠勝下寒時時小便白如米泔或青黃寒燥腰若冷

痛目視瞠瞠者四君子湯去茯苓加當歸厚朴韭白薑煎入酒調服。不省人事者單劑於散

子淋溺澀膀胱熱。妊孕飲食積熱膀胱以致小便閉澀又謂之子淋宜古苔歸湯加木通天門冬人參甘草燈心臨月加滑石為君熱甚者五淋散

六君子湯。甚則大小便閉結四物湯加黃芩厚朴枳壳等分大腹皮甘草或半慈白煎服或或腎氣丸

六君子湯。甚則大小便閉結四物湯加黃芩厚朴枳壳等分大腹皮甘草或半慈白煎服或或腎氣丸

子瘖腹鳴自哭非

後即自能言○腹中作鐘鳴或哭者多年空房下鼠穴中土為末酒下或乾喻之即止

○腹中哭啼者黃連煎濃汁咽之或青黛亦可○有胎燭悲傷慘
不咽者大麥甘草煎服○有自哭自笑者紅窠燒存性米飲調服
發這動胎命必絕胎前患症用此藥動胎去血泄氣必

諸症濕痰風熱虛去邪保胎真口訣
孕婦脾土不運而生濕濕生痰痰生熱熱生風風生腫腫生熱熱生痰痰生風風生腫腫生熱熱生痰

過遊痰順氣峻風補虛或兼雜症
去邪保胎二云並行于子俱安
飲食禁忌亦須
雞肉合糯米食令子生寸白虫食大肉令子無聲
鯽同雞子食令子生疳蟬蟻食兔肉令子唇缺食羊

肝令子多兒食醬肉令子項短縮頭即子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子癩瘡淫肉同豆
胃令子生產子短食房蟹橫生食薑芽令子多指食水漿令絕產食產肉飲酒令子多淫無胎食莢始

消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合在米食啗胎食山羊肉令子多病食鰕鱔無鱔魚難產食諸般菌生

子當厚而天食之。時少步動和血脈勿勞力過傷使腎氣不足子必解顛轉女求男吉。

造化玄妙古法於胎成兩月之內以斧置孕婦床席下懸弓矢斧斤男子事也勿令人知此

意恐不信者令婦抱明之時以符置寧下盡是如雞古照李常令其子公大人亦止意也更何如竟

時游胎殺雖不可泥然門戶床竈寢不可輕易移動求歸者尤宜慎之

十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或口腰痛須臾產下何俟於催此易生天然之妙喜

名試水雞膽腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫惶惶切禁洗母動手於腹上揣摩直待日子已到腹痛

陣密破水已後并腰痛眼中如大方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早用力太過產母因卷及至尾端乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物凝

滯或疑石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產開雜之人驚恐產婦恐則精怯精怯則上焦關閉

氣衰者瘦胎散氣弱者達生散
血安胎示破漿漿水已破而少痛雖痛而不密宜安胎飲或達生

產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過眠過飽耳
破漿已久狂藥下散血虛者古方歸湯一名芍

壽學人門
卷六
賸座
六
一
元
金
之
國
下
人
位
者

黑神散氣弱者四君子湯下各四君黑神散橫逆側產每加麝一厘此時如舟在砂上浪湧水而後滑利可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水灘頭砂一斗炒熱將布紙於葱上輕輕畧擦滑利

迅速要相當 催生有靈頂順正而生猶邊帶者恐外感風冷寒暑所阻夏月熱產則氣散血沸宜五苓散能下及服黑神散藥又多用清油白芨等分醋肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五錢為末每二錢熱服有產難日久水乾及觸犯惡氣心煩燥悶者免腦丸腰痛心痛者用參乳香各二錢長砂五分為末難子清調薑汁化開冷服已上橫生露手徐徐推上上洗娘未轉產母用力一逼遂至橫來正產艱難之法已下橫逆側礙之法橫生露手徐徐推上上洗娘未轉產母用力一逼遂至橫來

當令產母安然仰臥洗母輕手徐徐推兜稍上漸漸以中指摩其肩推上又攀其耳而正之服歸血下散固血生血須待兜身正直且順臨門服阿膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後方可用手送下毫不得驚起服歸血散固血活血候兜自順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上

令兜頭一邊漸漸順下多服歸血散等藥直待兜身坐產露腎高攀手坐者先露其腎當高處攀手巾一轉門路正當然後用三退散調服方可用力送

屈足良久**喉面貼頂救盤腸** 盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布蓋住小腸不可包托外用醋半盞新

聖膏貼住母頭頂中心腸上即拭去內熱服參苓大補之藥加升麻防風以提之末有不收者又有

久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用磁石煎湯一盞服之其腸自收

碍產兜肩膊帶絆 碍者因兜身翻轉帶絆住其肩難露正頂而不能生當令產母仰臥洗母輕輕推兜

近上徐徐引手以中指托起兜頭下其膊帶眼固血仍須候兜身正順方可用力送

露額側來墜腰尻 側者因兜方轉身被產母用力一逼以致兜頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角

或露右額角兜頭偏墜一畔多服歸血散神散令產母仰臥洗母徐徐推兜近上以

手正其頭直向人門然後用力送下若是兜頂後骨偏墜穀道即令兜已露額當令洗母以綿衣炙令溫

煖用手於穀道外畔輕按推兜頭上而正之服催生藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能

傷產驚然口翻 當產誤用催生峻約傷母氣血急用安胎過日而產有種一下此非洗母輕手巧妙不能

包了燒存性入麝香一錢為末用秤秤燒紅滓酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之墨水裏兜身出或考歸益母草葵心皆能遂瘀以開產路○有坐草之時驚時口翻口嚔沫者霹靂丹○有履石女

東流水十盞煎至三盞去渣入阿膠三兩分二三次頻服能令生者安死者出
○通用霹靂丹奪命丸外用如聖膏貼足心仍服催生藥及通關散改單即下
氣信古方 皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣停久被外冷所乘則血溢脹胞而不出腹滿衝胸
輕信洗母用急疼者危急將臍帶以木物繫緊然後截斷不然則胞上抱心而死只要產母安心不可
服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈微甚八味黑神散黑龍丹

產後

產後必先須逐瘀

正產體寔無病不為可也但難產氣衰瘀血停留非藥不行古法一產後古方歸湯加
後上床仰臥不得側臥宜立膝不可伸足高枕厚褥四壁無風時以人為從心括至臍下如此三日又不
可太睡熟宜頻喚醒時置醋炭或燒漆乾與舊漆器以防血逆血暈夏月房中不可太熱亦不可人多氣
盛以致熱過則氣耗散而不能送血又不可太飽時與白粥飲之日漸加與一月之內針線勞役當時不
覺大害月後必成羸勞王脚及腰腿酸痛亦不可脫衣洗浴強起離床太早以致外感身強角弓反張各
日尋風如交合陰陽令下部終身虛疾將息百日以過乃可須知產後百病皆血
虛火盛瘀血妄行而已矣間有內傷飲食外感風寒然亦必先逐瘀補虛為主
瘀消然後補助後方

可行補如左脈弱加補血藥右脈弱加補氣藥如不逐瘀逐瘀
服參芪甘艾停滯之劑有瘀血攻心即死若食肉太早亦然
湯入童便甚者加炒乾薑人參汗多加黃芪或八味黑神散單五靈脂散返魂丹
散白薇湯○臨產用力勞心氣虛而暈者用人參一兩黑神散單五靈脂散入童便調服○胃弱血虛發厥倉公
上作暈者八物湯合二陳湯去白芍○火戟血上昏暈或挾風邪者清魂散○被驚者抱胆丸殊砂安神
丸○腹中疼痛全無是瘀血八味黑神散四味散失笑散有寒熱者當歸散○虛寒心痛者桂心湯感寒
者理中湯○七情心痛者木香湯○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義術○小腹痛者名兒枕痛單
五靈脂散或加桃仁醋糊為丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯

○通用女金丹
血虛火動寒熱 產後血虛發熱氣虛惡寒氣血俱虛發熱惡寒切不可發表○陰虛血
加味益母丸
弱者四物湯小熱加茯苓為君熱甚加炒乾薑為使去血過多外熱心
煩短氣悶亂者人參當歸散蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮天花粉發熱晝靜
夜劇者四物湯去芍藥量加柴胡氣血俱虛寒熱者補虛湯產後真不宜涼也
過度名曰羸勞其症虛羸乍起乍臥飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧臂膊拘急十
全大補湯去芍加續斷牛膝當歸甲桑寄生桃仁為末豬腎一對去脂膜薑一片藥三枚水二盞煎至一盞
入前末二錢葱三十烏枚半個荆芥五穗同水
煎空心服○身痛寒熱者當歸羊肉湯
食滯脾家瀉且吐 凡寒熱有腹痛者為瘀血如腹痛胸滿
嘔瀉必兼傷冷○食肉太早瘀滯者熟

○通利中湯
○七情心痛者木香湯
○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義術
○小腹痛者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸
氣虛四君子湯下血虛四物湯下
○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯

○通利中湯
○七情心痛者木香湯
○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義術
○小腹痛者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸
氣虛四君子湯下血虛四物湯下
○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯

○通利中湯
○七情心痛者木香湯
○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義術
○小腹痛者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸
氣虛四君子湯下血虛四物湯下
○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯

○通利中湯
○七情心痛者木香湯
○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加義術
○小腹痛者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸
氣虛四君子湯下血虛四物湯下
○產門臍下虛痛者天溫經湯羊肉湯