

醫元

聖戒

醫壘元戎

江陰朱氏校刊本

元 趙州王好古著

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆
中病卽止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯

若陽已虛尺中弱濇者復不可下之宜小柴胡湯

若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂

枝湯 若少陰病脈細沈數病在裏不可發汗宜當

歸四逆湯 若少陽病不可發汗宜小柴胡湯 若

咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗

已上六證並宜小柴胡湯 若下利清穀不可發汗

宜理中湯四逆湯之類 若四逆厥及虛家皆不可

吐厥者宜當歸四逆湯 虛宜附子湯 有熱人宜

黃耆人參建中湯 若少陰膈上寒乾嘔不可吐宜

小半夏加橘皮湯溫中丸 若咽中有動氣不可下

咽中閉塞不可下宜烏扇湯 若外實者不可下諸

四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯 虛

者宜附子湯 有熱宜黃耆人參建中湯 本虛攻
其熱必噦宜小柴胡湯 若脈浮而緊法當身疼痛
宜以汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少
故也宜小柴胡湯 若脈濡而緊濡則衛氣弱緊則
榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊衛氣冷微嘔
心內煩此不可汗宜小柴胡湯 若濡而弱不可發
汗宜小柴胡湯 若浮而大浮爲氣實大爲血虛小
便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應
衛家微可與小建中湯 若反更實津液四射榮竭

血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯 若

脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯 若脈浮而緊者不

可下而反下之爲大逆宜桂枝麻黃各半湯 若脈

數不可下宜柴胡桂枝湯 若下之必煩利不止宜

葛根黃芩黃連湯 若脈濇弱浮數不可下宜小柴

胡湯 若濡弱微濇微則陽氣不足中風汗出而反

躁煩濇則無血厥而且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣

龍骨湯 若結胃脈浮大不可下下之卽死宜小陷

胃湯 若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯 若

太陽發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證
不罷不可下之下之爲逆宜桂枝麻黃湯 若太陽
病有外證未解不可下下之爲逆宜桂枝麻黃湯
若病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而
反下之因作痞 結胃則有陷胃湯丸三痞則有瀉
心湯五 若太陽與陽明合病喘而胃滿不可下宜
麻黃杏子甘草石膏湯 若太陽與少陽合病心下
硬頸項強而弦者不可下宜小柴胡湯 若病欲吐
者不可下宜小半夏加橘皮湯 太陰腹痛吐食自

利腹痛下之必胃下結硬厥陰病渴氣上衝心中熱飢不欲食食則吐就下之則利不止若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中寒實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯若無陽陰強大便硬者下之必清穀腹滿宜用蜜煎導法若傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之則死宜四逆加人參湯若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也謂下也宜用

小柴胡湯

若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之宜

小柴胡湯

若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調

胃承氣湯

若色黃者小便不利也宜五苓散若

陽明病心下硬滿者不可攻之宜生薑瀉心湯半

夏瀉心湯

攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之

失只在先藥藥之錯則變生若汗下不差則永無亡

陽生黃畜血結胃痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急勞

等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之

初不犯也

太陽證

桂枝二十四方麻黃五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活

人雲岐子保命集載之詳者此不復重錄數書中所

無者并諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯 治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

生薑

切各三兩

芍藥

六兩

炙甘草

二兩

膠飴

一升

大棗

十二個

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠

飴令消溫服一升日三若嘔者加生薑若腹滿者

去棗加茯苓四兩若肺虛損不足痞氣加半夏五

大兩

中易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疔痛并四肢拘急疼痛甚者加

遠志半兩若或吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊

風入腹拘急切痛加附子七錢半若疝氣發作當

於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許若男子婦人

諸虛不足小腹急痛脇肋臃脹下虛滿胃中煩悸

面色痿黃唇口乾燥少力身重短氣腰背強痛骨肉
酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後
不復加黃耆一兩半 若婦人一切血氣虛損及產
後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸吸少氣小腹拘急痛
引腰背時自汗出不思飲食加當歸一兩名當歸建
中湯產後半月每日三服令人精壯

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥逆少腹瀉急或

腹滿弦急不能食起卽微汗出陰縮或腹中寒痛不

堪勞苦唇口舌乾精自出或手足作寒作熱而煩苦

酸痛不能當立此補中益氣

桂心 三錢

芍藥

黃耆 各二錢

甘草 炙

當歸

人參 各一錢

生薑 半兩

附子 五分

半夏 二錢半

棗 二枚

右咬咀水五盞煎至三盞去滓分三服

易簡杏子湯 治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛

勞咯血痰飲停積悉皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛 減半

乾薑 減半

甘草 炙

官桂 減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分 若脾胃素實者用粟殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此 若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆朮茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用

生薑棗水煎 婦人虛弱用 名美號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨瘠拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 芍藥 甘草 黃耆

當歸 川芎 人參 白朮

茯苓 熟地黃

各等分

右爲麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽竝弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯 治大人小兒冷風乘虛入客腸 胃水

穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如莖汁或下瘀血

日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮

各等分

右㕮咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

若加熟地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯

若虛勞嗽加五味子 若有痰加半夏 若發熱加

柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加附子 若寒甚

加乾薑皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者

用十補湯加柴胡二兩服之 若氣短加人參 若

小便不利加茯苓 若脈弦澀加川芎 若惡寒加

官桂 若脈濇加當歸 若腹痛加白芍藥 若胃

熱濕盛加白朮 若血瘀色紫者陳血也加熟地黃

若血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加

柴胡 若肌熱者加地骨皮 若脈洪實痛甚者加

酒浸大黃

潔古云防風為上使 黃連為中使 地榆為下使

千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘇葉

官桂

各半兩

烏梅肉

赤茯苓

各兩