

傷寒偏類方

徐靈胎醫書三十二種

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝去皮芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮去三升。適寒溫

桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云飴入於胃以

桂枝主皮毛汗所從出故粥充胃氣以達於肺也此解肌之法也

觀此可知傷寒不禁食矣。溫覆令一時許遍身熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病不必除若如水流漓則動榮氣衛邪仍在

若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令

三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑桂枝

湯全科謂之一劑三分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服不過如

此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見

過五錢零矣治傷寒大症分兩不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見

服藥得效者反令多服無效者即疑藥誤又復易方無往不誤矣

太陽中風陽浮而陰弱風在外故陽脉浮衛氣有

之收之甘草以緩之嗰嗰惡寒淅淅惡風寒風未有不惡寒者但惡寒甚

桂枝之辛以散之桂枝之辛以散之酸

似屬陽明乾嘔似屬少陽蓋三陽相近故畧有兼病但不甚耳

桂枝湯主之此桂枝湯總症

陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法

設若不上衝者不可與之此誤下之症誤下而仍上衝

桂枝發表若不上衝則其邪已下陷變病不當隨宜施治論中誤治諸法詳觀自明

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝

湯則愈此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛分留三呼風池二穴在顳後髮際者在頂上入髮際一寸大筋內宛中督脈陽維之會也刺入四

中足少陽陽維之會針入三分留三呼

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯病雖過期

桂枝湯病屬太

桂枝法  
陽仍不離

而後下也

太陽病外症未解者不可下也

此禁下總說

下之為逆欲解外者宜服

言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

須解外則愈宜服脉浮而下此為誤下後仍浮則邪不因誤下而和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾調和之和故又中言之

桂枝湯

衛和則愈宜桂枝湯自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正

無他病太陽諸症不必

他病

病

人藏無他病

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時之時發汗則愈宜桂枝湯主之

備而惟發熱自汗故亦

他病

病

人藏無他病

傷寒不大便六七日宜下頭痛有熱者未可與承氣湯按未可二字從金匱增入傷寒論失此

桂枝湯

其小便清者知不在裡仍在表也便赤為當須發汗若頭痛者必衄汗出而頭痛未解則

桂枝湯

傷

寒

人藏無他病

寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗

發汗未透故煩乃服藥不及之故

宜桂枝湯

傷寒醫下之續得下痢

清穀

腹痛

續得下痢

清穀

血

不止身疼痛者急當救裡此誤下之症邪在外而引之入陰故便清穀陽氣下脫可危雖表症未除

桂枝湯

後身疼痛清便自調者急當救表以扶陽為急而表症為緩也表裏分治而序不亂後人誤以一方治數

桂枝湯

症必致救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

桂枝湯

桂枝為驅風聖藥

提出邪風二字見

桂枝湯

人煩熱汗出則解又如瘧狀

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

虛浮者宜發汗一症而治法迥別全以脉為

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

人煩熱汗出則解又如瘧狀

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

先溫其裏乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯此節屬厥陰症未必由誤治

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

傷寒大下後復發汗再心

下痞。邪入惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

湯。苦寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯

二

桂枝湯原方加附子

皮破八片一放泡去

右六味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

太陽病發汗遂漏不止。

此發汗太過如水流瀉或藥不對症之故。中風本惡風汗後當愈今其人惡風仍惡風則表邪未盡也。

小便難津液少四體微急。

難以屈伸。四肢為諸陽之本急難屈伸乃津脫陽虛之象但不至亡。

桂枝加桂湯桂枝原方加桂二兩即另立湯名桂枝同附子服則能止汗回陽。

桂枝加桂湯

三

桂枝原方加桂

二兩治症迥別古聖立方之嚴如此

桂枝原方加桂

二兩

右五味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。

復感新寒。核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯。不特禦寒且制腎氣又藥味重

與桂枝加桂湯

重加桂皮破八片去桂不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚症此方可增減用之

桂枝去芍藥湯

四

桂枝湯原方去芍藥

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯

五

即前方加附子

一枚泡皮破八片去桂皮

餘依前法。

太陽病下之後脉促胸滿者。

中虛而表邪仍在

桂枝去芍藥湯主之。

太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯

六

桂枝湯原方加厚朴

二兩去皮

杏仁五十

桂枝湯原方去芍藥

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗。

桂枝湯原方加厚朴

二兩去皮

桂枝湯原方去芍藥

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗。

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳。本經杏仁主咳逆上氣。  
乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

太陽病下之危喘者。表未解故也。此湯主之。前

### 小建中湯

桂枝湯原方加膠飴一升。

右六味以水七升煮去三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服。

嘔家不可用建中湯以甜故也。

傷寒陽脉濇陰脉弦。中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濇而陰弦也。法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡

湯主之。治太陰不愈變而治少陽所以陳中湯以補心脾之氣蓋施子湯治

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之。悸而煩其為虛煩可知故用建

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八。

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此

多煎為妙取其味厚入陰地

發汗後身疼痛盡表未

脈沉遲已甚此湯主之。邪未盡宜表而氣虛不能勝散藥故

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服。此以一劑

發汗過多其人叉手自冒心下悸。欲得按者此湯主之。發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛

辨地則用真武湯矣。一症而輕重不同用方迥異其義精矣。

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤

桂枝四兩

甘草二兩

大棗十二枚擘

右四味以甘爛水一斗。

以水二斗揚之萬遍取用爛水大約取其動極思靜之意

按甘先

煮茯苓

凡方中專重之藥法必先煮

減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服。

發汗後其人脣下悸者欲作奔豚此湯主之

心下悸是擾胸中之陽脣下陰則因發汗太過上焦乾涸腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以制奔豚

桂枝麻黃各半湯

十一

桂枝

一兩十六錢去皮

芍藥

生薑

甘草

炙去節各一兩

麻黃

去節各一兩

大棗

四枚

杏仁

二十四枚去皮及雙仁者

右七味

以水

去滓

溫服六合

一云桂枝湯三

合麻黃湯三合頓服將患如上法

過如虛狀發熱惡寒熱多寒少邪已其人不嘔

非少清便欲自可無裏

一日二三度熱

漸輕

陽氣

退之象

脉微而惡寒者

此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也

此三

榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從

藥增醫者不審誤人多矣

面色反有熱色者未欲解也

餘邪尚鬱

以其不得小汗出自必痒宜服

微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足

方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分三服紙服四廄零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

桂枝二麻黃一湯

十二

桂枝

一兩十七錢去皮

芍藥

一兩六錢

杏仁

十六枚去皮尖

麻黃

十六錢去節

甘草

一兩二錢

生薑

一兩六錢

大棗

五枚

右七味以水五升

服桂枝湯大汗出脈洪大者

汗雖出而邪未盡

與桂枝湯如前法

此所謂邪不盡行復如法者也

若形如瘧日再發者汗出必解

此與麻黃桂枝各半湯意畧同但此因

桂枝二麻黃一湯主之

此與桂枝湯之意畧同但此因

大汗出之後故桂枝畧重而麻黃畧輕

桂枝二越婢一湯

十三

桂枝湯加麻

黃石羔二味



桂枝去皮甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解之總訣則陰氣獨治於下故重而痹其火邪上病從腰以下必重而痹名火逆也火氣

主之用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同

桂枝加葛根湯火逆下之又誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益

桂枝甘草龍骨牡蠣湯其陽則胸中益煩燥不寧矣桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強七八反汗出惡風者

氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯桂枝加葛根湯主之

桂枝湯原方芍藥加倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯桂枝加大黃一兩芍藥加倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥加倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本大陽病醫反下之因而腹滿時痛屬太陰也

引邪人於太陰故桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症

罷故仍用桂枝湯只加芍藥加倍以斂太陰之症

桂枝加芍藥湯主之此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加大黃湯主之此誤下因未而見太陰之症大實痛則

不盡然按活人書云桂枝湯自西北人時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之春末及夏至

前桂枝症可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後可加知母半兩石羔一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯一

麻黃湯類二

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升

此須多煮取其力專不僅為去上沫

止煮一沸矣去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥發汗也餘如桂枝將息法

羔黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛重因榮衛俱受傷故也

此痛處比桂枝症尤多而惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒

仁治端桂枝甘草治太陽諸症無一味不繫切所以謂之經方

太陽與陽明合病

見一二症即是不必全具也太陽病即上文所指者

喘而胸滿者不可下病俱在上焦

宜麻黃湯主之

之太陽合陽明也

喘而胸滿病延日久脉但浮者與小柴胡湯邪留少陽故與此湯

胸滿腸痛延日久脉但浮者與小柴胡湯若果邪在

證仍在表證即上此當發其汗宜麻黃湯服藥宜微除其人發煩目瞑陽鬱而不劇者必衄乃解血由肺之

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云

紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄所以然者陽氣重故也

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的

症經云諸緊為寒

用麻黃湯此亦從脉不從症之法帶弦今但浮則尚在太陽矣故仍

此明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄前段而解則不必復用麻

汗宜麻黃湯數爲陽氣欲出傷寒脉浮緊不發汗失因致衄者麻黃湯主之

前段而解則不必復用此湯

陽明病肝浮無汗而喘者陽明本脉大自汗今乃脉浮

無汗而喘則爲麻黃湯症矣發汗則愈宜麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二此即越婢湯

此二句明致喘之所由蓋喘未必皆由於水而致水則無有不喘者戒之

煮取二升去滓溫服一升

此即越婢湯

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石羔半觔碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥

煮取二升去滓溫服一升

此即越婢湯

既汗不可再汗汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者邪已輕也可與此湯石羔喘故用桂枝湯不得重傷汗出而喘故汗出而喘

此二句明致喘之所由蓋喘未必皆由於水而致水則無有不喘者戒之

下後不可更行桂枝

湯既下不可復汗若汗出而喘無大熱者可與此湯

### 大青龍湯

三此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥

麻黃六兩

去節桂枝去皮甘草二兩

炙杏仁四十枚

去皮尖生薑三兩

大棗十二枚

石膏碎如雞子

大一塊

桂枝

右七味以水九升

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之

少陰篇云脉

溫粉方明理論載白朮

薯本川芎白芷各等分入米粉和

勻撲之無薯本亦得後人用牡蠣

麻黃根鉛粉龍骨亦可

一服汗者停後脈汗多亡陽遂虛惡風煩燥

不得眠也

太陽中風脉浮緊

汗為陰脉故不易出

發熱惡寒

非惡身疼痛汗不出而煩躁者

熱鬱

大青龍湯主之

若脉微弱

則厥逆筋惕肉瞤

此為逆也

惡風乃桂枝症誤服

此則汗不止而有亡陽之象

汗出惡風者不可服

之則厥逆筋惕肉瞤

此為逆也

麻桂而用石羔何以發汗

如是之烈

葛麻黃湯麻黃用二兩

而此用六兩

越婢湯石羔用半觔

而此用雞子大一塊一劑之藥除大棗約共十六兩

以今秤計之亦重三兩有餘則發汗之重劑矣雖少加石羔終

按此方合

不足以相制也

少陰篇云脉

不足而此成聖人之意深矣

按此方即垂此戒

聖人之意深矣

按此方合

陰陽俱緊反汗出者亡陽也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者

大青龍湯主之

身有輕時為無少陰外症不厥利吐逆為無少陰裏症

此邪氣俱在外也

故以大青龍發其汗

按此條病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者

何必另有

投以青龍險峻之劑此必另有

主方而誤以大青龍當之者也

### 小青龍湯

四

麻黃去節芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝去皮各

三兩

五味子半觔

半夏半升

湯洗

右八味以

水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升

若微利者去麻黃加茺花如雞

子大熬令赤色

利屬下焦陰分

不可更發其陽

茺花明理論作茺花恐誤

本草茺花茺花

葉相近而茺花不常用當時已不可得故改用茺花以其皆有去水之功也

若渴者去

半夏加括萎根三兩

本草括萎根主消渴若噎者

古作鈎論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

半夏加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

輕者厄逆之去麻黃加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

水一小便不利少腹滿

去麻黃加茯苓四兩

輕者厄逆之去麻黃加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

去麻黃加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

去麻黃加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

去麻黃加附子一枚

炮本草附

水一小便不利少腹滿

故用若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源邪汗無微不到

茯苓傷寒表不解發汗心下有水氣即未出之汗乾嘔發熱而咳或渴或痢或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之以上皆水停心下現症其傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴凡水停心下服湯已即小青龍湯也渴者此寒氣欲解也欲去小青龍湯主之此倒筆法即指服湯已三字非謂欲解之後更服小青龍湯也

### 麻黃附子細辛湯五

少陰病始得之反發熱脉沉者此湯主之少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細詳審然後知其為病少陰發熱否則何以知其非太陽陽明之發熱耶又之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通陰始入之邪非麻黃不可况已有附子足以溫少陰之經矣

### 麻黃附子甘草湯六

麻黃去節二兩細辛一枝右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一斗日

甘草炙二兩附子一枚泡右三味先煮麻黃一兩沸少煮去上沫納諸藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也此當去上沫納諸藥煮取三升此當去皮此當去上沫納諸藥煮取三升此當去皮

解之理况二三日而無裏症則其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也

### 葛根湯類三

葛根湯一此即桂枝湯加麻

葛根四兩

麻黃三兩葛根四兩

生薑三兩

甘草二兩桂枝二兩

大棗十二枝

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根

主藥先煮減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥汗矣

餘如桂枝法將息及禁忌

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無麻

惡風則未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治身大熱大熱乃陽明之証也以太陽將入陽明之經故加此藥

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

葛根黃芩黃連湯

二

葛根半兩甘草二兩黃芩三兩黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去

渣分溫再服

太陽病桂枝症桂枝症即太陽

傷風之正病也醫反下之誤利遂不止邪下陷則脉促者表未解也

沈微等象故不利知必湧從兩經本症一一對勘即不下利而亦可定為合病矣

但嘔者葛根加半夏湯主之因表未解故用葛根固喘汗而利故用芩連之

葛根加半夏湯

三

葛根湯原方加半夏半斤先煎服法同

太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何從而

但嘔者葛根加半夏湯主之因表未解故用葛根固喘汗而利故用芩連之

半夏湯主之前條太陽誤下而成利則用芩連治利因其本屬桂枝症而脉促故止加葛根一味以解陽

明初入之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病

立方案各用理中等法

有法度

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡半兩黃芩人參甘草炙

生薑各三半夏半兩大棗十二

右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎此又一法取三升溫服一升日三服

此湯除大棗共二十八兩較今秤亦五兩六錢零雖

經故藥不宜輕去渣再煎者此方乃和解之劑再煎則藥性和合能

使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其煎法俱有精義

若胸中煩而不嘔者去半夏人參

葛根湯

柴胡湯

不確不必用半夏  
頓不可用人參

加括蔥實一枚

括蔥實除胸痞此

若渴者去半夏

半夏能滌痰溼

加人參生津合前

液

成四兩半括蔥根四兩治消

若腹中痛者去黃芩

苦加芍藥三兩除腹

痛若腹中痞硬去大棗

補脾胃加

牡蠣四兩

別錄云治下痞熱

溫覆取微似汗愈若欲者去人參大棗

二味與生薑去生薑加乾薑故

加五味子

論中凡可通用之方必有加減法

半升乾薑二兩

古方治嗽五味甘薑必同用一以散寒邪一以散正氣從無單用五味治嗽之法後人

風火痰涎深入肺藏永難救療矣又按小柴胡與桂枝二方用處極

多能深求其義則變化心生矣論中

此條申明所以往來寒熱及不欲食下痛上

填鬱或心下悸有

血弱

加桂枝三兩

留太陽微熱則那

溫覆取微似汗愈若欲者去人參大棗

二味與生薑去生薑加乾薑故

加五味子

論中凡可通用之方必有加減法

欲飲食

木邪心煩喜嘔

太氣上逆或胸中煩而不嘔或

身有微熱少陽或腹中痛土木相

或胸下痞硬木氣或心下悸有

血弱

傷寒五六日

正當傳少陽之期

中風往來寒熱

太陽之寒熱寒時亦熱熱時亦

胸脇苦滿陽之意

少默默不

半升乾薑二兩

不知用必有害况傷熱勞怯火倉與此處寒飲犯肺之症又大不同乃獨用五味收斂

又按小柴胡與桂枝二方用處極

多能深求其義則變化心生矣論中

此條申明所以往來寒熱及不欲食下痛上

填鬱或心下悸有

血弱

氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下

正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連

其痛必下邪高痛下故使嘔也

因正衰邪入藏府相牽所致則立方之

意可推而知矣

此湯主之

少陽所現之症甚多柴胡湯所治

服柴胡湯已渴者屬陽明也

以法治之此必先見少陽之症故用柴胡

湯服後而渴則轉屬陽明矣

未盡或欬者肺有

此湯主之少陽所現之症亦不

一加減法具載方末

血弱

脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

詳見桂枝類中

少陽與太陽陽明相為出入一

凡柴胡湯病證而下之誤

若柴胡證不罷者復與柴胡

治之

湯凡誤治而本

證未罷仍用本証可兼治矣

他經盡同不獨柴胡証也

必蒸蒸而振却發熱汗出而解

都已陷下故必振動而後能達於外辨

脉法篇云戰而汗出者其人本虛是以

是現裏

脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

詳見桂枝類中

少陽與太陽陽明相為出入一

凡柴胡湯病證而下之誤

若柴胡證不罷者復與柴胡

治之

便是不必悉具

此是太陽與太陽陽明相為出入一

陽所同陽所獨手足溫而渴者

滿則雖似陽明不作陽明此因脇下

凡柴胡湯病證而下之誤

若柴胡證不罷者復與柴胡

治之

湯之方他經盡同不獨柴胡証也

必蒸蒸而振却發熱汗出而解

都已陷下故必振動而後能達於外辨

脉法篇云戰而汗出者其人本虛是以

是現裏

此少陽

以湯利之不復以症藥亂

此本柴胡症下之而不得利今反利者

知醫以丸藥下之非其治也

九藥利之是為重傷

則仍從少陽而出邪

傷寒十三日不解過經

二候胸脇滿而嘔的病

此少陽

日晡所發潮熱

此以已而微利又現裏



脉浮者以汗解之。脉沉實者以下解之。復症之中更當考此二脉如果脉見浮象則邪留太陽當用汗法

之法不一醫者於麻黃桂枝及承氣大柴胡等方對症之輕重擇而用之則無不中病矣。

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼煩。以上太微嘔心下支結。以下少外症未去者。為外症。柴胡桂枝湯主之。

愈。桂枝湯和榮衛。柴胡湯通津液深著。二湯合用之功效而陽亡可復矣。

柴胡加龍骨牡蠣湯

四

柴胡 龍骨

生薑

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡礪

桂枝各一  
兩半

半夏二合 大棗六枚 大黃二兩

右十二味。以水八升。煮取四升。納大黃更煮一二沸。

大黃只煮二沸。取其生

利也。而流去滓。溫服一升。

傷寒八九日。下之即陷胸滿。

柴胡煩驚。龍骨牡蠣小便不利。入裏而復外擾。三陽故現症錯雜。藥亦隨症施治。

真神化無方者也。

接此方能下肝膽之驚痰。以之治癰癧必效。

柴胡桂枝乾薑湯五

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑

牡礪熬

甘草各二兩 黃芩三兩 括囊根四

兩半 右七味。以水一斗二升。煮

取六升。去渣。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

邪氣已深。一時不能即出。如蒸而振發。熱汗出而解之類。

不渴。微結。小便不利。渴

以上皆少陽症。

湯故用括囊。

而不嘔。故去半夏生薑。但頭

傷寒五六日。已發汗而復下之。一誤胸脇滿。用牡蠣微結。小便不利。渴

汗出。陽氣上逆。往來寒熱。用柴芩下煩者。黃芩杜礪。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

柴胡加芒硝湯六

柴胡湯原方加芒硝分兩各不同

柴胡二兩 十黃芩

甘草

人參

生薑各一

半夏二十

大棗四枚

芒硝二兩

右八味。以

水四升。煮取二升。去渣。納芒硝。更煮微沸。分溫再服。不解更作。

不解不大便也。此藥劑之最輕者。以今評計之。約二兩分二服。則一服止一

加芒硝。乃合用調胃承氣也。皆少陽陽明同治之方。

兩耳按大柴胡湯加大黃枳實乃合用小承氣也。此

柴胡湯湯加大黃。皆少陽陽明同治之方。

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。本草芒硝治六府積聚。因其利而復下之。

梔子湯類五

梔子豉湯

梔子枝山香鼓綿裏分

服得吐止後服

具治此  
用上藥  
米焦公

之藥皆然

誤而正氣已傷矣。虛煩不得眠。

邪因正氣不充，留於上焦，故陽氣擾動而不能除者，吐不得眠也。若虛

者必反覆顛倒心中懊惱心中懊惱真心不得安

靈也。梔子豉湯吐之，氣無不出矣。農摩一按：汗吐下之後，而邪未除，則此病也。

寫病狀不存經而存脈者詳切。凡醫者之於病人必事事物故。

體貼如若身受之而後用藥無誤。發汗若下之而煩熱則吳其病也。吉禹之說大得之。

**中室者**煩等象為稍寔，虛樞子豉湯主之。宜

傷寒五六日大下之後治身熱不去心中結痛者欲解也  
可以小茴陶蓋小茴陶症乃心下痛胸中在心之

外內之邪俱未解，樞子豉湯主之。按腹中室上故不用桂枝。

陽胸何以不用湯心諸法蓋渴心症乃心下諸法痞為無形痛

為有氣故不失毫釐即上心亦古不踰病非但分寸也。

明病脉浮而緊。咽噪口苦。胸滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。以火通。

以上皆陽明本症非因誤治而得者若發汗則躁心憤

**賁反識語**汗多若加燒十必惱陽躁不得眠即日少  
以前日同王大夫令竟一夕不寐向乃要欲去上白有白

意若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹

故病不解。各有所宜，現症以如今此序。舌上胎者，胎則胸中有物而可用，無胎者，則口與農氣一、二。

結恐無物可吐也。梔子豉湯主之。陽明病。

下之其外有熱未盡手足溫不終脹邪心中恍恍食不能入者寒帶之象為宜更少其

食癰延停結但頭汗出欲洩不洩梔子豉湯主之

下利後更煩按之心下濡者非寒非痛也

**梔子豉湯**