


庫



門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

效逆

翻胃

嘈雜

闕格

麁氣

痰熱門

瘰

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

大門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癰

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風

胃風

痛風

脈節痛

肩背痛

痺

癘風

血風瘡

身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿

肺癰

霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

咳氣

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

痰熱

哮喘

喘

惡心

嘔吐

咳逆

翻胃

嘈雜

關格

癰氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血
瘕

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之二

一集

外感門 下

中暑 五 附暑風 注夏

丹溪心法

○暑證用黃連香薷飲 挾痰加半夏南星 如虛加參芪 暑病內傷者用清暑益氣湯 暑氣一作是痰

用吐 注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱者是宜補中益氣湯去柴胡升麻加炒栝白芍

藥挾痰者加南星半夏陳皮煎服又或用生脉湯 暑風挾痰挾火實者可用吐法

暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辨或腹痛水瀉者胃與大腸

受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯蓋黃連退暑熱香薷消蓄水或

身熱疼頭躁亂不甯者或身如針刺者此為熱傷在內分也當以解毒湯白虎湯加柴胡如氣虛者加人參

此為傷暑或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉數者熱在肺經用清肺湯柴胡湯天水散之類急治則可遲則不

救盛火乘金也此為中暑凡治病須要明白辯別慎勿混同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方妙為

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎

燥所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞碍心之竅道則手足不知動躍而卒倒也此

二者皆可吐內經曰火鬱則發之吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

入方 治暑渴

生芩

麥門冬

牛膝

炒栝

知母

葛根

甘草

右剉水煎服

附脉理 脉訣舉要曰暑傷於氣所以脉虛絃細孔遲體狀無餘

附諸方

足本丹溪心法附餘

卷二 中暑

一 范江海左書局印行

黃龍丸 治伏暑發熱煩渴嘔吐惡心

黃連 二斤 右以好酒五升煮乾為末麪糊丸梧子大熱湯下三十丸

玉露散 張子知方 治暑渴

寒水石 滑石 石膏 枯樓根 各二兩 甘草 一兩 右為細末每服五錢新水調服

枇杷葉散 和劑方 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉 去毛 香薷 七錢半 白茅根 麥門冬 去心 甘草 炙 乾木瓜 各一兩 丁香 陳皮 去白

厚朴 去皮薑 汁炙 右為末每服二錢水一鐘薑三片煎服 如止渴燥去丁香加知母冷水調下

以上諸方止渴之劑

生脉湯 生津止渴

人參 麥門冬 五味子 右剉水煎服

人參白虎湯 徐同知方 治伏暑發渴嘔吐身熱脉虛自汗

人參 一錢半 知母 二錢 石膏 半兩 甘草 一錢炙

右以咀入粳米一合水二鐘煎至一鐘不拘時熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎伏熱後或冷水

沐浴或喫冷物清氣在脾不覺散今日晡作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

竹葉石膏湯 治伏暑內外發熱煩躁大渴見濕熱賴

以上諸方補虛止渴之劑

香薷飲 和劑方 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之 一方加黃連四兩用薑汁同炒令老黃色名黃

連香薷飲 如有搗搗加羌活煎服 厚朴 去皮薑汁炙 白扁豆 微炒 香薷 去土

右以咀每服三錢水一鐘入酒少許煎七分沉冷不拘時服熱則作瀉香薷須陳者佳

五物香薷飲 直指方 驅暑和中通用

香薷

上土白扁豆

厚朴

甘草

白茯苓

右吹咀每服五錢水二鐘煎至一鐘去滓溫服

二香散

治暑溼相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

見霍亂類

香薷縮脾飲

直指方

驅暑和中除煩止渴

縮砂仁

草果仁

烏梅肉

香薷

甘草

炒各兩

白乾葛

白扁豆

右剉每服三錢生薑五片水煎去滓微溫服

縮脾飲

和劑方

消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁

四兩乾葛二兩

白扁豆

烏梅肉

草果

炒去殼

甘草

炙各四兩

一方無乾葛有乾薑

右吹咀每服四錢水一大碗煎七分以水沉冷服

卻暑散

治胃暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄痢煩渴背寒面垢

赤茯苓

生甘草

各四兩

寒食麴

生薑

右為末每服二錢白湯調下

大順散

和劑方

治胃暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草

三斤乾薑

杏仁

去皮共

肉桂

去皮各六兩四錢

右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾薑同炒却入杏仁候杏仁不聲為度作用篩篩淨後入肉桂一處搗羅為末每服三錢水一鐘煎至七分溫服如煩躁并花水調下不拘時候以沸湯點服亦可

廣按寒則傷形熱則傷氣何以言之人與天地同一橐籥夏月天之氣浮於地表則人之氣淫於肌表况被盛暑所傷膚腠踈豁氣液為汗發洩於外是表裏之氣俱虛矣不善攝生者暑熱傷於外生冷戕於中若之何而能運化是以水穀停積而為溼熱發為嘔吐為泄瀉甚則吐瀉俱作而揮霍悶亂也若不即病溼熱拂鬱於內他日為瘧為痢之所由起矣今大順散非治暑熱之藥乃治暑月飲食過多之劑也歟

以上諸方消導之劑

香朴飲子

聖惠方

治大人小兒伏熱吐瀉虛煩作亂

足本丹溪心法附錄

卷二

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

中暑

人參 去芦

茯苓 去皮

甘草 炙

紫蘇葉

木瓜

澤瀉

香薷 去土

半夏 湯泡七次

白扁豆 炒

陳皮

烏梅肉

厚朴 各四兩

右咬咀每服一兩水二鐘生薑三片棗一個煎至一鐘食前熱服

六和湯 和劑方 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛身浮腫

嗜卧倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分胃暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎產中亦可服

縮砂仁

半夏 湯泡七次

杏仁 去皮共

人參

甘草 炙各一兩

赤茯苓 去皮

藿香葉 去土

白扁豆 姜炒

木瓜 各二兩

香薷

厚朴 姜汁製各四兩

右咬咀每服一兩水二鐘生薑三片棗子一枚煎至一鐘溫服

十味香薷飲 百一選方 消暑氣和脾胃

香薷 一兩

人參 去芦

陳皮 去白

白朮

黃芪 去芦

白扁豆 炒去殼

甘草 炙

乾木瓜

厚朴 去皮姜汁炒黑色

白茯苓 去皮各半兩

右為末每服二錢熱湯冷水任調下

清暑益氣湯 東垣方 治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神減少懶於動作胸滿氣促支節疼痛或氣高而

喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便秘澀而頻或痢或渴不思飲食自汗體虛

黃芪

蒼朮 米泔製

升麻 各一錢

人參

白朮

神麴

陳皮

甘草 炙

黃柏

麥門冬

當歸 各三分

葛根 二分

五味子 九粒

青皮 二分半

右咬咀作一服水二大鐘煎至一鐘去滓大溫服食進

以上諸方補虛消導之劑

消暑丸 和劑方 治伏暑引飲脾胃不和

半夏 一斤

甘草 生用

茯苓 去皮各半斤

右為末薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸熱湯下

解暑三白飲 和劑方 治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉

白朮

白茯苓 各等分

右咬咀每服四錢水一鐘姜五片燈心十莖煎分八不拘時服

五苓散 和劑方 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如心神恍惚加辰砂如桂分兩又名辰砂五苓散

方見溫熱

加味五苓散 濟生方 治伏暑熱二氣及胃溼泄瀉注下或煩或渴或小便不利

赤茯苓 去皮澤瀉 猪苓 去皮 白朮 各一兩 官桂 不見火 車前子 各半兩

右呖咀每服四錢水一鐘姜五片燈心十莖煎八分不拘時候服

益元散 御藥院方 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘積熱又淡能滲溼故利小便而散溼熱也 見溫熱

桂苓甘露飲 御藥院方 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利

白茯苓 去皮 白朮 去皮 猪苓 去皮 滑石 研各二兩 寒水石 研 甘草 炙 澤瀉 各一兩 肉桂 去皮半兩

右為末拌勻每服二錢熱湯冷水任下入蜜少許尤妙

桂苓甘露散 張子和方

官桂 半兩 人參 去芦半兩 藿香 半兩 茯苓 去皮 白朮 炙 葛根 澤瀉

石膏 寒水石 各一兩 滑石 二兩 木香 二錢半 右為細末每服二錢白湯下新水姜湯亦好

桂苓白朮散 宣明方 治胃暑溼熱吐瀉轉筋腹痛小兒亦可服

官桂 去皮 白朮 猪苓 各五錢 茯苓 去皮 澤瀉 各一兩 甘草 炙 石膏 寒水石 各二兩

滑石 四兩 右為末每服二錢熱湯新汲水或生薑湯調下劉廷瑞方不用猪苓

以上諸方利溼清熱之劑

龍鬚散 一名甘草散 聖惠方 治中暑迷悶不省人事及泄瀉霍亂作渴一服即愈亦能解諸毒

白礬 生一兩 五倍子 生一作五味子 烏梅 槌去仁 甘草 一兩半炙 飛羅麩 明日起尤佳

右為末入飛羅麩拌勻每服二錢新水調下 一方如柯子肉滴水為丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石

硫黃 各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸如梧桐子大每服四十九丸新汲井花水下

來復丹 和劑方 治上盛下虛伏暑泄瀉如水

硝石

一兩同硫黃為末入鍋內以微火炒用柳條攪

船上海黃

通明者

太陰玄精石

研飛

五靈脂 水澄過

硝石

不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

右先用五靈脂陳皮青皮為末次入玄精石末及二氣末拌勻好醋打糊為丸

如疏豆大每服三十九空心米飲送下

大黃龍丸

百一選方

治中暑身熱頭疼狀如瘧疾或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃

硝石 各一兩

白礬

滑石

各半兩

雄黃

半兩

白麴

四兩

右五味研末入麴和勻滴水丸如梧子大每服三十九丸新水下

廣按以王三方皆劫劑也夫暑熱流金燦石人到其時膚腠開豁氣液耗散而煩渴縱飲寒涼而不顧況氣液為汗發泄於外其中虛矣所以不能化水穀而停積膠固於內發為嘔吐泄瀉腹痛頭疼身熱諸證非石藥其性燥悍而能開散之乎

以上諸方攻散暑毒之劑

暑病治例

出明醫雜著

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包絡之經其脉虛或浮大而散或細絃乳遲蓋熱傷氣則氣消而脉虛弱其為證汗煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平木搖撼不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不醒而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉利此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然治法不同也

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚火熱必大

渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類暑熱發渴脉虛用人參白虎湯見前或用竹葉石膏湯亦好見溫熱東垣清暑益氣湯治長夏溼熱

蒸人人感之四肢困倦精神少胸滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗脉虛此湯最好見前若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大廈涼臺

冷館大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘節肢急疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類

若外既受寒內復傷水水生冷瓜果之類前藥再加乾薑縮砂神麴之類此非治暑也治因暑而致之病也若外不受寒止是內傷水水冷腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲見前或理中湯見中寒類加神麴麥芽

縮砂蒼朮此專治內溫中消食也

若吐瀉脉沉微甚者不可用涼藥可用大順散見前加熟附子等分或附子理中湯加炒芍藥夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治溼利小便之藥醫者要識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾為主於前陰陽二條內相兼取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃柏葛根是

清暑補氣也蒼朮神麴陳皮澤瀉青皮是治內補脾也

治暑風卒倒法凡人中暑先著於心一時昏迷切不可與冷水飲并臥溼地其法先以熱湯灌或童便灌及用布蘸熱湯熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其醒省然後進藥若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處

掬路中熱灰土作窩於臍中令人尿其內即甦却灌以人尿或攪地漿飲之半碗或車輪土五錢冷水調澄清服亦可一方用大蒜三兩瓣細嚼溫湯送下禁冷水即愈

補中益氣湯見內傷類

清肺湯見咳嗽類

足本丹溪心法附餘

卷二 中暑

四 泥江海左書局印行

丹溪心法

本草云蒼朮治溼上下部皆可用 二陳湯加中酒苓羌活蒼朮散風行溼 脾胃受溼沉困無力怠惰好卧
去溼痰宜用白朮 上部溼蒼朮功烈 下部溼宜升麻提之 外溼宜表散 內溼宜淡滲 若燥溼以羌
活勝溼湯平胃散之類 若風溼相搏一身盡痛以黃芪防已湯 若溼勝氣實者以神佑丸舟車丸服之氣
虛者桑皮茯苓人參薤木香之類 凡肥人沉困怠惰是溼熱宜蒼朮茯苓滑石 凡肥白之人沉困怠惰
是氣虛宜二朮人參半夏草果厚朴芍藥 凡黑瘦沉困怠惰者是熱而宜白朮黃芩 凡飲食不節脾胃受
傷不能遞送宜枳朮丸 去上焦溼及熱須用黃芩瀉肺火故也又如肺有溼亦宜黃芩如肺有虛熱宜天門
冬麥門冬知母用黃芩多則損脾 去中焦溼與痛熱用黃連瀉心火故也如中焦有實熱亦用黃連若脾胃
虛弱不能運轉而鬱悶宜黃芩白朮乾葛若中焦溼熱積久而痛乃熱勢甚盛宜黃連用姜汁炒 去下焦溼
腫及膀胱痛併有火邪者必須酒洗防己黃柏知母龍膽草又云凡下焦有溼草龍膽防己為君甘草黃柏為
佐如下焦腫及痛者是溼熱宜酒防己草龍膽黃柏蒼朮 若肥白氣虛之人腫痛宜二朮南星滑石茯苓
黑瘦之人下焦腫痛宜當歸桃仁紅花牛膝枳榔黃柏

戴云溼有自外入者有自內出者必審其方土之致病源東南地下多陰雨地溼凡受必從外入多自下起
以重腳腿氣者多治當汗散久者宜疎通滲泄西北地高人多食生冷溼麵重酪或飲酒後寒氣怫鬱溼不
不能越作致腹皮脹痛甚則水鼓脹滿或統身浮腫按之如泥不起此皆自內而出也辨其元氣多少而通
利其二便責其根在內也此方土內外亦互相有之但多少不同須對證施治不可執一

附脉理

脉訣舉要曰或濡或細或濡或緩是皆中溼可得而斷

附諸方