

新刊西學集成

新刊醫學集成卷之三

後學 義烏 傅滋 續註

○內傷第七

王節齋云東垣以飲食勞倦所傷為內傷不足之病謂因傷於失飽傷於脾胃所致蓋人之所藉以為生者脾胃為本必賴飲食資養若調養失宜勞役過傷失其所養則脾胃氣虛不能升達降下陰分而為內熱非有飲食停積不化鬱發為熱用補中益氣等藥若飲食停積不化鬱發為熱乃是不足之中微之有餘此為飲食所傷宜消導之或先因勞役而後傷於飲食或先傷飲食而後犯於勞此皆不足之中兼之有餘須於數者之間審察明白可也

脈法

大而無力為內傷氣口大於人迎重者至二倍

三倍或右關損弱甚則隱而不見惟內顯脾脈大數

微緩時一代者是

丹溪云東垣內外傷辨甚詳按東垣論人迎脈大於氣

迎為內傷外傷則寒熱迎作而無間內傷則寒熱間

作而不齊外傷惡寒近烈火不能除內傷惡寒得

就溫後則解外傷惡風乃不禁一切風寒內傷惡風

惟惡夫寒少賊風外傷左頤在鼻故鼻氣不利而壅

或有力內傷者不熱內傷在口故口不知味而

腹中不和外傷無此外傷則邪氣有餘故發言壯厲

且尤輕而後重內傷則元氣不足出言懶怯且先重

而後輕外傷手背熱手心不熱內傷則手心熱手背

不熱東垣辨法大要如此有內傷而無外感有外感

而無內傷者以此辨之則別然次盛氏云若內傷外

感兼病而相合者則其脈證必並見而難辨尤宜細

世之病此者為多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於

必求之若顯內症多者則是內傷重而外感輕宜以

簡養為先若顯外症多者則外感重而內傷輕宜以

發散為急此東垣未之及也因替其畧學者詳之

內而發者皆以補元氣為主看所而兼用藥如
痰者補中益氣加牛夏以薑汁竹瀝傳送氣虛熱甚
者少加附子以行參芪之功

內傷發班因胃氣虛甚是火遊行於外亦有痰者火則
補而降之痰熱則微汗以散之切不可下

內傷煩躁因血少不能潤理宜養陰煩躁不得眠者六

一散加牛黃似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脈細數

五七日不睡補中益氣倍人參用竹葉同煎甚者加

麥門冬五味知母似傷寒至五七日汗後煩躁吃水

者補中益氣加附子似傷寒三戰後勞乏煩躁昏倦

四君子加當歸黃芪知母麥門冬五味子甚香脉細
數無序三更後吃水至天明此乃元氣虛加竹瀝大
劑服之。有舌黑燥大便滑泄食在大腸煩燥夜不
安宜防風當歸飲子下之。內傷病退後燥渴不解
者有餘熱在肺參苓甘草少加薑汁冷服虛者用人
參湯。

丹溪治一人因齋素飢寒作勞發熱頭疼醫與小訖胡
湯自汗神昏脉大如指似有力與人參黃芪熟附灸
甘草大劑服之一日汗小二日熱減能視聽加蒼朮
與二貼再得汗熱除乃云蒼朮作小劑服漸安。

少年九月發熱頭疼妄語大渴一服與小訛胡十餘
貼熱愈甚予診視其形肥脈數大左甚以參朮為君
茯苓芍藥黃芪為佐附子一片為使與二貼不愈或
謂不當用附子予曰虛甚誤投寒藥而脈左大於右
事急矣若非附子參朮焉能有速効并一貼乃去附
子作大劑與五十貼大汗而愈。一少年因勞倦大
熱而渴恣飲泉水次日熱退言視謬妄腹脹轉則不
食戰掉脈瀦而大右為甚急灸氣海三十壯用白朮
黃芪各二錢附子五分與十貼不效又增發熱而渴
但少進稀粥予曰此氣欲利而血未應也於前方去

附子加川歸以和血有熱加人參一錢半與三十貼
安。一肥白人壯年因勞倦成病秋間大發熱已服
小其胡八貼矣。二手脈洪數而實觀其形色知其脈
本不實以涼藥所致因與溫補藥黃芪附子湯冷
飲三貼困而微汗而解脈亦稍軟繼以黃芪白朮湯
脈漸小而愈蓋肥人虛勞多氣虛也。一老人饑寒
作勞患頭疼惡寒骨節疼無汗妄語自服參朮飲取
汗麻洪數而左甚此胃虛作勞陽明雖受寒氣不可
攻專當大補其虛俟胃氣充實必自汗而解以參芪
歸朮陳皮多甘草每貼加附子一丸服五貼諸證悉

解恒口乾熱未退乃去附子加芍藥漸息食汗出熱
退。一男子素嗜酒因感寒倦怠不思食半月後大
發熱惡寒遍身痛脈浮大按之豁然左為甚此種虛
受寒以人參為君散芪芍藥歸身為臣蒼朮陳皮通
草乳葛為佐大劑與之五貼大汗而愈

補中益氣湯 東垣

白朮 上 人參 上 黃芪 上勞倦熱甚者更加之 當歸 中

升麻 下 柴胡 下 甘草 炙 陳皮 中 右劉永煎

一方雜著 治勞苦用力過多頭服數貼防後發熱

黃芪 錢半 甘草 七 五味 二十 人參 麥門冬

醫書集成卷之三

陳皮 白朮各一錢 甚者加附子四分 薑棗水煎

一方 治勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚

悸煩熱 人參 當歸 麥門冬

白芍藥 酸棗仁 茯神各一錢 五味十五粒 山梔炒

生地 甘草 陳皮 川芎 薑水煎

當歸補血湯 治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜

不息脉洪大而虛重按全無經曰脉虛血虛又云血

虛發熱證象白虎惟脉不長實為異耳如誤服白虎

湯必死此病得之亂因勞役

黃芪 當歸酒洗 右剉作一貼水二盞煎至

一盞去楂溫服心

○傷飲食第七

脈法 上部有脈下部無脈為食塞胃中宜吐之才口

洪大按之反澁久亦微而澁或寸口緊如轉索左右

無常或滑而數者下之或浮而滑凡脈沉病若傷寒

者宿酒宜下短疾而滑酒病滑而細傷飲氣口緊盛或

浮滑而疾皆傷飲食關沉而滑為食不消

丹溪云傷食必惡食氣口脈必緊急胸膈必痞塞亦有

頭痛發熱者但身不痛經曰飲食自倍腸胃乃傷蓋

飲番東垣云飲者水也無形之氣也因大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則咳喘水泄重為蓄積食者

物也有形之血也因而飽食筋脉橫解腸胃為疴若
飲食停滯不化而發熱者氣口脉必緊盛或右關短
而滑也必惡食或噫氣作酸或惡聞食氣或欲吐不
吐或惡心或短氣痞塞或胃口作疼或下按之則痛
此皆食停之候如停食而又感寒者則入迎氣口俱
大也外證頭疼身寒拘急中脘痞悶或嘔吐或膈者
宜覆香正氣散或人參養胃湯加香附砂仁之類若
因肉食加山查米麩加神曲麥芽生冷肉食果子之
類加草果砂仁枳實青皮傷酒食加葛根紫蘇砂仁
烏梅枳實若憎寒其熱者用此二方若已發熱無汗
必須先解其外以十味芍蘇散汗之身體疼痛發熱
者人參羌活湯加葛根葱白生薑以汗之然後消其
食也如食在胃上未入於胃者可吐之如不可吐則
消導之消食下入胃變化消弱外症已解方可下也
宜三物芍藥湯熱多者人參胡湯加厚朴下之治袂
食傷寒不可先攻其食且先發散寒邪次與消導尤
宜先其所傷之物分其寒熱輕重而施治如初得上
部有脉下部無脉其人當吐不吐者死宜瓜蒂散輕
則內消宿食神曲是也重則下之涼氣是也寒則瀉
之半夏乾薑三姜又木是也熱則下之大黃黃連枳

實牙是積飲不行或大飲而小或寒下而
消其是脾土苓半夏入飲之類重則蓄
積為病之神之傳須各從其類也

惡食者胃中有物且導痰補脾二陳加白朮川芎

聞食氣即嘔二陳加砂仁青皮。憂抑傷脾不思飲

食炒黃連酒芍藥香附加青朮丸末薑汁浸炒餅丸

越鞠丸治食積方見

保和丸 治食積虛者以補脾藥下之

山查肉二兩半夏 神曲炒 茯苓各一兩 蘿蔔子

陳皮 連翹各半 為末神曲糊丸加白朮二兩

食不消須用枳實神曲若壯實以黃連枳實消導之弱

者以白朮陳皮山查神曲麥芽補而消之

食後感寒宿食不消用丁香砂仁華澄以溫之

丹溪治一婦因宿食上腹大痛連及兩脇以香附末湯

調探吐而愈。一人好酒每早嘔吐必瓜蒌貝母炒

山梔石膏煨香附南星薑製山查神曲各一两枳實

薑黃羅蔔子連剋石醮各半两升麻二錢半為米薑

汁浸炊餅丸白湯下又見。一人因吃麪發熱身痛

咳嗽有痰以蒼木一錢半陳皮一錢羌活茯苓黃芩

川芎甘草各三分薑水煎

抱一翁治一人啖馬肉過多腹脹服六黃巴豆益甚脉

寸口促而二尺將絕曰胃有新邪其脈促宜引之上
達今反奪之誤矣急以涌劑飲之置亭中座使人環
旋頃吐宿食仍以神芎丸服之遂愈

治食自死六畜中毒栢末酒下方寸匕未散再服

附方

加減枳木丸 東垣

白木 二兩 枳實 夫炒黃一兩 已上二味本方

神曲麥芽 心腹悶加之 木香檳榔青皮 滯氣加之 大黃黃芩黃

連 濕熱物加之 連翹 熱加之 茯苓 濕痞悶加之 梔子 病後食傷加之

半夏白礬 五粉蒸面 草豆蔻三稜義朮 生冷硬乾薑

傷水宿砂丁香心胃痛人參傷胃如之蘿蔔子除濕

為末荷葉煨飲丸菜豆湯下六七十九又見脾胃門可參看

傷西瓜冷水羊乳寒濕之物宜白木二錢川烏五分防風

炙甘草各錢丁香筒

傷羊乳肉麩濕熱之物白木笨連各一錢大黃二錢炙甘草五分

白芍藥一錢枳實痞悶厚朴腹脹枳殼胃中不利

陳皮乾薑內寒茯苓渴蒼朮腹中窄狹巴豆冷物

損却丸 治傷之輕飲食不化心腹彭脹

木香 檳榔各二錢陳皮八錢黑丑頭身

不為末醋糊丸桐子大薑湯下二十丸

黃丸 治傷之重脇肋虛脹

雄黃一兩 巴豆半兩 生用右丸服法同心痛門

符急丸 治傷寒冷之物及療心腹卒暴百病大便秘

大黃 乾薑 巴豆去油各等分

右為末煉蜜丸如小豆大每服三丸

神佑丸 治留飲懸飲方見欬門

寬中進食丸 又名寬中膏 食無厭丸 滋形氣喜飲食

麥芽兩 半夏 猪苓各七錢 草豆仁 神曲炒

枳實各五錢 陳皮 白朮 白茯苓 澤瀉

宿砂各一錢 乾生薑 甘草 人參 青皮各一錢

木香分五 右末炊餅九梧桐子大米湯下三五十九

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不化而作痞滿悶亂

澤瀉錢二 大黃兩一 枳實 神曲各半 黃芩茯苓

黃連 白朮各三 右末炊餅九豌豆大湯下七八

或問世俗用枳實導滯丸治一切飲食所傷并良藥
子曰此方乃東垣所製惟可治濕熱之物所傷而
痞悶故用黃芩黃連以清其熱茯苓澤瀉以行其濕
枳實消痞滿化宿食白朮補脾行濕大黃湯瀉攻下
又能去熱物之傷故用得効何世醫不論所傷物之
寒熱燥濕病之輕重緩急悉皆用之設傷寒物又投
哉學者詳之

暑八 夏至日後 病熱為暑 附暑風

法 脉虛身熱得之傷暑脉浮自汗火動而或浮大