

醫便

醫便卷四

張受孔心如爻

海陽

姚學顏伯愚爻

重訂

濟陰類

凡婦人小兒老人諸症除婦人胎產經候小兒驚
癇變蒸痘疹老人血氣衰憊水火升降失度與大
人治法不同故另立方法其餘症同大人者悉照
前四時方法用

四物湯

百五

治婦人之總藥隨症加減妙用無窮

方見滋補類加減于後

經水過期不行血寒血少也本方五錢加香附莪

术

各一錢

蘇子

八分

桃仁

三十粒

紅花

官桂木通各七分

桂木

各七分

艾葉

各五分

草

三分

空心煎服○

經水先期而來血熱也加黃柏

知母

各一分

芩黃連

各七分

甘草

三分生

人參

阿膠

艾葉

各五分

香附

各一錢

荆芥穗

各二分

空心煎服○

血枯經閉本方

一半加桃仁紅花共五錢空心煎服○

色淡者痰

多也本方去地黃加二陳湯等分和服○

紫黑者

血熱也本方五錢加黃芩黃連荆芥穗

各二錢

○臨

本方去地黃加黃芩黃連荆芥穗

各二錢

○臨

行腰腹疼痛乃鬱滯有瘀血加桃仁紅花莪术玄

胡索香附

各一錢

木香

五分另磨入

○潮熱發熱本方五

錢加地骨皮薄荷

各一錢五分

柴胡防風

各五分

甘草

三分

烏梅

箇

同煎食遠服○虛寒者用熟地黃加乾姜

官桂吳茱萸

各一錢

甚者再加熟附子

一錢

○虛極者

本方與四君子等分加黃芪

一錢半

熟附子

七分

○經

行不止者本方加真阿膠艾葉地榆荆芥穗

各一錢

○妊娠胎動加香附砂仁紫蘇

各七分

白朮条芩

各一錢

錢阿膠

炒八分

斷艾

五分

去生地黃用熟地黃○胎前

產後血痢加黃連地榆阿膠艾葉各八分

厚朴

五分

○

五心煩熱加柴胡黃芩地骨皮各一錢

甘草

三分

麥門

冬分八

○荷死胎加交桂麝香白芷○赤白帶下加

藁本牡丹皮川續斷各八分

○產後惡露作痛加香

附

乾姜

炒黑七分

生蒲黃陳皮各八分

○產後發熱加

白术茯苓陳皮黑乾姜各八分

○久無子息加附子

肉蓯蓉

各一錢

熟地黃鹿角膠各一錢

半

烏骨鷄丸

附

治婦人經候不調并胎前產後一切諸

症調經育子之上藥也累用竒妙

香附

二斤

蘄艾

去梗淨二斤

上二味分作四分每分

一斤一分老酒一分米醋一分童便一分糯米泔
各浸一宿炭火煮爛熟爲佳石臼內木槌搗成薄
餅晒乾磨爲末聽用大白毛烏骨雄雞一隻弔死
去毛熟湯修理腸雜潔淨勿見生水再用

當歸

酒洗淨四兩

白芍藥

酒炒四兩

熟地黃

酒浸忌鐵器四兩

兩

人參

去蘆二兩

黃芪

蜜炙二兩

白朮

炒一兩

陳皮

去白

白茯苓

去皮二兩

砂仁

炒各一兩五錢

烏藥

炒一兩

神麴

炒

甘草

炙各七錢五分

右藥十二味製淨爲粗末裝入雞肚內以線縫住
仍用老酒米醋童便米泔等分入砂鍋內炭火煮
令爛熟去骨石臼搗成餅晒乾磨爲細末聽用再
加

木香

沉香

各五錢
不見火

官桂

乾姜

炒半黑
各三錢

右四味另研爲細末聽用 右三次藥末和勻重
羅篩過練蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心滾
水打鹽湯下愚按此方血虛多鬱婦人服極効

濟陰返魂丹

百五

治婦人胎前產後總藥一名益

母丸用益母草一味其草卽茺蔚子其葉類火麻
對節而生方梗四面五六月間節節開紫花白花
者不是南北隨處有之於端午小暑或六月六日
花正開時連根收採透風處陰乾不犯銅鐵器石
臼木杵搗羅爲細末煉蜜爲丸如彈大每服一丸
各照後開引下或量加當歸赤芍藥木香尤妙其
藥不限丸數以病愈爲止日服三五丸或丸如梧
桐子大每服七八十丸空心食遠照後引下或熬
膏調引用尤妙

熬膏法

附益母草

不拘多少連根莖葉洗淨入石臼

內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武火熬如黑

砂糖色爲度以磁瓶收貯每用一茶匙照後開引

調用極効○胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止

煎秦艽當歸粳米湯下○胎前產後臍腹作痛作

聲或寒熱往來如瘡狀者並用米湯下○臨產併

產後各先用一丸童便酒化下安魂定魄調血順

氣諸病不生又能破血止痛養脉息調經絡其功

甚大○產後胎衣不下落在胞中及產前一切難

產併橫生逆產胎死經日不下腹中脹滿心下悶
痛炒鹽湯下○產後中風牙關緊急半身不遂失
音不語童便酒各半化下○產後氣喘欬嗽胸膈
不利吐酸水面目浮腫手足疼痛舉動失力者溫
酒下○產後兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短肢體羸
瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節骨痛米湯
下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼
神狂言不省人事薄荷自然汁下如無濃煎薄荷
湯或童便酒各半下○產後面垢顏赤五心煩熱

或結成血塊。臍腹奔痛時發寒熱。有冷汗者。童便酒各半下。薄荷湯亦可。○產後瘀血惡露不盡。結滯臍腹。刺痛惡物上冲。心胸滿悶。童便酒下。○產後未經滿月。氣血不通。欬嗽四肢無力。臨睡自汗不止。月經不調久而不治。則爲骨蒸。療疾童便酒各半化下。○產後鼻衄口乾舌黑。童便化下。○產後大小便不通。煩燥口苦者。薄荷自然汁下。如無生的乾的濃煎湯亦可。○產後赤白痢疾。米湯下。○產後濕血水濃煎棗湯下。○產後赤白帶下。阿

膠艾葉湯下○血崩漏下糯米湯下○婦人久無
子息溫酒下二日一丸至三五十丸決有効驗○
勒奶痛或成癰爲末水調塗乳上一宿自瘥或生
搾敷上亦可○右一十九症調引歷歷有効不能
盡述用者自知其妙也

蒸臍法百五 治婦人月經不通或瘕瘕血塊臍及
作痛此方神効

乳香 没藥 血結 沉香 丁香各三錢

麝香一錢上六味各另研 青益 食鹽 五靈脂

兩頭尖

各六錢四味共爲末

右各末和勻外用麝香少許安入婦人臍內次將
麵作條方圓一寸遶臍圍住安藥末於內令滿以
槐樹皮方圓一寸蓋上皮上鑽三孔用大艾炷灸
之月經卽通血塊卽消累用神妙

紅花當歸丸

百五

治婦人血脈虛竭經候不調或

斷續不來或積瘀成塊腰腹刺痛肢體瘦弱

馬鞭草

半斤

劉寄奴

半斤二味共熬膏丸藥

當歸

三兩酒洗

赤芍藥

牛膝

去蘆酒浸

川芎

香附

醋炒

牡丹皮

去木

甘草

各一兩半

紅花

白芷

各七錢半

官桂

六錢

紫葳

卽凌霄花

蘇木

各三兩

枳殼

炒一兩

右爲末以前膏入少糯米粉打糊爲丸如梧桐子大每服七八十九空心濃煎紅花酒送下

濟陰百補丸

百五六

治女人勞傷氣血不足陰陽不和作寒作熱心腹疼痛胎前產後諸虛百損並宜

用之

香附子

一斤分四製醋酒童便當歸

當歸

酒洗晒乾各六兩

益母草

五月五日採者佳忌鐵淨末半斤

熟地黃

酒洗

白芍藥

酒炒

川芎

甘草

炙各一兩

白茯苓

去皮三兩

玄胡索

炒兩

人參

去蘆二兩

木香

不見火

白术

土炒各四兩

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服六七十丸，漸加至八九十丸。空心米湯酒任下。

按此方調脾胃，補虛損，極効。

治赤白帶下神方

百七

樗根白皮

香椿根白皮

苦參

香附

醋炒

梔子仁

炒

山茱萸

去核

黃柏

鹽酒炒

龜板

去弦

酥炙各

乾姜

炒五

貝母

去心一兩

白术

炒

當歸

酒洗各一兩五錢

白芍藥

酒炒一兩

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大每服八十丸空心

清米湯送下若孕婦赤白帶加蒼朮條芩川連白

芷

各一兩

去乾姜樗皮貝母苦參龜板梔子爲丸服

固真湯附治婦人赤白帶下行時臍下甚痛此方二

服卽効

人參

五分

黃芩

黃柏

白葵花

各一錢

郁李仁

八分

柴胡

七分

陳皮

去白八分

甘草

炙

乾姜

炒各三分

右用水一鍾半煎七分空心服葵花白者治白帶赤者治赤帶赤白混下二花竝用

按此方治氣血滯陰陽不清極効

涼血地黃湯

百玉八

婦人血崩來如山崩水湧之勢

明是血熱妄行豈可作寒論治宜清補兼升提不可驟止徐徐調理血清自歸源矣

黃芩

甘草

生

荆芥穗

蔓荆子

各七分

黃柏

知母

藁本

川芎

細辛

各六分