

本显
丹溪心法附餘

海左書局印
白駒王大錯署

R2-51

4

(二)

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疽

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闕格

噎氣

痰熱門

症

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

火門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癩

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門_上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門_下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風 胃風 痛風 脈節痛 肩背痛 痺 癩風 血風瘡 身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽 肺痿 肺癰 霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧 痢

卷之七

溼門

痞 泄瀉

卷之八

溼熱門

吞酸 咳氣 疸 水腫 鼓脹 赤白濁

卷之九

痰門

痰 痰熱 哮喘 喘 惡心 嘔吐 咳逆 翻胃 嘈雜 關格

瘦氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘵

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之一

外感門上

新安居士方 廣輯

中風一 附中氣 預防中風

丹溪心法

中風大率主血虛有痰治痰為先次養血行血或屬虛挾火一作痰與溼又須分氣虛血虛 半身不遂大率

多痰在左屬死血少一作痰血在右屬痰有熱併氣虛 左以四物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁 右以二陳湯四

君子等湯加竹瀝姜汁 痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用吐法一吐不已再吐輕者用瓜蒂一錢或

稀涎散或蝦汁以蝦半斤入醬葱姜等物料水煮先吃蝦次飲汁後以鵝翎探引吐痰用蝦者蓋引其風出耳

重者用藜蘆五分或三分加麝香少許薑汁調若口噤昏迷者灌入鼻內吐之虛者不可吐 初昏倒即搗人

中至醒然後用痰藥以二陳湯四君子湯四物湯加減用之 氣虛卒倒者用參芪補之有痰濃煎參湯加竹

瀝姜汁 血虛用四物湯俱用姜汁炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝姜汁入內服能食者去竹瀝加荆瀝 肥

白人多溼少用烏頭附子行經凡用烏附必用重便煮過以殺其毒 瘦人陰虛大熱用四物湯加牛膝竹瀝

黃芩黃柏有痰者加痰藥 治痰氣實而能食用荆瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故也入四物

湯必用姜汁助之 遺尿屬氣虛以參芪補之筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治也 脈訣內言

諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛髮直搖頭上竅面赤如裝或頭面青黑汗綴如珠

皆不可治

按內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守真作將息失宜水不能制火極是由

今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是溼土生痰痰生熱熱生風也邪之所轉其氣

必虛風之傷人在肺臟為多 許學士謂氣中者亦有此七情所傷脈微而數或浮而緊緩而遲必也脈遲浮

可治大數而極者死 若果外中者則東垣所謂中血脈中府中藏之理其放四肢不舉亦有與痰相類者當

細分之局方風痿同治大謬發揮其詳子和用三法如的係邪氣卒中痰盛實熱者可用否則不可

八方

肥人中風口喎手足麻木左右俱作痰治

貝母 瓜蒌 南星 荊芥 防風 羌活 黃柏 黃芩 黃連 白朮

陳皮 半夏 薄桂 甘草 歲靈仙 天花粉 多食淫婦加附子竹瀝姜汁酒一匙行經

一婦手足左癱口不能言健啖

防風 荊芥 羌活 南星 沒藥 乳香 木通 茯苓 厚朴 桔梗

麻黃 甘草 全蝎

右為末湯酒下不効時春脉伏漸以淡鹽湯薑汁每早一碗吐五日仍以白朮陳皮茯苓甘草厚朴薑瀉日服二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂萊豆粉薑汁益湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木通粘子蒼朮姜南星牛膝茯苓為末酒糊丸十日後夜間微汗手足動而能言

一人癱左

酒連 酒芩 酒柏 防風 羌活 川芎 當歸 南星 蒼朮 人參

麻黃 甘草 三錢 附子 三片

右丸如彈子酒化下

一人體肥中風先吐後以藥

蒼朮 南星 酒芩 酒柏 木通 茯苓 牛膝 紅花 升麻 厚朴

甘草

附諸賢論

涉洄集曰人有卒暴僵臥或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治

之余嘗考諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變貌乃為他病無常方又曰風者善行而數變又曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風或為偏枯或為風其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺解之者曰偏枯者半身不遂風痺者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痺者痺類風狀全置要畧中風篇曰寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即克不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等症固為因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代劉河間李東垣朱彥修三子者出所論始與昔人異矣河間曰中風癰癰者非謂肝木之風實甚亦卒中之亦非外中於風由手驚息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛或間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣溫而地多溼有風病者非風也皆溼土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎溼反以風為虛象而大異於昔人矣吁昔人也三子也果孰是歟果孰非歟以三子為是昔人為非則三子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人為是三子為非則三子已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因於風者真中風也因於火因於氣因於溼者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因溼而為暴病暴死之症與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉未嘗必因於風而後能也夫風火氣溼之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火

氣溼則從三子以治如此庶乎析理明而用法當矣惟其以因大因氣因溼之症強引風而合論之所以真偽不分而名實相紊若以因大因氣因溼症分出之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

附脈理

脈訣舉要曰中風脈浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危溼痰風未可疎

附諸方

通關散 治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛

洗去土葉

猪牙皂角

去子各一錢

右為末每用少許搐入鼻內候噴涕服藥 一方加半夏 一錢

不臥散 治中風卒倒不知人事用此搐鼻即甦

川芎

一兩半

石膏

七錢半

藜蘆

半兩

生甘草

二錢半

右為細末口擒水搐之

通頂散 治中風中氣昏憤不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆

生甘草

川芎

細辛

人參

各一錢

石膏

五錢

右為末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有嚏者可治無嚏者不可治

搐鼻通天散 治卒中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎

細辛

藜蘆

白芷

防風

薄荷

各一錢

猪牙皂角

刮去皮三箇

右為細末用蘆筒細藥每用少許吹入鼻中

破指散

經驗方

治中風牙關已緊無門下藥

天南星末

半錢

龍腦

少許

右五月五日午時合每用半錢頻擦令熱牙自開

奪命散 楊氏家藏方

治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風症並皆

治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏 湯泡去滑 巴豆 去殼不去油各等分

右為細末每服半錢用生姜自然汁一呷調下牙關緊湯劑不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

解毒雄黃丸 和劑方

治中風卒然倒臥牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金 二錢半 巴豆 去皮油十四箇雄黃 研飛二錢半

右為末醋煮麴糊丸如菜豆大每服七丸用熱茶送下吐出頑痰立甦未吐再服如牙關急緊幹開灌下

稀涎散 治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮搐搦氣閉不通

光明晉礬 一兩 猪牙皂角 四箇肥實不蛀者去黑皮

右為末每服五分溫水調下風涎自出又云每服一錢至二錢不妨須要研勻調服吐出痰涎便醒

獨聖散

二聖散

三聖散

四靈散 以上四方並治痰涎壅盛口眼喎斜不能言者用此吐出痰涎稍醒方可進藥其四靈散又吐虛痰

之劑也 方見吐法

以上諸方開闕竅之劑

麻黃膏 宣明方 治中風不省人事卒然倒地

右須王相日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五七者可先煮五沸掠去滓逐漸添水盡至三五斗已來漉去麻黃淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取清者鐺內

再熬至一斗再濾再澄取汁再熬至升半已來為度只是勤攪勿令著底恐焦了熬時忌雞犬陰人澄時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水解熬再勻 凡中風卒倒用此膏加入湯藥內服或用此膏丸藥

小續命湯 按粹方 經云陽之氣以天地之疾風名之此中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰

之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此法當和藏府通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治法輕重有三治各不同中血脈外有六經之形證則從小續命加減中府內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦朮湯羌活愈風湯主之中藏痰涎昏冒直至寶丹之類鎮墜若中血脈中府之病初不宜用龍射牛黃蓋射香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麵莫之能出又不可一概用大戟羌花甘遂瀉大腸大便損其陰血真氣愈虛和劑方云此藥治邪在血脈最妙

麻黃 去節 人參 去蘆 黃芩 去腐 芍藥 甘草 炙 川芎 杏仁 去皮共炒

防已 肉桂 各一兩 防風 去蘆兩半 附子 炮去皮臍半兩

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服如治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以續命湯加減隨證治之

麻黃續命湯 按粹方 治中風無汗惡寒

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血崑崙舉蹠

桂枝續命湯 按粹方 治中風有汗惡風

桂枝 芍藥 杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯 拔粹方

治中風身熱無汗不惡寒

石膏

知母 一料中各加二兩 甘草

依本方加一倍

葛根續命湯 拔粹方

治中風身熱有汗不惡風

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

附子續命湯 拔粹方

治中風無汗身涼

附子

加一倍 乾姜 加二兩 甘草 加二兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯 拔粹方

治中風有汗無熱

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜針大谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯 拔粹方

無此四證六經混淆繫於少陽厥陰或肢節掣痛或麻木不仁宜服

小續命

八兩 羌活 四兩 連翹 六兩

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之

經絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸同象治法之大體也服法並如前

三化湯 拔粹方

治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨症治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴 姜製

大黃

枳實

羌活 等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中

道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之

通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

潤腸丸 治證同前老人宜服

麻子仁 另研 大黃 酒煨各一兩半 桃仁泥

當歸尾

枳實 麩炒

白芍藥

升麻 各半兩

人參 生甘草

陳皮 各三錢 木香

檳榔 各二錢

右除麻仁桃仁外為末却入二仁泥蜜丸梧子大每服七八十九丸溫水食前下

大秦羌湯 拔粹方

治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌

強不能言宜養血而筋自榮

秦朮

石膏 各三兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風 去蘆

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黄

熟地黄

白茯苓 各二兩

細辛 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨加生薑三大片如心下痞加枳實一錢煎

羌活愈風湯 拔粹方

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風溼內弱風熱體重或瘦而一股偏枯或肥

而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草 炙

防風 去蘆

黃芪 去蘆

人參 去蘆

蔓荊子

川芎

細辛 去蘆

枳殼 去穢

地骨皮

麻黃 去根

知母 去皮

獨活

白芷

杜仲 炒斷絲

秦朮 去蘆

柴胡 去苗

半夏 湯洗姜製

厚朴 姜製

防己

熟地黄

前胡 各二兩

芍藥 去皮

黃芩 去腐

白茯苓 各三兩

石膏

生地黄

蒼朮 各四兩

桂 一兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再服常服之藥不

可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人參各二兩望夏穀雨之後加石膏黃芩知母各二兩季夏

之月加防己白朮茯苓各二兩望秋大暑之後加厚朴藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各

一兩當歸二兩