



15

中國山茶科小誌

31

蔣 英

中國山茶科小誌

胡先驕

(内部文件)
(注意保存)

... 葉片長橢圓形，長至11厘米，頂端漸尖，基部楔形，有細鋸齒，葉柄粗壯，長至1厘米，花序生於葉腋，花冠白色，花瓣5，闊卵圓形，雄蕊長約1厘米，花絲連合，向後彎曲，子房長約1厘米，果實長約1厘米，果瓣5，中核有3棱，闊形，長至3厘米，外殼至2厘米，果褐色。

產浙江開化縣及浙皖贛交界一帶。

此種與 *C. camellaria* Ch. 相近，不同點在於葉較大。

胡先骕

滇南匹克茶 *Pignetia austroyunnanensis* 新種

小乔木，高至4米，小枝幾无毛。葉薄革質，倒卵橢圓形，長至11厘米，頂端驟漸尖，基部楔形，有細鋸齒，無毛；葉柄長至八毫米，稀無毛。蒴果扁球形，高2.5厘米，直徑4.5厘米，基部托以不脫落革質萼片，5室，果瓣木質，中柱粗壯，有5稜角，高3毫米，寬1厘米，種子每室通常一，扁而凸，亮栗褐色，長1.7厘米。

產云南西畴縣

此種與 *P. pignetiana* A. Hallier 相近處在其蒴果的短闊中柱，但葉之五較小而有細鋸齒。

紅萼油茶 *Camellia chekiangoleosa* 新種

灌木，小枝無毛。葉革質，矩圓形，長至11厘米，頂端漸尖，基部楔形，無毛，上面亮綠色，有細鋸齒，葉柄粗壯，長至1.5厘米。花單生，直徑8厘米，紅色，萼瓣5，闊卵圓形；雄蕊成兩輪，花絲連合，內較分離，子房無毛；萼柱心連合至頂，有3柱頭。蒴果厚木質，直徑5厘米，無毛，果瓣3，中柱有3稜闊棒狀，長至3厘米。種子長至2厘米，栗褐色。

產浙江開化縣及浙皖贛交界一帶。

此種與 *C. semiserrata* Chi 相近，不同處在有連五較大

的总书革直至基部皆有细锯齿。

嵩明山茶 Camellia sumingensis 新种

小乔木高至7米；小枝无毛。叶革质卵矩圆形，顶端钝，基部心圆形，有细锯齿长六至七厘米，无毛，亮绿色，下面有网脉；叶柄粗壮长至8毫米。花红色，花瓣5至12个。蒴果直径5.5厘米，果瓣3至4个，厚木质；中柱阔棒形，长至3.5厘米，顶端阔至2厘米；种子长1.7厘米。

产云南嵩明县

此种与红盖油茶相近似，不同处在叶下面有网脉书较大。蒴果其书 C. semiserrata Ch. 不同处在叶全部有细锯齿。

滇南油茶 Camellia austroyunnanensis 新种

小乔木高至6米；小枝有极疏生毛，有黑色皮孔。叶革质矩圆形，顶端长渐尖，基部楔形，长至12厘米，上面亮绿色，两面皆有极疏生毛，有具黑尖头锯齿；叶柄长1.5厘米。总苞生毛，花梗红色，直径5厘米；花瓣倒卵形，顶端有凹缺；子房密生平贴细毛，总柱长2.5厘米，上部3裂，有平贴细毛。蒴果木质，球形，直径2.5厘米；果瓣3个，厚革质；中柱有三棱阔棒状，长至3.5厘米；种子每室3个，长至1.5厘米。

产云南

此种与南山茶 C. reticulata Lindl. 相似，不同处在叶上面亮绿色书花较小；其书 Chekiangetosa 不同处在总苞小。

而果較大，且為小喬木；其與 *C. semiserrata* chi 不同處在
葉中部以下有鋸齒。

景東山茶 *Camellia gintungensis* 新松

小喬木高至8米，小枝無毛。葉革質，披針形，長至10.5厘米頂
端漸尖基部楔形，有細鋸齒，上面亮綠色，下面有平貼長毛；
葉柄長至13毫米。花單生無梗，紫紅色，直徑5厘米；花瓣倒卵
形，頂端有凹缺長3.5厘米；雄蕊多數，花絲三分之二連合；子房密生
毛；花柱連合至頂長2.5厘米。

產雲南景東縣麻栗坡，屏邊縣，廣南縣。

此種與其他紅花種不同處在其披針形葉與花柱連合至頂。

福建山茶 *Camellia fokiensis* 新松

灌木；小枝無毛，有微小黑色腺點。葉革質，倒卵形，長至6厘米，
頂端短漸尖，有黑色細鋸齒，無毛，微亮綠色，兩面皆有細網
脈。花2或1朵，直徑約3厘米；花瓣紅色，倒卵形，頂端有凹
缺，長至3裂，有長毛。

產福建。

此種與 *C. rosaeflora* Hk f. 相近不同處在其倒卵形葉
有黑色細齒，與其極細瘦有長毛花柱。

毛柱山茶 *Camellia pilostyla* 新松

灌木高至2米；小枝有粗毛與黑色腺體，葉革質，倒卵矩圓形，
頂端長漸尖，基部圓形，有細鋸齒，上部微亮綠色，下部深紅色。

中肋有毛；葉柄長5毫米，有或無粗毛。花單生，花被白色，直徑3厘米；花瓣僅基部連合；子房3室；花柱3中，完全分離，密生長毛。
產云南怒江河谷。

此種與其他白蕊種不同處在其3中完全分離有長毛蕊柱。

梨茶 *Camellia latimba* 新種

小喬木，高至3米，直徑至12厘米；樹皮赭褐色，平滑；小枝有毛，有黑色皮孔。葉革質，倒卵矩圓形至披針形，長至12厘米，兩面均無毛，有黑色腺體，上面亮綠色，有黑色細齒；葉柄長至13毫米，有細毛。花單生，白色，直徑至4厘米，花瓣6中，倒心臟形；子房密生灰色長毛，5室；花柱5中，分離密生灰色長毛。蒴果大，厚木質，裂瓣5中，長至4厘米，中柱粗棒狀，長3.5厘米，有5稜角頂端直徑2厘米。

產福建浦化縣，建甌縣，永安縣，寧洋縣，沙縣。

此種與其他白花種不同在其大葉長至12厘米，在其5室子房有5中分離有長灰色毛花柱，其甚大果具有甚厚木質裂瓣與極粗壯中柱。其大果可與有紅色蕊的紅蕊油茶 *Camellia chekiangoleosa* Hu *Camellia sumingensis* Hu 相比。其種子供榨油用。

寒露油茶 *Camellia meiocarpa* 新種

灌木高2至6米；小枝細瘦，有黑色粗毛。葉革質，卵圓形，長至6.5厘米，頂端短鈍漸尖，基部楔形，有細鋸齒，無毛。

葉柄長至5毫米。花單生，直徑3厘米；花瓣5個，白色倒卵形頂端凹缺，子房密生茸毛，3室；花柱長1厘米無毛，柱頭3裂蒴果矩卵圓形，微有3稜，長2.5厘米，中柱細瘦。種子每室1至2個，凸而有稜角，長至13毫米。

產湖南永興縣。

此種與油茶 *C. oleosa* Lour. 相近似不同處在小枝有黑色粗毛，而較小的花果種子。此種在十月中旬開花，故名冬露油茶，而普通油茶在當地則稱爲霜降油茶。

龍岩山茶 *Camellia lungyaiensis* 新種

灌木；小枝細瘦，密生細硬毛。葉革質，倒卵矩圓形，長至4厘米，頂端有鈍突尖，基部楔形，有具刺細鋸齒，兩面有網狀脈，幾無毛；葉柄長5毫米，有細硬毛。花並生，直徑至2厘米，白色，花瓣倒卵形，邊緣有纖毛，子房密生帶黃色細硬茸毛；花柱三裂，有極細毛。

產福建龍岩。

此種與台灣產的 *C. tenuiflora* (Hay.) Cohen Stuart 相近似，不同處在葉具刺細鋸齒，而花並生，較大，有較長花柱。

緬寧山茶 *Camellia mianningensis* 新種

灌木，高至2.3米；小枝細瘦，密生紅色細茸毛。葉革質，橢圓形至矩圓形，長至6.5厘米，頂端短鈍漸尖，基部心臟形或闊楔形，有細鋸齒，兩面有顯著黑腺體，下面有顯著網狀脈；葉柄長1.5厘米，有細茸毛。花並生，直徑至2厘米，白色，花瓣倒卵形，頂端凹缺，子房密生茸毛，3室；花柱長1厘米無毛，柱頭3裂蒴果矩卵圓形，微有3稜，長2.5厘米，中柱細瘦。種子每室1至2個，凸而有稜角，長至13毫米。

柄長至4毫米，有粗毛。花單生或並生，無梗白色，直徑2.5厘米。花瓣5個，倒卵形，頂生有凹缺，外面密生絲狀毛，子房密生茸毛。花柱長5毫米，頂端三裂無毛。

此松產於云南緬寧。

此松與 *C. brevistyla* (Hay.) Nakai 相近似，不同處在葉與花較大，而花柱較長。

厚果山茶 *Camellia pachycarpa* 新松

喬木高至12米；小枝有黑褐色細茸毛。葉革質，橢圓形，長至7厘米，頂端漸尖，基部楔形，有細鋸齒，無毛，葉柄下面有帶黑色粗毛，長5毫米。花蕾單生或並生；萼片外面無毛；花梗極短。蒴果木質，果瓣3至4個，長至3厘米，內果皮木質厚至7毫米，中柱粗狀，湖棒狀，有三至四棱，長1.5厘米，頂端闊1厘米；松子每室1個，心球形，直徑1.5厘米。

此松與其他中國產有較小果的松不同處在其甚厚的果瓣，尤在其每室中單生心球形松子。

產云南佛海。

披針葉山茶 *Camellia lanceifolia* 新松

喬木高至7米；小枝無毛。葉革質，披針形，長至10.5厘米，頂端長漸尖，基部楔形，上部有疏生細齒，無毛；葉柄長至1.8厘米，無毛。蒴果木質，倒卵矩圓形，長3.5厘米，有粗壯果梗長4毫米，心形，托以不脫落萼片，外面有密生白色絲狀毛；果瓣3

个,厚,外面紫黑色;中柱棒状,有3稜長2.5厘米;籽子凸而有稜,長至12毫米。

產江西武功山。

此籽与其他種不同處在其革質披針形葉片具有不脫落萼片及粗壯棒状中柱的蒴果。

疏葉毛蕊茶 Camelliastrum laxifolium 新籽

喬木高至4米;小枝細瘦,微有毛。葉疏生,革質披針形,長至12厘米,頂端尾狀漸尖,基部楔形,有細鋸齒,兩面疏生毛,下面沿中脉有長毛,有網狀脉;葉柄長至4毫米,有細茸毛。花蕾單生或3个成聚繖花序,白色,花梗長至6毫米,有卵圓形苞片。花瓣5個,卵圓形;花絲有長毛,2或3个連合成束,束連合或分離。子房有長毛,花柱頂端短3裂。蒴果卵圓形,長2.5厘米,有3個籽子。

產云南麻栗坡。

此籽与其他中國產的籽不同處,在其散生大葉,而其花絲通常2至3个連合成束而不完全連合成一組。

麻栗坡毛蕊茶 Camelliastrum marlipoense 新籽

灌木高2.3米;小枝細瘦,密生長毛。葉革質,矩圓形,長至6厘米,頂端漸尖,基部圓形,有細鋸齒,下面有長毛;葉柄長3毫米,密生細硬毛。花單生,白色,直徑1.5

厘米;花瓣倒卵形;雄蕊多数,成3组,外面2组高度联合,内面一组5个,分离,皆有长毛,花丝阔;子房3室,有白色长毛;花柱长至13毫米,顶端短3裂。蒴果几球形,长2厘米,外面有长毛。

產云南麻栗坡屏邊縣,西畴县。

此種与 *C. caudatum* (Wall.) Nakai 相近似,不同處在葉較寬花較小。

鎮康茶 *thea chengkangensis* 新種

喬木高至5米;小枝有微細茸毛。葉革質,矩圓形,長至11.5厘米,小枝有微細茸毛。葉革質,頂端漸尖,基部闊楔形,有細齒,無毛;葉柄長6毫米,幾無毛。果扁球形,微有5稜,有黃毛色,直徑3厘米;每室有一個種子;果梗長2厘米,頂端增粗;萼片不脫落,圓形,邊緣有細纖毛,種子扁圓三角形,闊12毫米。

產云南鎮康。

此種与 *C. taliensis* W. W. Sm. 相近似,不同處在亮綠色革質葉和果殼較厚。

麻栗坡茶 *thea maxlipoensis* 新種

喬木高至7.5米;小枝有微細毛。葉革質,倒卵矩圓形,頂端漸尖,基部闊楔形,有鋸齒,上面無毛,不發亮。葉

柄長至10毫米，密生黑色粗毛。花單生葉腋間，白色直徑4厘米；花梗長至10厘米，微有毛，花瓣瀾倒卵形，直徑約2.5厘米，頂端圓形；子房密生白色長毛，4室；花柱長2厘米，頂端4裂，下部有長毛，上部有微細毛。

產云南麻栗坡

此松似吊 *T. taliensis* W. W. Sm. 相近似，不同處在花較小，而萼片與花瓣兩面均有絲狀毛，尤在其有密生黑色粗毛的葉柄。

大果茶 *Thea macrocarpa* 新松

喬木，高至4米；小枝墨白色，有白色毛並密生黑色皮孔。葉革質，倒卵矩圓形，長至11厘米，頂端長漸尖，基部闊楔形，有細鋸齒，上面亮綠色，下面初有細茸毛，最後全無；葉柄長5毫米，無毛。蒴果大，橢圓形，長至4.5厘米，果梗粗壯，長1厘米；萼片5個，不脫落，幾圓形，直徑1厘米；果瓣3個，木質，長至四厘米，厚至七毫米；中柱粗壯，棒狀，有4稜角，長至3.5厘米。

產云南西畴縣。

此種與他松不同處在其墨白色小枝有白毛並黑色皮孔，在其葉下面幼時有灰色細茸毛，尤在其大蒴果長至4.5厘米有粗壯棒狀中柱。

毛萼山茶 Camellia pilosisekala 新松

灌木，高至1.5米；小枝細瘦，有褐色細茸毛。葉革質，長至7厘米，頂端漸尖，基部闊楔形，有細鋸齒，上面亮綠色，沿中脉有暗色細茸毛，下面沿中脉有長毛，葉柄長至4毫米，有暗色粗毛。花幾頂生或腋生，無梗，直徑2.5厘米；萼片與苞片相似，闊卵圓形，外面有密生甚長毛，花瓣7個，外輪3個較小，外面頂端有長毛，內輪4個較大，闊倒卵形，外面無毛；子房無毛；花柱長1.5厘米，頂端短3裂，基部有疏生毛。

產江西新建西山。

此松與他松不同處在其苞片與萼片外面有甚長平貼毛。

王善山 Camellia pilosipala 新種

原產於。王善山。葉厚，對生，長橢圓狀，長1.5至2.5厘米，寬0.5至1厘米，先端急尖，基部楔形，上面深綠色，下面深綠色，兩面均被短柔毛。花序頂生，總狀花序，花序梗長1.5至2.5厘米，花梗長0.5至1厘米，花冠直徑1.5至2.5厘米，花瓣5，長橢圓狀，先端急尖，基部楔形，上面深紅色，下面深紅色，兩面均被短柔毛。果實長橢圓狀，長1.5至2.5厘米，寬0.5至1厘米，先端急尖，基部楔形，上面深紅色，下面深紅色，兩面均被短柔毛。花期10月至12月。果實12月至1月成熟。

王善山

王善山