

卯2

722

醫方論

善仲



醫方論卷三

理中湯

白朮

陳壁土炒二兩

人參

乾薑

炮甘草炙一兩

每服四錢自利腹痛者加木香不痛利多者
倍白朮渴者倍白朮倦卧沉重利不止加附
子腹滿去甘草嘔吐去白朮加半夏姜汁臍
下動氣去朮加桂悸加茯苓陰黃加茵陳寒
結胸加枳實本方等分蜜丸名理中丸



北京中医药大学图书馆版权所有

寒有外感有傳經有直中有痼冷外感之寒
先病在表後傳入裡必發熱而惡寒此傷寒
之寒病也直中之寒手足厥冷並不發熱痼
冷在內遇寒而發暴猝厥逆其勢尤重此中
寒門之寒病也施治之法傷寒一門在表者
宜辛散傳裡者宜辛溫中寒一門則每用辛
熱回陽急救之法此傷寒中寒治法之分也
埋中湯治傷寒太陰病腹痛便溏等症亦通

治中脘虛寒、惟云治結胸吐衄感寒霍亂此
兩條則宜去人參甘草量加厚朴砂仁等味
爲妥。

四逆湯

附子

一枚
生用

乾姜

一兩

甘草

炙二兩

冷服面赤加

葱九莖腹痛加芍藥二兩咽痛加桔梗一兩

利止脈不出加人參二兩嘔吐加生姜二兩

四逆湯爲四肢厥逆而設仲景立此方以治

傷寒之少陰症若太陰之腹痛下利完穀不
化厥陰之惡寒不汗四肢厥冷者亦宜之蓋
陰慘之氣深入於裡真陽幾幾欲絕非此純
陽之品不足以破陰氣而發陽光又恐姜附
之性過於燥烈反傷上焦故倍用甘草以緩
之立方之法盡美盡善後人分傳經爲熱厥
直中爲寒厥程郊倩譏之然亦有未可盡非
者仲景曰傷寒一二日至四五日而厥者必

發熱應下之。此明明說厥逆在前發熱在後。及至發熱則不復厥冷。乃傷寒失下之症。故絳蕩邪滯則發熱自退。本非爲厥而不熱者言也。程氏又云下之者下其熱非下其厥也。遇發熱則可下。遇厥則萬不可下。此數語最爲明白了。當可見傳經之邪亦自有當下者。但不可概謂之熱厥耳。四逆者必手冷過肘。足冷過膝。脈沉細無力。腹痛下痢等象咸備。

醫方論卷三
方可用之。否則不可輕投。

當歸四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛

三兩

甘草

炙

通草

二兩

大棗

二十

枚

仲景

又曰

其人

素有

久寒

者

加吳茱萸

二觔

生薑

半觔

酒六

升和

煮名

者

四逆

加吳茱萸

生薑湯

厥陰

爲藏

血之

經故

當歸

四逆

湯以

和榮

主加

桂枝

細辛

以和

衛榮

衛和

則厥

自解



雖有寒而不加姜附者。恐燥烈太過。劫陰耗血也。

四逆散

柴胡 芍藥 枳實 炙甘草 等分爲末

水調飲

四逆散乃表裡並治之劑。熱結於內。陽氣不能外達。故裡熱而外寒。又不可攻。下以礙厥。故但用枳實以散鬱熱。仍用柴胡以達陽邪。

陽邪外泄則手足自溫矣。

真武湯

附子炮一枚 白朮炒三兩 茯苓 白芍炒

生姜三兩

北方曰幽都。乃陰寒濕濁之地。賴真武之神。運用水火以鎮攝之。濁陰方漸得解散。此方取名真武。乃專治腎臟之劑。坎之爲象。一陽居二陰之中。水中之火。是爲真火。此火一衰。



則腎水泛濫停於下焦。則腹痛自利。水氣犯中焦。則作噦欲吐。不吐。水氣犯上焦。則咳嗽。心悸頭眩。方中姜附以助真陽。用苓朮以制

二陰水氣。一收則上中下三焦俱無病矣。

白通加人尿猪胆汁湯

葱白

四莖

乾姜

一兩

附子

炮一兩

人尿

五合

猪胆汁

一合

少陰病下利脈微服白通湯後利不止厥逆無脈。此為陰寒過甚。陽氣將絕之候。加人尿

猪胆汁者以類相從之義也。服後脈暴出則陽氣盡泄。孤立無依。故隨脫而死。脈微續者陽氣漸回。以次可復。故得生。外用葱艾熨灸氣海關元。表裡通陽。亦爲善策。

吳茱萸湯

吳茱萸

泡一升

人參

三兩

大棗

十二枚

生姜

六兩

吳茱萸。辛烈善降。得姜之溫。通用以破除陰。

氣有餘矣。又恐辛燥太過耗氣劫陰。故用九
參大棗之甘緩以濟之。又能補土扶陽使濁
陰不得上干清道。治法更爲周到。

大建中湯

蜀椒

二合

乾姜

四兩

人參

二兩

煎去滓內飴

糖一升微煎溫服

非人參不能大補心脾。非姜椒不能大祛寒
氣。故名曰大建中。又有飴糖之甘緩以殺姜

醫方論 卷三
椒之辛燥。非聖於醫者。不辨有此。

十四味建中湯

黃芪

蜜炙

人參

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙蜜

半夏

姜製

當歸

酒洗

白芍

酒炒

熟地

川芎

麥冬

肉蓯蓉

附子

肉桂

加姜棗煎

於十全大補中。又加四味。究竟陽藥太多。若以治陰虛之勞瘠。非抱薪救火乎。至藥令建中湯。加柴胡。細辛之開透。善走欲其建立中。

氣不亦難乎

小建中湯

桂枝

生薑

三兩

芍藥

六兩

甘草

炙一兩

大棗

十二枚

八飴糖一升微火解服

肝木太強則脾土受制脾陽不運虛則寒生

陰氣曰凝陽氣曰削故見腸鳴泄瀉腹痛等

症小建中湯之義全在抑木扶土當從吳

氏之說用肉桂而不用桂枝肉桂溫裡桂枝



解表用各有當也。且肉桂性能殺木。合芍藥以制肝。又用姜棗甘草飴糖之甘溫以補脾。斯中州之陽氣發舒而陰寒盡退矣。

白朮附子湯

白朮

二兩

甘草

一兩

附子

炮一枚

每服五錢

姜五片 棗一枚 煎

此爲治腎風之藥。腎爲水臟。得火則平而濁陰退聽矣。若肝風頭眩則當用養血之劑。悞



益元湯

用此方。則風火相搏。而病益劇。不可不知。

附子

炮

乾姜

艾葉

黃連

知母

人參

麥冬

五味子

甘草

加姜棗葱

煎白

入童

便一匙冷服

戴陽者。陰不抱陽。虛陽上浮。幾幾欲絕。若誤作熱症治。立見敗壞。此方用姜附艾葉以回陽。用生脈散以斂陰。使陽回氣復。陰能抱陽。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

可無虛脫之虞矣。

回陽救急湯

附子

炮

乾姜

肉桂

人參

五分

白朮

茯苓

錢一

半夏

陳皮

七分

甘草

二分

五味子

九粒

加姜煎入麝三厘調服

無脈

加豬胆汁泄瀉加

升麻黃芪嘔吐加姜汁吐涎沫加鹽炒吳茱

萸

此方治中寒之緩症則可若云救急則姜附



北京中醫藥大學圖書館版權所有