

~~~  
借  
~~~

福州医案医话

第二辑



福州市卫生局

目 录

一、医案

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 1、背疽症 | 刘福星 | (1) |
| 2、红丝疔症 | 刘福星 | (2) |
| 3、痛 经 | 郑碧云 | (3) |
| 4、月经过多 | 郑碧云 | (5) |
| 5、便 血 | 郑碧云 | (6) |
| 6、尿 血 | 郑碧云 | (7) |
| 7、桂枝汤临床治验三例 | 陈玉村 | (8) |
| 8、风 疹 | 陈玉村 | (12) |
| 9、胃脘痛 | 陈玉村 | (14) |
| 10、尿 血 | 黄济尘 | (15) |
| 11、血瘀头痛 | 黄济尘 | (19) |
| 12、郁证治验 | 黄济尘 | (21) |
| 13、左胁竖脉积块 | 黄济尘 | (24) |
| 14、咯 血 | 黄济尘 | (27) |
| 15、胸 痹 | 黄济尘 | (29) |
| 16、痿 禥 | 黄济尘 | (32) |
| 17、热痹治验 | 黄济尘 | (34) |
| 18、黄 瘡 | 黄济尘 | (36) |
| 19、产后自汗伤风 | 黄济尘 | (38) |
| 20、产后盗汗 | 黄济尘 | (39) |
| 21、产后鼻衄 | 黄济尘 | (41) |

| | |
|-------------|---------|
| 22、产后胃实 | 黄济尘(42) |
| 23、恶露不下 | 黄济尘(44) |
| 24、产后感冒 | 黄济尘(45) |
| 25、膀胱蓄血 | 黄济尘(47) |
| 26、漏下挟感 | 黄济尘(49) |
| 27、口 瘡 | 黄济尘(51) |
| 28、乳 蛀 | 黄济尘(53) |
| 29、邪伏募原 | 黄济尘(54) |
| 30、新感引动伏邪 | 黄济尘(57) |
| 31、阴囊出水治验 | 游书元(58) |
| 32、臌 胀 | 游书元(60) |
| 33、痹 症 | 游书元(61) |
| 34、微 结 | 游书元(63) |
| 35、小产后癃闭症 | 游书元(64) |
| 36、行经气滞血淤一例 | 游书元(65) |
| 37、小产血崩 | 游书元(66) |
| 38、胃火牙痛治验 | 游书元(68) |
| 39、鼻 鼻 | 游书元(69) |
| 40、腰 痛 | 游书元(70) |
| 41、风 瘴 | 游书元(71) |
| 42、肠 痛 | 游书元(73) |
| 43、眩 晕 | 林春生(74) |
| 44、消化道出血 | 林春生(76) |
| 45、胃脘胀痛 | 林春生(77) |
| 46、咳 血 | 林春生(78) |
| 47、带下病 | 林春生(80) |
| 48、痹 症 | 肖圭连(82) |

- 49、风 水 肖圭连 (83)
50、脾肾双虚作泻 肖圭连 (84)
51、急性穿孔性阑尾炎 肖圭连 (85)
52、痹 痛 肖圭连 (86)
53、湿毒疮 陈书智 (88)
54、急性肾炎 陈书智 (89)
55、胎 漏 方德树 (90)
56、湿热内蕴发黄 方德树 (91)
57、癫 证 方德树 (93)
58、阳虚水肿 方德树 (94)
59、痰 喘 陈拯民 (96)
60、黄疸病 陈拯民 (97)
61、鼻咽癌治验一则 陈师永 (98)
62、痄 腮 郑中仁 (99)
63、肠 痛 杨肇旺 (100)
64、头 痛 杨肇旺 (102)
65、崩 漏 杨肇旺 (103)
66、黄 瘬 李少端 (106)
67、泄泻治案三则 蔡光武 (107)
68、男性更年期综合症治验 陈少壁 (111)
69、附骨疽治验一例 肖宏远 (113)
70、小儿脱肛 林文辉 (115)
71、咳喘一例证治 林文辉 (116)
72、脾虚泄泻 周世杰 (117)
73、产后高热治验三则 吴 熙 (118)
74、临经失音 吴 熙 (122)
75、产后慢性肾炎尿毒症治验一则 吴 熙 (123)

- 76、胎漏尿血症.....吴熙 (126)
 77、月房痨.....吴熙 (128)
 78、临经乳汁自溢.....吴熙 (129)
 79、乳糜血尿.....吴熙 (131)
 80、产后乳汁不行.....吴熙 (132)
 81、产后小便失禁症.....吴熙 (134)
 82、不孕症治验四则.....吴熙 (135)
 83、脱发症治验六则.....吴熙 (141)

二、医话

- | | | |
|--------------------|------------|---------|
| 1、疗毒走黄..... | 郑天福 | (147) |
| 2、谈邪伏募原之浅见及治验..... | 黄济尘 | (148) |
| 3、谈赤豆茅根汤治验..... | 游书元 | (150) |
| 4、十灰散外治..... | 游书元 | (150) |
| 5、浅谈呕吐症治法..... | 游书元 | (151) |
| 6、浅谈炎夏畏寒病..... | 游书元 | (151) |
| 7、谈诊病必须细心..... | 肖圭连 | (153) |
| 8、肾炎治验..... | 王长荣 | (154) |
| 9、杏枇能治便秘..... | 方德树 | (155) |
| 10、一信揭悟..... | 吴熙 | (156) |

背 痘 症

解放卫生院 刘福星医案

长征卫生院 杨 珍整理

患 者：林××，男，54岁，住尾垱22号。

自 诉：于71年2月上旬突然由恶寒发热起，背部上搭处觉微肿疼痛，经二天恶寒发热稍减，发现背部结成粟粒大，过二天痛更剧，曾到某处外科治疗二天反剧，如杯大红肿起来，身中又恶寒战栗，发热头痛，局部肿度扩大，前后又经过一星期，局部肿痛更甚，精神恍惚，饮食艰难，又医十几处，后友人介绍到我处治疗。

查原因：他平素好食鱼腥之类，更加好酒过量，生性善怒，此次因感染风邪后，引起凝结背间，又经治疗不当，以致证成此症。

检查局部症状，局部红肿，有细孔数十次，色紫暗，孔头呈微黄色，重按根盘坚硬，疼痛如针刺，查大便三日未通，面色赤，脉数急，舌浊口臭。

处 方：

紫地丁二两 黄花草二两 叶下红三两 六角仙四两
嫩射干二两

清水煎，吃时加冬蜜一两，冲吃二次，又将该药渣捣烂均敷患处，日二次，患者服三剂后症稍减，便通，心中通畅，且局部盘根尚坚不能化脓，舌色浊黄，平素神经衰弱，又恐毒气

攻心，改用内托之剂助之化脓。

处 方：

养心草一两 土黄芪二两 淫羊藿二两 天仙果二两

右四味切片洗净加红糖一两，清水煎分二次早晚服，患者连服四剂后，自觉精神舒畅局部疮口化成红色，肿度稍消，有化脓形势，翌日果然脓出，经过三天后，局部疮口已软，外用紫花地丁，黄花地丁加冬蜜杵烂分敷，十日后腐尽生肌，全部愈矣。

按：

疽是气血为毒邪所阻滞引起，本病的特点初起是有头似粟火欣热胀痛，易向周围扩大，溃烂之后，状如蜂窝，生在背部的叫发背疽，本例患者由风热相搏，湿热交蒸而发，先用排泄脓毒之法，后改用腐化新生，使全身症状随之消失。

红丝疔症

解放卫生院 刘福星医案

长征卫生院 杨珍整理

概 说：红丝疔发于手足或骨节间，亦有生于头面的，此证为一条红线向他处蔓延，其发病原因主要火毒壅结，毒流经脉所致。

自 诉：初起时形似小痘逐渐发生红丝，在手者多上攻手搏，在足者多上走股腿，在头面者则多下窜颈项，流窜颇快常并发恶寒发热，甚至恶心呕吐，生于手者其毒可以攻心，生于

足者其毒可以至脐，生于头面者其毒可以至喉，如不早治常易引起心神恍惚，烦躁谵语，变成险症。

治 法：治宜内外兼治，内治着重清热解毒，服以夺命汤加减（银花、川连、赤芍、泽兰、羌蚕、蝉衣、青皮、甘草），日一剂，分量随证加减，外治，可向红丝疔根部针刺放血，以祛毒邪热，再用五味祛湿散涂于红线，以退红线（黄柏、蛤粉、轻粉、白芷、石膏、梅片）在调理中应忌辛辣、香燥、膏粱厚味、酒、鸡、鹅虾等刺激之类，且忌闻各种辛香走窜之气，以免毒气四散，病势扩大。

医案体会：

施××，男，35岁，住尚干，由于小腿部位有一红丝蔓延至大腿内侧，微热，患处胀疼，二便正常，舌红，脉弦，此为火毒壅结，血凝毒滞之症，急宜清热解毒，活血祛淤之剂，内服夺命汤加减，第二天改用六角仙、鸭脚掌、紫花地丁等，因口渴加竹茹、栀子根等，外治，治红线以三棱针点刺出血，再外敷五味祛湿散只治疗二次即愈。

痛 经

兴无卫生院 郑碧云医案
区卫协会中医班 林淑芳整理

患 者：林××，女，20岁，福州市，学生。

自 诉：素体虚弱，昨日经适来，冒雨感寒，衣裤尽透，遂感经量减少色暗红，腹部剧痛，头痛恶寒，手足不温，纳少

欲呕，心悸脘闷，舌苔薄白，脉象浮缓。

病 因：寒邪乘虚凝滞胞宫。

治 法：温经散寒。

处 方：

当归中三钱 桂枝尖二钱 赤芍药三钱 川细辛七分
炙甘草一钱 白通草一钱 大红枣六枚 法半夏三钱
干姜片一钱 元胡索三钱 失笑散三钱（布包）

服药二剂后诸症俱愈。

按：

痛经是指月经来潮时的小腹疼痛。“邯郸遗稿”和景岳“妇女规”说：“经水临行，误食冷物，若寒滞于经，或因外寒所逆，或素日不慎寒凉，以致凝结不行，则留聚为痛。”这说明了由于寒冷而引起痛经。此例患者正值经期冒雨感寒，寒湿凝聚胞中，困阻气机，血行不畅，故小腹疼痛，量少色暗红。寒湿之邪易伤阳气，血失温运，不能透达四肢，故手足不温。苔薄白为寒湿凝滞之象，方中当归、赤芍活血调经，桂枝、细辛温经散寒。木通利湿通经。甘草、大枣和中，法夏降逆止呕，干姜用于虚寒证温经，元胡活血止痛，失笑散治疗痛经，诸药配合收到显效。

月 经 过 多

兴无卫生院 郑碧云医案
区卫协会中医班 林淑芳整理

患 者：林××，女，44岁，工人，福州市人。

自 诉：经××医院剖腹产后经水淋漓不断，量多、色淡红、质稀薄，头晕心悸，神疲倦怠，面色㿠白，不思饮食，舌质淡红，苔薄白，脉象细弱。

病 因：气虚不能摄血。

治 法：补气摄血、建脾宁心

处 方：

潞党参三钱 生黄芪三钱 漂白术三钱 川升麻三钱

黑阿胶三钱 三七粉二钱（另冲） 炙甘草一钱

当归中三钱 熟地黄三钱 枣仁三钱

连服七剂经量减少，恢复正常。

按：

“坤元是保”说：“冲任虚衰，气不能固也。”本例患者剖腹产后致气虚不能摄血，中气不足，气虚下陷，冲任不固，故剖腹产后经水淋漓不断，色淡黄薄。出血过多，心失所养，故心悸怔忡。气虚阳气不振，则神疲倦怠，苔薄白，脉象细弱均为气虚之象。方拟党参、黄芪、白术、炙草补中益气，升麻辅助黄芪升阳举陷，对脾阳下陷，气虚不能摄血，以致月经量多色淡者可收升阳举陷。当归、熟地、补血，阿胶补血止血，三七粉止血散淤，枣仁宁心安神诸药配合收到显效。

便 血

兴无卫生院 郑碧云医案
区卫协会中医班 林淑芳整理

患 者：叶××，女，61岁，农民，闽侯县人。

自 诉：1974年五月因经常腰酸痛，不规则阴道出血，带下量多后往省妇幼保健院检查确诊为子宫癌，采用镭电治疗三个月，白带及阴道出血稍差，但时常发现便血，色鲜红，多方治疗无效。七四年八月到我处治疗。

症 状：头晕心悸，面赤唇干，口苦咽干，手足不温，大便秘结，经常出现便血量多，舌红黄厚，脉滑数。

病 因：大肠积热，损伤血络。

治 法：清热、凉血止血。

处 方：

制苍术三钱 炒地榆五钱 槐花米五钱 牡丹皮三钱
生黄芩三钱 杭白芍三钱 陆氏润字丸三钱（分冲）

服药五剂，复诊照前方又服七剂诸症痊愈。

按：

张景岳曰：“血在便前来者其来近，近者在大肠，或在肛门”。本例患者便血系由镭电后，热伏于肠，津液受损，致邪热上于清窍，故出现头晕心悸，面赤唇干，口苦咽干，邪热蕴伏大肠，津液损耗甚，致使大便燥结，小便短少，热盛伤于阴络则便血，治宜清热凉血，止血。方拟黄芩、槐花清热凉

血，地榆凉血止血收敛，白芍酸收养血，丹皮清热凉血，苍术燥湿健脾，润字丸治胃脘燥热所引起便秘，诸药应用诸症痊愈。

尿 血

兴无卫生院 郑碧云医案
区卫协会中医班 林淑芳整理

患 者：陈××，女，48岁，福州市人，工人。

初 诊：七七年八月二十三日。

自 诉：于七三年三月间因带下连绵不绝，月经过多，形体消瘦等症，往省妇幼保健院检查，确诊为“子宫癌”，采用西药及镭电后，带下减少，月经正常，但同年七月开始经常发现小便出血，经治无效邀我诊治。

症 状：经镭电后，头晕耳鸣，腰酸腿软，神疲肢倦，口干烦燥，精神抑郁，皮肤经常出现湿疹，尿血鲜红，尿频急，排尿困难，诊其脉象细数，舌红苔黄。

证 属：心火炽盛、热入膀胱。

治 法：清热利尿、止血。

处 方：

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 生黄芩三钱 | 肥知母三钱 | 生黄柏三钱 | 生地黄三钱 |
| 牡丹皮三钱 | 光泽泻三钱 | 杭白芍三钱 | 仙鹤草三钱 |
| 炒地榆三钱 | 侧柏叶三钱 | 干荷叶三钱 | |

连服五剂尿血减轻，照前方又服十剂，诸症消失。

按：

尿血，是血从前阴而出的疾患，如素问气厥论说：“胞移热于膀胱，则癃溺血。”此例病者初起系心火炽盛，热迫膀胱而尿血。遵经云：“热者寒之”的正治法，先用苦寒之剂泻其心火，清其里热，使其血循经络而不妄行，从而达到治疗尿血的目的。

桂枝汤临床治验三例

赤卫区医院 陈玉村

桂枝汤源于汉代张仲景所著《伤寒论》，由桂枝、白芍、生姜、大枣、炙甘草等药物组成，有解肌发表、调和营卫之功用，主治外感风邪，头痛发热，汗出恶风等太阳中风证，用之得当，效如桴鼓，千余年来一直为医者所乐用。笔者在长期临床实践中，运用桂枝汤辩证施治，收到很好的疗效，现将临床治验三例分述于下，供同志们参考。

例一：

患者：张××，男，10岁，本市人。

初诊：一九七六年十一月五日。

患儿发热四个月不解，每日下午二时许开始发热，至傍晚汗出热退，即饮食如常，次日又如是发热，热度波动于 38.5°C — 39.5°C 之间。曾在××医院内科求治，予以四环素、退热剂，症状未减，转诊于中医儿科，投以四逆散，淡竹、连翘、葛根、条芩等品，效果不著，又更以柴胡、青蒿、鼈甲等药，

其热更甚于前，遂求诊于我院。

查 体：体温39.1℃，血象正常，未检出疟原虫。患儿汗出恶风头痛，神疲肢倦，肌肉消削，口不渴，食纳尚可，二便如常，舌苔薄白，质淡红，脉浮缓，头项部抚之灼热。

西医诊断：病毒感染。

中医辩证：太阳中风。

治 法：解肌发表，调和营卫。方用桂枝汤。

桂 枝钱半 白 苓钱半 大 枣四枚 生 姜二片
灸 草一钱 服一剂

嘱于未发热前一小时服药，后继啜热稀粥半碗。

二 诊：十一月六日。

服药后发热推迟至下午3时许，热势较轻，汗出亦减，舌、脉如前，精神较佳，脑后热已减退，参其脉证，病势已减，仍守前法为治。

照前方，嘱服二剂。

三 诊：十一月九日。

发热汗出诸恙均愈，惟形体消瘦，面色少华，苔薄舌淡，此久病之后，脾胃受损，气血不足，遂投以桂枝汤加当归二钱，黄芪五钱，调和营卫，兼补气血，嘱服三剂后再予参苓白术散三剂，调理脾胃，以善其后。

按：

此例系太阳中风，营气与卫气不谐，故定时发热，自汗出，其病在卫。《伤寒论》云“先其时发汗”者，系于未发热之时，先以桂枝汤发其汗，即调和营卫之义。服药后啜热稀粥是借谷气以助药力，兼益胃气，以鼓邪外解。头项部乃太阳经脉循行之处，故灼热，前医误以风温，或阴虚，肝经郁热等症治之，故不瘥。

例 二：

患 者：林××，男，32岁，已婚，务农。

初 诊：一九七六年五月十日。

自 诉：于一个月前觉发热自汗恶风头痛，大便二日未通，曾求诊当地卫生院，给予治外感及通便之剂，症状未减差，反增加咳嗽，微喘之症，缠绵不愈，至今已一月。

查 体：体温38.4℃，恶风头痛，咳嗽，微喘促，痰白粘，时自汗出，X线透视提示：支气管炎。血象正常，舌苔白，脉浮微弱。

西医诊断：上呼吸道感染。

中医辩证：伤风夹湿，饮邪咳嗽。

治 法：拟解肌发表、下气平喘之法。方用桂枝汤加川朴、杏仁。

桂 枝二钱 白 苓二钱 黑 姜钱半 大 枣四枚
炙 草钱半 川 朴钱半 杏 仁三钱 嘴服二剂。

二 诊：五月十三日。

恶风已彻，咳嗽减，喘平，舌苔转薄白，脉浮。

照前方加前胡钱半，再服二剂。

三 诊：五月十六日。

诸恙均差，感头晕心悸肢酸，食慾不佳，脉濡舌淡。以苓桂术甘合二陈汤为治，健脾燥湿，温化痰饮。

茯 苓三钱 白 术钱半 桂 枝二钱 煮 夏钱半
陈 皮一钱 前 胡钱半 苦 杏三钱 川 朴钱半
炙 草钱半 嘴服三剂，再以六君子汤三剂善后。

按：

太阳中风，其病在表，不可下，下之为逆。此例因误下陷邪，致咳嗽微喘。喘本为麻黄证，此因妄下后表虽不解而腠理

已疏，故不宜麻黄而宜桂枝，加杏仁利气平喘，厚朴下气宽中，共奏解肌发表，平喘下气之功。脾为生痰之源，肺乃贮痰之器，以二陈汤，六君子汤善后者，乃健脾燥湿，俾中枢健运则痰饮无由生，此“治病必求其本”之义。

例 三：

患 者：郑××，女，36岁，已婚，务农。

初 诊：一九七六年九月五日。

自 诉：病已十天，初起发热、畏冷、头痛，求治于××医院，给予辛温发汗之药，症不差，汗漏不止，四肢微急，难以屈伸，一日发作数次，故来院求治。经我院西医诊断：手足搐搦症，因血清钙偏低所致，以钙剂静脉注射，效果不著。

中医辨证：太阳中风表虚，误汗之变症。

治 法：调和营卫，固表止汗。方用桂枝加附子汤。

桂 枝二钱 白 苓二钱 生 姜二片 大 枣四枚
炙 草钱半 熟 附三钱 纾服二剂。

二 诊：九月七日。

服二剂后，汗止，恶风减，四肢拘急亦解，脉象缓弱，再用前方加当归三钱，炙黄芪五钱，服三剂而愈。

按：

此乃太阳病表虚证，误用发汗之剂，以致汗漏不止，阳虚腠理不固则恶风，汗漏不止则亡津液而小便难；四肢为诸阳之本，阳气虚则四肢微急，液脱者血不荣筋，故屈伸不利。今以桂枝加附子汤，调和营卫，固阳止汗，则表阳复固，腠理致密，汗止津液不得外泄，而恶风，手足挛急，小便难等症自解矣。

小 结：以上三例，例一是儿童患太阳中风，有桂枝证，便可用桂枝汤治之，不必拘泥“小儿纯阳体”之说；例二、例

三均系太阳中风因误汗、误下后之变局，桂枝证仍在，而用桂枝汤加减而收功。桂枝虽为解表之剂，但配伍芍药和阴，姜枣和里，与专以发汗之方不同。故除用外感风邪表证外，对病后、产后由于营卫不和，以致时而微寒、时而微热，脉缓有汗等症，皆可酌情使用。但对表实无汗、表郁里热、温病等症，不宜使用。

风疹（荨麻疹）

赤卫区医院 陈玉村

例 一：

患 者：金××，男，29岁，已婚，务农，住新洲乡。

初 诊：一九七六年三月二十日。

自 诉：约四十天前，因吃田螺及饮酒后，突感发热恶寒无汗，脘腹胀痛，次日全身发疹块，奇痒不堪，时发时愈，一日发数次。曾于当地卫生院求治，服辛凉解表之剂，症状未减差，如此缠绵月余，而来院求诊。

查 体：体温38.6℃，颜面部及全身皮肤均有大小不等之微红色疹块，搔痒不止，畏冷发热无汗，脉来浮紧微滑，舌苔白，质淡。

辨 证：风寒湿邪客于肌表，营卫不和。

治 法：祛风散寒，理湿和营。方用麻黄桂枝各半汤加味。

麻 黄钱半 桂 枝二钱 白 苓二钱 生 姜钱半